


BAIDALEO CIMBRECICATO CONTENTA LA CONTENTA DE LA CO

MULLATO FROFPACMURILATO OFILLITE

HIM WHA M

Principle Constanting Carpenda.





ЗАПАДНО-СИБИРСКАГО ОТДЪЛА

ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

КНИЖКА ХІ.

Печатано по распоряжению Зап.-Сибирскаго Отдъла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.




THUM ILAS

ARCE IN CHARACTER AND STANDARS

ATTEMED CHARMANICE CLASSE

JE ARRES



Библіотена
Императорскаго
русскаго географическаго
общества
Заль Д. Шкарь/8
Полка 2 № 3

MATEPIAJЫ,

СОБРАННЫЕ

A. A. KAEMEHUOMB


ПРИ ЭКСКУРСІЯХЪ ВЪ ВЕРХНІЙ АБАКАНЪ

въ 1883 и 1884 гг.



ОМСКЪ. Тип. Окружн. Штаба. 1890.


. 26337.



СОДЕРЖАНІЕ.


- 1) Краткій предварительный отчеть объ экскурсіяхъ 1883 года.
 - а) Коллекціи горныхъ породъ.
 - б) Списокъ растеній, 1883 года.
- 2. Замѣтка о старомъ руслѣ Енисея (съ картой).
- 3. Замътка о девонскихъ отложеніяхъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ: Списокъ растеній, 1884 года.



КРАТКІЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТЬ ОБЪ ЭКСКУРСІЯХЪ ВЪ СИСТЕМѢ АБАКАНА, выполненныхъ по поручению г. адріанова въ 1883 году, членомъ экспедиціи въ восточный алтай и западную часть минусинскаго округа,

Дмитріємъ Клеменцъ.



13-го іголя, около устья річки Балыксы, впадающей сліва въ Томь, на такъ называемомъ Пермикинскомъ зимовьї, произошло разділеніе нашей экспедиціи. Мні поручено было вернуться на Абаканскій желізоділательный заводъ и оттуда, прослідивъ теченіе Абакана до устья р. Матурь или Мадырь, перебраться на прімски въ притокахъ Камышты и Уйбата для собранія нікоторыхъ дополнительныхъ свідіній и приведенія въ порядокъ коллекцій, оставленныхъ тамъ при началі экспедиціи.

Въ 3 ч. пополудни я, съ вожакомъ изъ сагайскихъ татаръ Попилатомъ Михайловымъ Оръшковымъ, тронулся въ путь. Дорога
наша должна была идти между лѣвымъ берегомъ Томи и хребтомъ
Уленни-сынъ (Поклонный хребетъ), образующимъ водораздѣлъ притоковъ Томи и Абакана, къ вершинамъ р. Аскызъ, впадающей въ
Абаканъ. Этотъ путь у мѣстныхъ жителей называется сагайской
дорогой и представляетъ собою вьючную тропу. Имъ пользуются
мѣстные инородцы, а иногда и золотопромышленники для взаимныхъ сношеній; онъ значится въ числѣ проектированныхъ путей
для проложенія колесной дороги изъ Минусинскаго округа въ Кузнецкій, но до сихъ поръ обслѣдованъ очень мало. Насколько мнѣ
извѣстно, со временъ Кашкарова, спутника Палласа, кромѣ горныхъ инженеровъ, ходившихъ съ поисковыми партіями, ее не посѣщалъ ни одинъ изслѣдователь.

Верстахъ въ двухъ выше Пермикинскаго зимовъл 1) мы перешли въ бродъ съ праваго берега на лѣвый, пересѣкли низменную прибрежную луговину, заросшую высокими Aconithum licocthanum и Spirea иlmaria, и стали подниматься на хребетъ, сопровождающій лѣвый берегъ Томи. Тропа вьетси по лѣсу, заросшему высо-

¹⁾ Когда-то владъльцемъ Абаканскаго жельзодълательнаго завода была проложена дорога отъ Таштына до Кузнецка, нынъ уже брошенная, и на этомъ пути было нъсколько избъ зимовниковъ. Одну изъ нихъ, при устъъ Валыксы, до сихъ поръ навыв. Пермикинскимъ вимовьемъ.

кими кедрами и пихтами; упавшія деревья часто заставляють путника сворачивать въ сторону и пробираться сквозь чащу. Подъемъ мъстами очень крутъ, къ тому же безпрерывные дожди сильно попортили дорогу. Рыхлая красноватая глина, сплошь закрывающая обращенные къ Томи склоны хребта, до того уплотнилась отъ влаги, что мъстами по ней скользитъ нога кованой лошади. Было-бы, однакожъ, несправедливо смотреть на этотъ перевалъ, какъ на серьезное препятствие къ проложению колеснаго пути: съ топорами въ рукахъ сквозь чащу было-бы возможно проложить болье длинный, но зато и болье пологій спускъ. Съ вершины хребта открылся обширный видь къ востоку и югу. Хребетъ, на которомъ мы стояли, идетъ приблизительно въ меридіональномъ направлении и къ югу оканчивается долиною, за которой находится почти перпендикулярно къ нему другой высокій хребеть. Далеко на ю.-в. видиблась вершина Сохчахъ, уже знакомая мив со времени путешествія по верхней Томи. Нашъ хребеть даваль отъ себя отрогъ къ в. Въ полугоръ къ нему пролегала тропа. Склонъ отъ подошвы до гребня заросъ травой, въ которой преобладаетъ бледножелтый Buplerum aureum. Леса и рощицы образують отдъльныя темныя пятна на зеленоватожелтомъ травяномъ фонъ. Составъ ихъ здёсь гораздо разнообразнёе, чёмъ въ долинё Томи: осиновыя рощи чередуются съ пихтовыми зарослями. Иногда осины достигаютъ здёсь толщины въ два обхвата, а висотой соперничають съ кедрами; неръдко попадается и береза. Съ описываемаго хребта тропинка переходить на невысокій горный кряжь, обогнувъ который, мы очутились на лѣвомъ берегу р. Мюнджуль, лѣваго притока Томи, гдъ встрътили среди пихтовой рощи выходъ породы, обозначенной въ моемъ спискъ № 1, въ которой я заподозриль діорить, единственное обнаженіе, встрытившееся мнъ на пути вплоть до береговъ Шор-сука. Повсюду мив встрвчались, употребляя мъстное названіе, только мякотныя горы, т. е. непредставляющія ни утесовъ, ни обрывовъ и покрытыя почвою.

За Мюнджуломъ, на разстояніи версть около 6, идеть пологій подъемъ ивстами лугами, мвстами горвлымъ лвсомъ. Съ вершины подъема беретъ начало Безъимянный ключъ, впадающій въ Шор-

сукъ, верстахъ въ 7-ми ниже устья последней. Шор-сукъ течетъ здёсь къ устью въ с.-з. направленіи; горы, сопровождающія реку, безлёсны и силошь заросли высокой травой, въ которой преобладаеть Виріегит аигеит; мёстами виднёются выходы бёлаго мрамора, испещреннаго красноватыми лишайниками. Ширина речной долины измёняется отъ 50 саж. до 1 версты. Кое-гдё мраморные утесы подходять къ самой реке, благодаря чему дорога несколько разъ переходить поочередно то на правый, то на левый берегъ реки. Въ эту пору года бродить реку нетрудно, вода неглубока и берега чисты. Колесный путь, разумётся, нельзя вести вдоль выочной тропы; невыгодны также и частые броды, но справиться съ несколькими известковыми утесами и проложить дорогу въ некоторомъ разстояніи отъ берега реки не такъ трудно, чтобы изъза этого стоило отказываться отъ полезнаго пути сообщенія.

Пройдя 3 версты вверхъ по рѣкѣ, мы встрѣтили устье Безъимяннаго ключа, выше котораго Шор-сукъ течетъ съ ю. на с. и
открывается видъ на восточную вершину Шор-тайги, высокій
снѣжный пикъ, гдѣ беретъ начало одна изъ двухъ вершинъ нашей
рѣки. Западная вершина Шор-тайги скрыта горами лѣваго берега. Къ правому берегу здѣсь подходитъ хребетъ Пайзы, и нашъ
дальнѣйшій путь пересѣкалъ его съ з. на в. Въ этомъ мѣстѣ мы
остановились на ночлегъ, на берегу рѣки. Пройдено нами было,
по нашимъ разсчетамъ, около 25 верстъ. Это одно уже говоритъ въ
пользу доступности пути: выйдя съ мѣста далеко за-полдень, мы,
до заката солнца, на утомленныхъ коняхъ, неуспѣвшихъ оправитъся послѣ тяжелой дороги по верхней Томи, успѣли сдѣлать около
25-ти верстъ.

14-е іюля. Вереговое обнаженіе по Шор-суку состоить, какъ оказалось, изъ толщей свраго известняка, издающаго, при ударв молоткомь, сильный свроводородный запахь. Сверху ихъ прикрывають слои рыхлой красноватой глины, и эту последнюю породу я встретиль и на обоихъ склонахъ хребта Пайзы-сынъ и въ такомъ же отношеніи къ ней, какъ и на берегу Шор-сука, находится вонючій известнякъ. Только образцы, виденные и взятые мною съ обнаженій на хребте, отличаются болье темнымъ серымъ

цватомъ. Перевалъ чрезъ Пайзы-сынъ крутъ и на западной сторонъ покрыть лъсомъ. Здъсь, въ случат проложения дороги, придется много работать топорами и лопатами; но за то восточный склонъ горы не представляеть серьезныхъ затрудненій для проложенія колеснаго пути: имъ можетъ служить та же тропа, только нъсколько расширенная. Спускаясь съ хребта, мы, послѣ стоянки, въ полдень тронулись вверхъ по р. Тузак-су, притоку р. Пыскыможи, текущей въ Томь слева. Дорога идетъ съ ю. на с. и только нѣсколько уклоняется на в. Тузак-су принимаетъ справа притокъ Ай-Ант, текущій съ Поклоннаго хребта. Выше этого притока Тузак-су течеть съ в. на з., и сагайская тропа, вплоть до перевала чрезъ Поклонный хребетъ идетъ по правому берегу Ай-Анга. Дорога вверхъ по Тузак-Су и Ай-Ангъ лежитъ въ медленно повышающейся долинь, вершина которой подходить къ Поклонному хребту. О растительности этой мфстности могу сказать только, что она ничёмъ не отличается отъ Томской и господствующей между Шар-сукомъ и Балыксою. Поклонный хребетъ въ этомъ мъстъ покрыть остатками горълаго лъса. Около одного пня на перевалъ татары творять свои обычныя возліянія виномъ и бросають въ жертву какую-нибудь вещь, иногда ложку, черенъ стараго ножа или что-нибудь въ этомъ родъ. Поклонный хребетъ служить водоразделомъ рекъ, текущихъ въ Томь и Енисей. Разстояние отъ устья Балыксы до перевала, по моему приблизительному разсчету, не должно превышать 60 версть. Гора Сахчахъ, которую съ перевада на берегахъ Томи я видълъ въ ю.-в. направлении, находится въ ю. отъ того мъста, гдъ сагайская дорога пересъкаетъ Поклонный хребеть, такъ что общее направление нашего пути было съ в. на в. съ небольшими уклоненіями къ с. Подымаясь вверхъ по Шор-суку, мы уклонялись отъ прямаго направленія къ ю. Переваливь чрезъ Пайзы-сынъ, мы шли сначала къ с.-в., а потомъ прямо на с., т.-е. постепенно возвращались къ той параллели, съ которой начали путь.

Енисейскій склонъ Поклоннаго хребта нѣсколько круче Томскаго, но также безлѣсенъ, покрыть скудною травяною растительностью; на немъ выступають утесы какой-то темной кристалли-

ческой породы, обозначенной въ моей коллекціи № 5. Дорога идетъ вдоль русла небольшаго ручья Кучей въ узкой долинь отроговъ Поклоннаго хребта; верстахъ въ 4 ниже Кучей сливается съ 2-мя другими потоками, Кугульгеномъ справа и Курум-Аскизомъ слёва. Летомъ последний представляетъ собою сухое русло, наполненное галькой; вода бываеть въ немъ только весной. Мъсто сліянія трехъ ручьевъ носитъ название Юсь-питель (3 ручья). Три соединившіеся ручья, въ 4 верстахъ ниже, впадають справа въ Аскызъ. Въ 1/2 верств ниже сліянія ручьевъ въ потокъ впадаетъ р. Челенныхъ, начало которой лежить на западныхь склонахь Сохчаха. Пройдя версты 3 вверхъ по теченію Челенныхъ, по правому берегу, мы остановились на ночлегъ среди лиственничной рощи. Замъчу мимоходомъ, что на енисейской сторонъ Поклоннаго хребта лиственница начинаетъ замътно преобладать надъ другими древесными породами, тогда какъ въ системъ Томи и ея притоковъ она встръчается сравнительно редко.

15-го ізоля мы продолжали нашъ путь вверхъ по р. Челенныхъ, потомъ пересъкли невысокій кряжъ, перешли р. Б. Берекчуль, текущую въ Аскызъ съ южныхъ склоновъ Сохчаха. В. Берекчулъ горная порожистая ръчка, текущая въ узкой долинъ, обрамленной справа и слъва сізнитовыми утесами. Эта же порода тянется и по правому берегу Аскыза, вплоть до впаденія въ него справа р. Бай, гдѣ начинаютъ преобладать порфиры. Дорога по Берекчулу идеть въ полугоръ, среди лиственничнихъ рощъ; тропинка усъяна, словно нарочно, мелкимъ гравіемъ; растительность уже не таежная, обиліе различныхъ видовъ Arthemisia даетъ чувствовать близость степи. При сліяніи съ Аскызомъ, Берекчулъ выходить на широкій сфнокосный лугь, по которому мъстами растуть гигантскія листственницы. Смёна мрачныхъ пихтовыхъ и кедровыхъ лёсовъ лиственницей и узкихъ долинъ широкими лугами производитъ отрадное внечативніе простора и свіжести на наблюдателя, которому уже успёли примелькаться дикія красоты таежныхъ трущобъ. Первое жилое мъсто по Аскызу-улусь Григорія Очакова, состоящій изъ 3 юртъ. Здёсь же попадаются и первые со стороны тайги курганы. За улусомъ идетъ уже колесная дорога до села Аскызскаго, лежащаго при усть Аскыза, посылая отъ себя вытви на в. и з. Разстояніе отъ Поклоннаго хребта до Очаковскаго улуса считается мыстными инородцами около 30 версть. По правому берегу Аскыза я спустился до устья р. Бай. Дорога идеть между улусами, луга чередуются съ пашнями; направо путника сопровождають горы, заросшія лиственничнымь лысомь, налыво—Аскызь, опущенный кустарными зарослями. Лывый берегь Аскыза гористь. Населеніе состоить изь сагайскихь татарь выдомства Аскызской степной думы.

По рачка Баю сізнить заманяется порфиромъ, образчикъ котораго обозначенъ въ моемъ спискъ № 9. Путь нашъ идетъ вверхъ по ръкъ на з. къ перевалу чрезъ невысокій кряжъ, раздъляющій долины Аскыза, Б. и М. Еси. Путь идеть то открытыми лугами, то лиственничными рощами. Первые выходы осадочныхъ породъ встръчаются на спускь съ перевала въ долину М. Еси (краснобурый песчанникъ). 15-го, вечеромъ, прибыль я въ улусъ Кызыласова, заселенный сагайскими татарами дальне-каргинскаго рода, на берегу М. Еси. Въ окрестностяхъ улуса разсияно множество кургановъ. Здёсь я долженъ былъ разстаться съ моимъ вожакомъ, а потому я и рышился остаться въ улусы на нысколько дней до. прінсканія другаго до Таштыпа. По слухамь здёсь я могъ встрівтить хорошаго сказочника; кром'в того, мнв хот влось ознакомиться съ местными курганами, снять рисунки съ могильныхъ камней, такъ что остановку нельзя было считать потерей времени. Кстати скажу, что Кызыласовскій улусь—крайній заселенный пункть вверхъ по М. Еси въ направлении къ тайгъ; дальше въ глубь тайги не попадается и кургановъ. Въ улусъ я остановился у родственника моего вожака и былъ принятъ тамъ съ истинно патріархальнымъ гостепріимствомъ. Хозяинъ считалъ своею обязанностью принимать участіе во всёхъ моихъ занятіяхъ. Онъ водилъ меня по окрестностямъ, осматривалъ со мной курганы, и за З дня я успълъ перезнакомиться со всёми жителями улуса. Собранныя мною немногія свідінія о сагайских татарах я сообщу въ подробномъ отчетъ, рисунки же памятниковъ и тексты записанныхъ мною легендъ и сказокъ будутъ мною переданы въ

распоражение т. начальника экспедици. Въ улусъмнъ удалось значительно пополнить свое собрание изображений на могильныхъ камняхъ. Гораздо менфе гладко шла работа съ записываниемъ памятниковъ инородческой словесности. Переводчика, оказалось, трудно достать, такъ что мнъ удалось только при помощи нъсколькихъ лицъ записать легенду о происхождении вина и сказание о Канзабегъ. Отрывки послъдняго приведены въ статъъ князя Кострова о минусинскихъ инородцахъ, но, какъ кажется, полнаго текста его до сихъ поръ опубликовано не было.

19-10 голя утромъ я выбхалъ съ М. Еси въ Таштыпъ, куда и прибылъ въ тотъ-же день въ 4 ч. дня. Дорога идетъ чрезъ Б. Есь, Тею и Имекъ. Долины этихъ ръкъ раздъляются хребтами, идущими съ с. на ю. Хребты состоятъ изъ осадочныхъ породъ. По мъръ приближенія къ Таштыну, изъ подъ слоевъ краснобурато песчанника, наклоненнаго къ в., начинаютъ выступать темние песчанники. Около Имека изъ послъдней породы состоятъ цълия горы. Мъстность представляетъ открытую степь, только кое гдъ пересъченную небольшими перелъсками, гдъ преобладаетъ лиственница и береза.

Перетхавъ бродъ чрезъ р. Тею, мы остановились на 2 часа въ улусъ на ен берегу. Улусъ называется Усть-Челейскимъ. по р. Чели, впадающей въ Тею справа, а жителей улуса инородцы и русскіе крестять именемь джарыми-казактерь, т.-е. полуказаки, и они заслуживають этого названія. В'вроятно, благодаря смішенію съ русскими, они усвоили себѣ многія черты жизни послѣднихъ. Все население отъ мала до велика говорить на 2-хъ языкахъ. По-русски эни говорять лучше подгороднихъ минусинскихъ татаръ. Обыкновенно у инородцевъ женщины не говорятъ по-русски, если даже и знають этоть языкь: это считается неприличнымъ. Такое правило этикета соблюдается строго до нелъпости. Разъ мив пришлось встратить инородца, женатаго на природной русской казачкв, и она ни полслова не сказала со мной по-русски, а выбств съ темъ переводила своему мужу все, что я говориль, на татарскій языкь. Разговорь приходилось вести при помощи такого односторонняго, если такъ можно выразиться, перевода. Мои вопросы переводились по-татарски, хозяинъ давалъ реплику на томъ же языкъ, но хозника и не думала переводить её по-русски, предоставляя мий добираться до смысла сказаннаго какъ я знаю и только изръдка утвердительнымъ и отрицательнымъ киваніемъ головы давала знать: върно или невърно я понимаю ея супруга. Здёсь же у джарымъ-казактеръ, при входё въ юрту, хозяйка завела со мной бойкій разговоръ на русскомъ языкъ, пересыпая его прибаутками и поговорками не хуже разбитной горожанки. Я думаль, что она родомъ казачка, оказалась — чистыйшей инородкой, сагайкой изъ рода Томнеръ. Обстановка жилищъ у джарымъ-казактеръ чисто инородческая. Типъ, очевидно, смъшанный, - очень много облокурыхъ, но приплюснутые носы и широкія скулы выдають инородческую кровь. Костюмь представляеть дикую смёсь русскаго съ инородческимъ. Женщины – и тв мъняютъ свою традиціонную тюнику на м'єщанское женское платье съ гладкимъ лифомъ, застегивающимся на спинъ на крючки, но характерный инородческій способъ повязывать голову платкомъ, завязывая концы на затылокъ, въ общемъ употреблении. Этотъ улусъ единственный извъстный меж примъръ такого теснаго смъшенія двухъ культуръ. Близость русскихъ тутъ не причемъ: около Минусинска и въ 2-хъ верстахъ отъ Таштыпа я видълъ инородческія поселенія, сохранившія въ чистоть свой первобытный обликъ. Къ сожальнію, я не могь добиться сведьній о происхожденіи населенія этого улуса и пробыль въ немъ очень недолго, всего 2 часа.

Меня увъряли, что ни къ с., ни къ з. отъ Усть-Челейскаго улуса не встръчается древнихъ могилъ. Это утверждение я считаю очень въроятнымъ. Поднявшись отъ Теи на окаймляющій её хребетъ, мы спустились къ высокой степной равнинъ, носящей название Карой, ограниченной съ с. безъимянными холмами, а съ з. хребтомъ Тюбе-тасъ, идущимъ вдоль Имека. Такія равнины любили выбирать аборигены Минусинскаго округа для своихъ могильниковъ, но здъсь ихъ нътъ и слъда. Привычный глазъ невольно ищетъ ихъ на равнинъ, замъчается, что недостаетъ какого-то обычнаго аксессуара въ степномъ ландшафтъ. Спутникъ инородецъ тоже замътилъ мнъ на вопросъ—есть ли курганы между. Теей и

Таштыномъ, "если-бы здёсь жила Чудь, такъ ужъ навёрно-бы она наставила могилъ на Каров".

Въ Таштыпъ я переночевалъ и сдълалъ небольшую экскурсію въ окрестностяхъ села. Его уже столько разъ описывали путешественники, что я считаю себя вправъ не сказать о немъ ни слова. Съ Таштина я началъ собирать ботаническую коллекцію, надёнсь довезти растенія св'яжими до Абаканскаго завода и тамъ запастись необходимыми принадлежностями для сушки растеній (досками, пропускной бумагой и пр.). Съ устьевъ Баликсы я не могъ взять ничего подобнаго съ собой, во 1-хъ, потому что г. начальникъ экспедиціи самъ им'влъ эти приспособленія въ очень ограниченномъ количествь, и дальныйшій путь его лежаль по малонаселеннымъ мъстамъ, гдъ нечъмъ было пополнить истощенный запасъ бумаги, негдъ было заказать новыя доски; во 2-хъ, еслибы и была ему возможность подблиться со мною кое-чемь, я не могь-бы увезти предлагаемаго мнв. Моя лошадь должна была везти на спинъ, кромъ всадника, запасъ провизіи на 3 дня, котелокъ и кое-какія вещи дорожныя, и навьючивать её чэмъ-либо не было никакой возможности. Отделить лошадь отъ экспедиціи тоже было невозможно: въ доливъ Томи мы потерили одного коня, и остальные должны были нести его вьюкъ на себъ. Инструментовъ со мною тоже не было никакихъ. Вообще снарадиться скольконибудь сносно удалось мнъ только на Абаканскомъ заволъ, при содъйствіи владъльца его, г. Пермикина, которому и приношу за это искреннюю благодарность.

20-го гюля утромъ и выбхаль изъ села Таштыпа на Абаканскій заводъ. Лівний берегь р. Таштыпа состоить изъ красноватыхъ утесовъ слоистой глины съ примъсью извести. Между краснобурыми слоями попадаются прослойки глины зеленоватаго цвъта. Ниже села Таштинскаго красныя скалы сменяются желтоватыми, въроятно, известковими. Правый берегъ, на который мы перешли въ бродъ, состоитъ изъ низменной луговины, ограниченной высокимъ хребтомъ. Верстахъ въ 6 дорога подходитъ къ рѣчкѣ Бутракты, текущей въ р. Таштынъ справа. Близь дороги находится улусъ, заселенний бельтирами. Все взрослое население улуса было на свнокост, такъ что я съ трудомъ нашелъ человъка, у котораго могъ разспросить дорогу на Абаканскій заводъ. Дальнъйшій путь лежаль вверхъ по долинъ р. Бутракты. Слъва тянулись отроги хребта, образующаго водораздёль ключей, текущихъ въ рр. Абаканъ и Таштыпъ. Здісь идетъ колесный путь, проложенный г. Пермикинымъ. Чёмъ ближе поднимаешься къ перевалу, тёмъ всё гуще становятся лъса. Около перевала дорога поворачиваетъ вправо отъ р. Бутракты и затъмъ переходитъ въ долину рудной Кени, близь устья которой и расположенъ Абаканскій жельзодылательный заводъ. Последній расположенъ по прибрежной равнине Абакана, куда вытекаетъ и рудная Кеня изъ узкой горной долины. Два главныхъ рудника, питающихъ заводъ, лежатъ въ горахъ по лъвому берегу рудной Кени. Находима была руда и въ другихъ мъстахъ заводской дачи, но два упомянутыя мъсторожденія считаются больше благонадежными, и только онь и разработываются. Въ одномъ изъ нихъ залегаетъ среди змеевиковъ магнитный желъзнякъ, переслоивающійся съ чистымъ желъзнымъ блескомъ. Добыча руды производится въ полугоръ. Рабочіе ломаютъ глыбами магнитный желъзнякъ и потомъ спускають его по крутому склону горы въ ръчкъ, гдъ берутъ её на телеги и отвозятъ на заводъ. Понятно, что такимъ образомъ теряется масса руды непроизводи-

тельно. Около ломки и по склону горы лежать в массы мелкихъ обломковъ руды. Ширина рудной жилы и мощность ея не опредълены точно. На глубинв 11/2 аршинъ отъ гребня горы уже встрвчается руда и, по показанію владельца, прорезываеть гору вплоть до подошвы. Высоту хребта никакъ нельзя считать менье 400 футь. Несколько ниже по теченю Кени заложень рудникь, где побывается бурый жельзнякъ. Способъ добычи такой-же, какъ и въпервомъ. Руда лежитъ почти на поверхности горы, и, снявъ нетолстый слой осыпи и глины, рабочіе добывають руду кайлами и ломами. Заводчикъ утверждаетъ, что его руды даютъ, среднимъ числомъ, 50% – 60% чугуна. Заводъ работаетъ паромъ; при немъ имвется доменная и отражательная печи, вагранка и 4 паровыхъ молота. При 1 сварочной печи онъ можетъ ежедневно приготовлять до 400 пудъ сортоваго жельза; при 2-хъ сварочныхъ печахъ количество жельза, при усиленной работь, можеть быть доведено до 1000 пудъ въ сутки, но практически эта цифра никогда не достигается. Для обезпеченія заводскаго дъйствія, къ нему приръзана дача, заключающая въссебъ до 100,000 десятинъ луrobbenedeca.amzar rzumogoz zan bezoologi .can.

Съ заводомъ и его дачей мнѣ не пришлось ознакомиться сколько-нибудь подробно. Припадки лихорадки заставили меня потратить нъсколько дней на возстановление здоровья. Въ это время я рѣшался выходить только недалеко изъ дому и собирать растенія. Для ознакомленія съ заводской дачей необходимо было потратить около недѣли, а я не располагаль временемъ. Дожди и холода заставляли меня торопиться съ возложеннымъ на меня порученіемъ осмотрѣть р. Матуръ.

Кромв того и разсчитываль, что, по близости завода оть Минусинска (всего 200 версть по провзжему тракту), при томь горячемь сочувстви, съ какимъ относится ко всякимъ научнымъ предпріятіямъ владвлець завода, можно будеть, при случав, легко пополнить этотъ пробвлъ въ нашихъ изслъдованіяхъ. Однако, прежде чемъ проститься съ Абаканскимъ заводомъ, надо сказатъ нъсколько словъ о его современномъ состояніи. Изъ бъглыхъ замьтокъ уже можно видъть, что запасы руды въ дачъ громадни

и руда прекрасная. Размъры заводской дачи, громадные лъса по входящимъ въ нее ръкамъ Джебашу и Абакану съ ихъ притоками, при раціональномъ пользованіи, могутъ обезпечить заводъ горючимъ матеріаломъ на неопределенно-долгое время. Заводъ дежитъ въ узлѣ 3-хъ путей: на прінски лѣваго берега Томи и притоковъ Нижней Мрассы, на прінски по системъ верхняго Абакана и на дорогъ изъ Минусинскаго округа въ сойоты. Послъдніе ежегодно зимой спускаются съ хребта по р. Ант и являются въ заводъ продавать и менять продукты охоты и скотоводства на желъзныя издълія завода. Пріиски постоянно нуждаются въ послъднихъ. Если мъстний разонъ тъсенъ для производителя, заводъ стоитъ на сплавной ръкъ Абаканъ-прямомъ пути въ Енисей. Не смотря, однако, на такое ръдкое стечение благопріятныхъ обстоятельствъ, роль завода въ экономической жизни края незначительна. Изъ разговоровъ съ владъльцемъ и свъдъній, собранныхъ изъ другихъ источниковъ, оказывается, что развитію дъла на Абаканскомъ заводъ мъщали многія обстоятельства, къ числу которыхъ слъдуетъ причислить: долги, лежавшіе на заводъ, отсутствіе правильнаго мъстнаго кредита, недостатокъ корошихъ техниковъ-металлурговъ и целый рядъ другихъ факторовъ, неимещихъ ничего общаго съ естественными условіями данной м'єстности. Вообще, словно какой-то fatum тягответь надъ мъстною горною промышленностью. Попытки прошлаго стольтія водворить въ округь мъдноплавильное дело потерпели фіаско, не смотря на все жертвы и усилія правительства. Производству жельза тоже не везеть. Въ такъ называемой Ирбинской дачъ, судя по образцамъ Минусинскаго музен, имъются запасы отличной жельзной руды, и съ начала нын вшняго стольтія правительство хлопотало объ устройствъ тамъ завода, передало эту дачу на поссессіонномъ правъ въ частных руки на весьма выгодныхъ условіяхъ, а руда и по сей день лежить безъ дъла, но за то въ присутственныхъ мъстахъ немолчно скрипять перыя ради разрёшенія спорныхъ правъ разныхъ лицъ на Ирбинскую дачу. Привилось здёсь только золотопромышленное дёло, но и оно не въ блестящемъ состоянии. Абаканский заводъ дъйствуеть, но во всякомъ случат роль его въ промышленности страны вовсе не такова, какой она должна и могла-бы быть.

23-10 110лл я настелько оправился отъ бользни, что рышиль тронуться въ путь. На Матуръ съ завода можно попасть 2-мя дорогами: чрезъ село Таштынское по правому притоку Таштына, р. Сею, это прямой и самый навзженный трактъ; другой путь идетъ тайгой, по правому берегу Абакана, чрезъ пріиски на рр. Анзаси (притокъ Аны) и Кызаси, притокъ Абакана. Второй путь, болье долгій, объщаль быть болье интереснымь, почему я и остановился на немъ. Благодаря обязательности заводчика, г. Пермикина, я имъль въ своемъ распоряженіи вьючную лошадь, 2 дорожныхъ компаса и всв необходимыя приспособленія для собиранія и сушки растеній; все это дало мнь возможность точнье оріентировать мой маршруть (до сихъ поръ я опредъдяль направленіе моего пути только 2 раза въ сутки: въ полдень по кратчайшей тыни и вечеромъ по полярной звызды и не стысняться собираніемъ ботанической и петрографической коллекцій.

Перебравшись 23 го чрезъ Абаканъ и идущій вдоль его береговъ кряжъ, мы пересвкии р. Кулиджекъ, затвмъ, надвигансь къ ю.-ю.-в., вышли на берегъ притока Джебаша, Чеханъ (частые броды въ отчетахъ посланцевъ къ Алтынъ-ханамъ) и направились вверхъ по теченію рѣки. Мъстность всюду заросла густымъ сосновымъ лѣсомъ; преобладающей горной породой является здѣсь зеленовато-сѣрый глинистый сланецъ. Остановились ночевать на заимкъ казака Андрея Иванова Бавея, верстъ за 30 отъ завода, недалеко отъ впаденія рѣчки Карасюбе въ Чеханъ.

24-10 Поля. Путь нашь лежаль вверхь по Карасюбе, текущей здысь съ с. на в. Вдоль лываго берега ен идетъ невысокій горный кряжь, поростій лысомь. Верстахь вы 5-ти оть заимки пересыкли р. Канджуль, впадающую вы Карасюбе слыва; пройдя версты 7, встрытили правый притокъ рыки Чансаръ. Горы, окружающія рыку, норосли сосновымы и лиственничнымы лысомы. Кы полдню добрались до р. Мишиховой, впадающей вы Карасюбе слыва. Выше Мишиховой Карасюбе начинаеть склоняться кы ю., и мы, покинувыей, пошли вверхы по безыимянному ен притоку, остановились на ночлегь около истоковы безыимяннаро притока Карасюбе, у под-

ножін водораздільнаго хребта водъ, впадающихъ въ Карасюбе и Ану. 25-го Іюля. Поднившись на водораздёль Карасюбе и Аны, перешли въ долину другаго безъимяннаго ключа, впадающаго въ Ану. На западномъ склонъ водораздъла глинистый сланецъ смънилъ метаморфическій известнякъ, а за нимъ следовалъ тальковый сланецъ. Около полудня мы вышли на прибрежную равнину р. Аны, текущей здъсь съ ю. на с. Противъ безъимяннаго ключа въ Ану впадаетъ слева Е. Анзасъ Ниже Анзаса къ реке подходять высокія утесистыя гнейсовыя горы. На берегу ріки устроено зимовье золотопромышленникомъ п Спиридоновымъ, единственное осъдлое поселение на Анъ. Ръка здъсь шириною около 30 саж. В. Анзасъ, утесистая и извилистая ръка, течетъ среди тальково-сланцевыхъ утесовъ. Большее число притоковъ его съ лъвой стороны: Справа принимаетъ онъ только: 2 безъимянныхъ ключа и р. Койзасъ, впадающую въ него противъ лъваго притока В. Анзаса, Чебалсука, на которомъ лежитъ Михайловский прискъ, арендуемый г. Спиридоновымъ. Между Чебалсукомъ и устьемъ Б. Анзаса, въ последний впадають слева: Березовая, Сагалсукъ, Торахъ-атъ н нъсколько небольшихъ безъимянныхъ ключей. Отъ устья до пріиска идетъ выочная тропа, переходящая 6 разъ съ одного берега на другой. По берегамъ Б. Анзаса теса состоять изъ кедровъ и пихты, мъстами попадаются березовыя рощи. На прискъ, на берегу Чебалсука, попаль я поздно вечеромъ.

26-10—дневка на Михайловскомъ прінскъ. Мъстность чрезвычайно дикая и угрюмая. На мъсть сліннія 3-хъ ръкъ—Койза, Б. Анзаса и Чебалсука—сходятся концы раздъляющихъ ихъ хребтовь. Золотая розсыпь замъчательна тъмъ, что нъсколько лътъ тому назадъ, при разработкъ, снявъ около 3 арш. верхняго пласта, встрътили толстый слой конскаго навоза. Разгребая послъдній, нашли въ немъ нъсколько паръ желъзныхъ стремянъ, а нъсколько выше этого мъста, по Чебалсуку, нашли пару серебряныхъ сосудовъ. Гдъ теперь эти находки, мнъ достовърно узнать неудалось. Слышалъ я, что онъ были отправлены покойнымъ владъльцемъ прінска, П. И. Кузнецовымъ, въ Императорское Геотрафическое Общество. Во всякомъ случать онъ могутъ служить

нагляднымъ доказательствомъ новъйшаго происхождения нъкоторыхъ минусинскихъ золотоносныхъ розсыпей. Примъръ подобнихъ находокъ не единственный изъ извъстнихъ мнъ.

27-10 Іюля вь 3 ч. выбхаль я изъ Михайловскаго пріиска. На берегахъ Чебалсука, подъ тальковымъ сланцемъ, залегаетъ роговообманковый, но вверхъ по Анзасу его смѣняетъ глинистый сланецъ. Дорога шла сначала по Б. Анзасу, затѣмъ по лѣвому безъимянному его притоку, среди крутыхъ горъ, заросшихъ черной тайгой. При вершинѣ безъимянный ключъ дѣлится па 2 вѣтви: одна, западная, текущая изъ водораздѣла Малаго Абакана и Аны, другая, сѣверная, беретъ начало на склонахъ горы Шаманъ, раздѣляющей воды Б. Кызаса и Анзаса. Дождъ и сумерки заставили насъ остановиться ночевать, не доходя подножія Шамана, среди густой тайги. Безъимянный ключь превращается здѣсь въ бѣшеный горный потокъ, текущій по уступистому ложу, перегороженному и заваленному обломками скалъ.

28-10 Люля. Не далже 2-хъ верстъ отъ нашего ночлега вышли изъ тайги къ истокамъ безъимяннаго ключа у подножія Таскыла Шаманъ. Заросшіе травой склоны его у гребня почти лишены растительности. Только кое-гдъ темними пятнами выступають группы низкорослыхъ кедровъ. Шаманъ-пѣлый хребетъ. Подъемъ идеть на съдловину, а направо и налъво отъ нея поднимаются высокія сопки; правая называется Чамань, левая собственно Шаманъ; далъе къ западу опять съдловина, за которой виднъется двуглавая коническая сопка "Два братца". На картъ Мейена, на томъ мъстъ, гдъ находится хребетъ Шаманъ, обозначены отроги хребта Чукчуть, водораздёла Аны и М. Абакана, но этого названія я не слыхаль ни отъ кого. Вообще здесь много урочищь безъ названій. Шаманъ состоить изъ пластовъ различныхъ видовъ глинистаго сланца, подробно перечисленныхъ въ моемъ объяснительномъ спискъ. Особенность не только хребта Шаманъ, но и всёхъ окрестныхъ горныхъ системъ - наклонность образовать цирки или круговыя долины, съ крутыми боками и узкой горжей. Нервдко въ горже встречается прозрачное горное озеро. Переваливъ чрезъ съдловину Шамана, мы встрътили у подножья ея такое озеро;

изъ него течетъ небольшой безъимянный горный ключь, впадающій въ Б. Кызасъ. Шаманъ-висшая точка въ окрестностяхъ. Къ с.-в. отъ Чалпана хребетъ понижается и соединяется низкой съдловиной съ высокимъ хребтомъ Хан-сынъ или Кан-сынъ, идущимъ между устыями Б. Кызаса и Аны. Вышеупомянутая съдловина между Кансыномъ и северовосточнымъ продолжениемъ Шамана служить водораздёломъ между Б. Кызасомъ и М. Анзасомъ. Северные склоны Шамана покрыты никогда нетающимъ снъгомъ. Отдохнувши у красиваго горнаго озера, у подножія Шамана, окруженнаго раскидистыми кедрами и альпійской травяной растительностью въ полномъ цвъту, мы стали спускаться по безьимянному ключу, впалающему въ Кызасъ. Ручей течетъ сначала на съверъ, потомъ поворачиваетъ на з.-с.-з. Дорога идетъ густой пихтовой и кедровой тайгой. Неуклюжій каменникъ, осыпавшійся со склоновъ сосванихъ горъ, чередуется съ сврыми болотистыми лугами. Вообще переваль чрезъ Шаманъ и переходъ отъ Анзаса до Кызаса представляетъ одну изъ самыхъ дикихъ таежнихъ мъстностей, какія мнв случалось видеть. Въ 3-хъ верстахъ отъ впаденія безъимяннаго ключа въ Кызасъ расположенъ Троицкій пріискъ Кузненовыхъ. Уже темнъло, когда мы провхали его и поздно вечеромъ добрались до главнато прінска Кузнецовыхъ-Пророкоильинскаго на Б. Кызасв.

Съ 27-го поля по 4-е августа и пробыть на Кызасъ, дълая экскурсии по окрестностямъ, о которыхъ послъдовательно сообщу въ общихъ чертахъ. Пророкоильинскій пріискъ, какъ сказано выше, стоитъ при впаденіи Безимянки, текущей съ Шамана въ Кызасъ. Собственно подъ именемъ Б. Кызаса извъстна цълая система 3-хъ ръкъ, сливающихся въ одно русло. Потокъ, текущій съ съдловины между Шаманомъ и Кан-сыномъ, названъ правой вершиной Кызаса; съ нимъ сливается ръчка, берущая начало съ хребта Шаманъ на с.-в. отъ Чалпана (одной изъ вершинъ Шамана), это средняя вершина Кызаса; третья вершинъ Б. Кызаса лежитъ на с.-в-ныхъ склонахъ сопки "Два братца", она называется лъвой вершиной; въ нее течетъ Безимянка съ съдловины Шамана и на ней лежитъ вышеназванный пріискъ. Ниже Безимянки впадаетъ

въ лѣвую вершину Кызаса Веселый ключь, текущій съ с. на ю. Веселый и Пророкоильинскій прінски считаются самыми богатыми въ Минусинской и пограничныхъ тайгахъ. Веселый, принадлежащій г-жѣ Цивульской, уже выработывается, а Пророкоильинскій и въ нынѣшнемъ году далъ около 30-ти пудъ золота. Розсыпи залегаютъ на пластахъ чернаго глинистаго сланца. Толщина шурфовъ, т.-е. наносовъ несодержащихъ золота, мѣняется отъ 6 до 16 арш.; золотосодержащій пластъ варьируется отъ 3 до 6 арш. Наносы состоятъ изъ охристой глины съ сланцевыми гальками; содержащими кубики сѣрнаго колчедана. Встрѣчается также и желѣзистый конгломерать.

Троицкій прінскъ, лежащій по безъимянному ключу, гразработиваетъ розсыпь, лежащую на пластахъ глинистаго сланца. Здёсь, кромѣ розсыпнаго золота, есть и жильное. Линію простиранія сланцевъ пересвкають жили желтоватаго, охристаго кварца, въ которомъ вкраплено золото, но разработку его владёлецъ считаетъ невыгодной. Достойно замѣчанія, что какъ на Троицкомъ, такъ и на Пророкоильинскомъ прінскахъ, а также и на склонахъ Шамана, нерѣдко попадаются между пластами сланцевъ прослойки кварца, параллельныя напластованію коренной породы, но въ нихъ, не смотря на поиски, до сихъ поръ никому не удалось открыть слѣдовъ золота.

Зо-то Ітома я рёшилъ сдёлать экскурсію на хребеть Кан-сынъ. Дорога идеть чрезь Веселый прійскъ. Перебхавь въ в. -ю.-в. направленій чрезь невысокій хребеть и затёмъ повернувь къ с., мы, сдёлавь всего около 8 версть, прибыли къ Петропавловскому прійску гг. Должниковыхъ на Ср. Кызасв. Хозяйнъ прійска, г. Должниковь, хорошо знающій м'єстность, присоединился къ на-шей экскурсій. Выбхавъ съ прійска, мы тропулись по притоку Ср. Кызаса справа, по Миромобивому кмочу и пересёкли потомъ невысокій хребеть, разділяющій среднюю вершину Кызаса отъ правой. Путь все время шель въ в.-с.-в. направленій Въ томъ же направленій продолжали мы его вверхъ по правому Кызасу. Преобладающей породой является на всемъ пути глинистый сланець. Древесная растительность состоить почти исключительно изъ пих-



ты, ели и кедра. Среди травяной растительности всюду старыя: знакомыя: Aconithum Licocthonum, Delphinium elatum, а при началь подъема, на съдловину водораздъла М. Анзаса и Кызасовъ сплошныя заросли Veratrum album. Съ съдловины крутой подъемъ къ с. къ одной изъвысочайшихъ точекъ Кан-сына. Лъса скороначинають різдіть, среди луговь показываются горныя растенія. (Rhododendrou chrisanthum) и цвътущія въ равнинахъ ранней весной (Trollius asiaticus). Глинистый сланецъ смёняется выходами зеленокаменныхъ породъ. Въ этотъ день, благодаря сильному. туману, я немогъ подняться на вершину Кан-сына. Въ 2-хъ шагахъ не было ничего видно, и остатокъ дня пришлось провести почти совершенно въ бездъйствии. На слъдующий день ясное утро вознаградило насъ. Мы отправились до вершины уже пъшкомъ, пробирансь, кто какъ умћетъ, по сыпучему діоритовому щебню. Горизонтъ съ вершины Хан-сына обширнъе, чъмъ съ Шамана. Последній не закрываеть отъ зрителя далекихъ снежныхъ вершинъ Саянскаго хребта, въ которыхъ я последовательно отметиль, по указаніямъ проводника, вершины Б. и М. Абакана и Аны. Кромѣ этихъ вершинъ, виднихъ съ Шамана, съ Хансина откривается обширный видъ на с. и в., закрытый съ Шамана массивомъ Хансына. Здёсь я увидёль церковь с. Таштыпскаго, Аскызскія степи, горы Сохчасъ въ вершинахъ р. Аскыза и Кюль-тайгу въ вершинахъ М. Таштыпа. Кан-сынъ, какъ и Шаманъ, представляетъ собой цълый рядъ кольцеобразныхъ цирковъ, соединенныхъ между собою съдловинами. Внутри котловинъ небольшія горныя озера, изъ которыхъ текутъ горныя ръчки, круго падающія въ Абаканъ. Мы находились не на высшей точкъ кребта; послъдняя лежала отъ насъ на в. верстахъ въ 10-ти, недалеко отъ устья Аны. Наша была вторая по высоть. Вершина хребта представляеть собою груды безъ связи лежащихъ обломковъ діоритовихъ скалъ. Отдельность породы по большей части сплошная, но въ одномъ мъстъ, на в. отъ нашей вершины, надъ озеромъ, изъ котораго витекаетъ ра Куской, и пашелъ цълые утесы въ нъсколько сотъ футъ вышиною, состоящіе изъ породы съ зам'тательно правильной призматической отдъльностью. Вся скала состоить изъ стрыхъ вертикальныхъ

столбовь, стоящихъ другъ на другъ, величина ихъ мъняется отъ 7' до нъсколькихъ дюймовъ; эта порода служила цёлью моей по- вздки на Кан-сынъ. Въ моей коллекціи она значится подъ № 44 и названа зеленокаменнымъ порфиромъ. Въ полномъ моемъ отчетъ я остановлюсь подробнъе на ней и опишу условія ея залеганія, здѣсь же достаточно будетъ замѣтить, что данная порода постепенно теряетъ, по мѣрѣ удаленія къ з. и ю., свою столбчатую отдѣльность, сохраняя въ то же время неизмѣнными остальные свои признаки. Откладывая также до обработки своего полнаго отчета другія свѣдѣнія о Кан-сынѣ, упомяну только, что на сѣверномъ и южномъ склонахъ высочайшихъ вершинъ этого хребта лежитъ нетающій снѣгъ.

31-10 1юля вечеромъ мы были на Петропавловскомъ прінскъ, откуда старой дорогой возвратились на Пророкоильинскій прінскъ. Кстати упомяну, что Петропавловскій прінскъ находится близь сліянія правой и средней вершинъ Б. Кызаса. Разстояніе отъ вершины Хан-сына до Пророкоильинскаго прінска считается 20 вер.

1, 2 и 3-е Августа и употребиль на повздку на Крестъ-таскиль, снъжную вершину хребта, лежащаго между долинами львой бершины Кызаса, М. Кызасомь и М. Абаканомь. Этотъ хребеть носить тотъ же петрографическій характерь въ общемь и тотъ же навітия, какъ Шаманъ и Хан-сынъ. Петрографическія же подробности и здісь, какъ вездів въ этомъ отчеть, намічаю только въ общихъ чертахъ, отлагая болье детальное описаніе до представленія подробнаго, а потому и ограничиваюсь лишь упоминаніемъ о ней. Крестъ-таскыль считается однимъ изъ лучшихъ містъ для охоты за изюбромъ (Cervus elapsus); для путешественника онъ интересенъ по своей панорамъ М. Абакана и его притоковъ.

4-10 Августа я выбхаль съ Пророкоильинскаго пріиска съ цілью бхать на Матуръ для выполненія возложеннаго на меня порученія. Путь идеть по лівой вершинь Кызаса. Почти устье противъ устья впадають въ неё Веселый Ключь справа и Успенскій сліва, а въ версть ниже долина ихъ замыкается горами. Ниже по рікть петрографическій характеръ містности міняется. Мало развитые по нижнему теченію Кызасской Безимянки, сірые известняки получаютъ здёсь преобладаніе. Близь сліянія средней и лёвой вершинъ Кызаса встрвчается зеленый глинистый сланецъ, покрытый превосходными дендритами (№ 51 коллекціи). Здёсь же находится 3-й прінскъ Кузнецовыхъ-Митрофаніевскій. До этого прінска и версты 4 ниже его Кызасъ бурно течетъ на з.-с.-з. Ниже ръку перегораживають пороги, после которыхъ теченіе поворачиваеть на с. Мъстность представляеть дикое горное ущелье. Издали можно замътить и догадаться, что предъ вами уже не тъ геологическія образованія, которыя съ утомительнымъ однообразіемъ тянутся отъ Абаканскаго завода до М. Абакана, а въроятно и дальше къ по. и в.1). Вийсто прозаическихъ и однообразныхъ выходовъ глинистаго сланца, видны всюду причудливын вершины, напоминающія то развалины зданія, то фантастическія человіческін фигуры. Ниже пороговь до устья идеть цалал серія известковыхъ кристаллическихъ породъ, темнострыя, розоватыя и бълыя. Вътодномътизъттакихътутесовът и розыскалът пещеру, состоящую изъ нъсколькихъ кавериъ, соединенныхъ узкими ходами. Осмотрввъ ихът насколькот былоп возможно безъ веревокъ и другихъ приспособленій дли спуска по вертикальнымъ колодцамъ, на не нашель, въ ней ни следовъ обитанія человека, ни костей живот-ш ныхъ. Около устья Кызаса его долина расширяется; въроятно, это старая дельта реки, заросшая теперы густымъ вековымъ лесомъ. Съ осмотромъ пещеры в потратилъ много времени и потому не п успаль добраться до Матура, а заночеваль на Кузнецовскомъ зимовьк на левомъ берегу Абакана. Последній сохраняеть здёсь характеръ большой и многоводной рвки не менве 80 с. ширины, и въ бродъ онъ непроходимъ изпајо виз

5-10 Августа переходъ отъ зимовья до перваго матурскаго инородческаго улуса. Дорога идетъ сначала берегомъ Абакана, потомъ чрезъ прибрежныя горы къ с.-в. на равнины нижняго теченія Матура. Сърый и бълый кристаллическій известнякъ смъняются знакомой минусинской горной породой краснобураго пес-

¹⁾ Кром'й вившняго вида горъ, видинныхъ мною ва М. Абаканомъ съ Кресть-таскила, и им'ю ийкоторыя св'ядкий объ этой м'ястности отъ горнаго инженера Маюрова, производиншаго тамъ поиски золота:

чанника. Общій habitus м'ястности также изм'яняется. Вичето утесовычи скаль здёсь попадаются горы округлой формы, сплоть заросшія смішаннымь лісомь. Містами господствують береза и осина. Подъвзжая въ Матуру, видишь передъ собою широкую луговину и высокіе безлісные или поросшіе березникомъ холмы. между которыми виднаются пашни. Глазъ невольно ишеть жилья и, наконець, съ ближайшаго пригорка открывается цёлый рядъ улусовъ по Матуру и его притокамъ. Между инородческими юртами видивются и избы русскихъ крестьянъ. Приволье луговъ и пашень по Матуру не ускользнуло отъ зоркаго глаза русскаго крестьянина. Несколько семей и теперь арендують тамъ землю у Алтайскаго горнаго въдомства и сбывають хлъбъ и съно на пріиски. Я остановился у одного изъ нихъ, Максима Вашкинцева, поставщика съна, хлъба и бересты на пріиски Кузнецовыхъ. Онъ не можеть достаточно нахвалиться привольемы и плодородіемы Матурскихъ земель. Осмотръвши ихъ лично впослъдствии, я убъдился, что здёсь, гдё ныне обитаеть до 50 семей инородцевь, легко нашлось-бы мъсто для нъсколькихъ сотъ семей переселенцевъ земледъльцевъ.

6-е Ависта. Отъ матырскихъ татаръ и узналъ, что 3-го автуста съ береговъ р. Кулявы прошла въ Таштыпъ экспедиція, которую провели съ р. Мрассы татары по Матуру. Изъ описанія состава ея для меня было ясно, что это быль г. Адріановъ. Это извъстіе опечалило меня и поставило въ затрудненіе. Измѣненіе маршрута показывало, что попытка пробраться съ Мрассы въ вершину Абакана неудалась. Кромъ того Матуръ билъ пройденъ и идти мнв туда было незачемь. Въ виду этого я решился пройти по самому крупному притоку его, Магазъ, и, осмотръвъ нижнее теченіе Матура, спуститься на плот'в или въ лодк'в отв устья его по Абакану до завода. Сухимъ путемъ мнъ пришлось бы идти по следамъ экспедиціи и повторять сделанный уже маршруть. Можно было-бы попытаться пройти до верховьевъ М. Абакана, но на это у меня не хватило-бы ни средствъ, ни припасовъ, да и лошадь моя почти уже окончательно отказывалась служить, такъ что для повадки по Магазв и взиль кони у Башкирцева, а на выочную тосадия проводника. Настехно проинкую производника.

Матуръ выше улуса течетъ съ с., но выше р. Кулявы направленіе его идеть съ с.-з. на ю.-в. Верстахъ въ 6-ти выше улуса въ него впадаетъ Магаза. Мъстность ровная, покрытая хвойными перелъсками и лугами. Передъ сліяніемъ Магаза и Матуръ текутъ нъсколько времени въ общей долинъ подъ очень острымъ угломъ другь-къ-другу, но около устья ръчки Пурлуэ, впадающей въ Магазу слева, последния отклонилась отъ Матура и течетъ здесь съ с.-с.-з. на ю.-ю.-в. Пространство между Матуромъ и его главнымъ притокомъ наполнено горными кряжами, заросшими густой тайгой. По Пурлуэ кончаются поселенія инородцевъ. Верстъ на 8 выше стоить одинокая юрта татарина, любителя уединенія, вотъ уже 30 льть живущаго среди тайги, а далье идеть сплошная, непроглядная черная тайга. У Матурскаго улуса въ горахъ встръчается сърый слоистый песчанникъ, выше по Магазъ его смъняетъ краснобурый, степной минусинскій песчанникъ, покрытый стро-лиловыми слоистыми мергелями. Первую кристаллическую породу по Магазъ встрътилъ я верстахъ въ 30-ти отъ ея вершины по р. Кызылталых, правому ел притоку. Выше встричается зеленовато-сърый глинистый сланецъ, но вообще въ горахъ по Магазъ мало обнаженій. Въ галькъ попадаются обкатанные куски глинистаго сланца, и полевошпатоваго порфира, но гранита нътъ. Выше Кызылталыха впадаетъ съ той же стороны въ Магазу рѣчка Иларсы. Выше последней Магаза делится на 2 ветви; одна идетъ на с. въ истовамъ В. Таштыпа, другая на з. Западная снова дълится на 2 вътви, вершины которыхъ лежатъ въ хребтъ водораздела Матура и Кобырсука, притока Мрассы.

7-го Августа поздно ночью вернулся я съ Магазы въ Нижнематурскій улусъ. 8-го явился ко мнъ татаривъ сказочникъ Пистонъ Кызыргашевъ, и я проработалъ съ нимъ цѣлый день, записавъ 3 сказки и 1 легенду о томъ, кто былъ первый шаманъ.
Здѣшніе татары переселенцы съ Мрассы. Недавно перемерли старики, помнившіе еще прежнюю родину. По свѣдѣніямъ лѣсничаго Абаканскаго подлѣсничества, въ вѣдѣніи котораго находятся
лѣса по Матуру и Магазѣ, инородцевъ здѣсь считается до 50 семей, разбросанныхъ въ разныхъ мѣстахъ. Пробуютъ они занимать-

ся земледёліемъ, но ихъ пашня возбуждаетъ улибку презрёнія въ русскомъ мужикъ. Зато звёропромышленники они первоклассные. Таштыпскіе казаки, сами хорошіе охотники, увёряли меня, что минусинскіе инородцы "ничего не стоятъ противъ матурскихъ татаръ въ тайгъ". Жаль только, что плодами своей охоты инородцу рёдко приходится пользоваться. Съ хорошимъ охотникомъ русскіе крестьяне часто устраиваютъ такую спекуляцію. Даютъ инородцу ружье, порохъ и свинецъ съ тъмъ, чтобы онъ охотился изъ-полу, т.-е. половина добычи идетъ инородцу, а другая его благодътелю. Мой вожакъ Магный Егоръ Кызыргашевъ попалъ въ такую кабалу за 10 руб. и 2 фун. пороху. Простякъ считалъ себя въ долгу у хозяина и съ щепетильною аккуратностью отдавалъ ему половину добычи, хотя, по его словамъ, онъ въ одну весну добываетъ 3—5 паръ оленьихъ роговъ, изъ которыхъ каждая, на худой конецъ, стоитъ 30 руб.

9-го Авгиста я провхаль по Кулявь и впадающимь въ неё рвикамъ. Вся мвстность на с. в. отъ Матурскаго улуса состоитъ изъ невысокихъ и плоскихъ холмовъ, покрытыхъ рѣдкими сосновыми и березовыми рощами. Этотъ уголокъ можетъ вскружить голову завзятому пахарю. Сопровождавшій меня Максимъ Башкирцевъ безпрестанно восклицалъ: "вотъ гдв-бы заимку поставиты! Вотъ гдъ-бы деревня вышла хорошая!" Восклицанія эти, однако, долго останутся безплодными. Въ собственность крестьянамъ-переселенцамъ этихъ земель неуступять, такъ какъ онъ принадлежать къ Алтайскимъ кабинетскимъ дачамъ. Арендная плата невысока, всего 40 коп. за десятину, но въ аренду переселенецъ беретъ землю неохотно. Онъ идетъ въ Сибирь, чтобы найти "вѣчный участокъ" и обезпечить будущее для себя и потомства, а арендная плата разрушаеть самую дорогую его иллюзію, иллюзію собственности. Онъ разсуждаетъ такъ: "гдъ берутъ 40 коп., тамъ могутъ взять впоследствии и 10 р. Мы оставили родительскія могилы, чтобы успокоить себя и внуковь своихь, а съ этой арендой имъ придется рано или поздно идти мыкать горе на чужую сторону".

10-10 Августа на устъв Матура уладили лодку; я отправиль съ инородцемъ берегомъ своихъ искалъченныхъ лошадей на Абаканскій заводъ, а самъ ръшилъ сплыть туда же по Абакану. Приближансь къ устью Матура, мы снова, послѣ глипистыхъ сланцевъ, известняковъ и мергелей, встрвчаемся съ краснобуримъ песчанникомъ. Отъ удуса р. Матуръ версты три течетъ съ с. на то, а потомъ поворачиваетъ на в. Въ верств ниже этого поворота и встричаются выходы краснобурыхъ слоистыхъ песчанниковъ и сопровождають рыку до устыя. Недостатокъ обнажений не даль мнъ возможности прослъдить развитие мергелей и известняковъ на нижнемъ Матуръ. Изъ объяснительнаго списка (ММ 60, 60а и 61) читатель усмотрить, что напластование ихъ весьма запутанное, но краснобурый песчанникъ, повидимому, не принимаетъ участія въ пертурбаціяхъ, перепутавшихъ пласты соседнихъ породъ, онъ всюду сохраняеть одно и тоже ю.-з.-с.-в. простирание и падение къ с. з. Лица, находящіяся теперь на Матурь, объщали мнъ доставить весною несколько образчиковъ породъ изъ техъ месть, которыя я не имълъ возможности осмотръть самъ, а потому я ограничусь однимъ указаніемъ на петрографическій характеръ містности, разсчитывая впоследствии остановиться подробнее на этомъ предметь. Краснобурый песчанникъ представляеть очень развитую, очень интересную и загадочную породу Минусинскаго округа и восточнаго Алтая. Онъ лежитъ между девонскими известняками и пластами каменноугольнаго песчанника, признаннаго профес. Шмальгаузеномъ за нижній ярусь формаціи каменнаго угля. Ни одному геологу не удалось открыть надежныхь окаменвлостей въ краснобуромъ песчанникъ, и возрастъ его можно опредълить лишь на основании стратиграфическихъ соображений, что, въ свою очередь, послужить средствомь опредълить эпохи многихъ поднятій и выходовъ изверженныхъ горныхъ породъ въ мъстности. Изъ имъющихся у меня сведеній, я знаю, что этоть песчанникь распространиется далеко вглубь восточнаго Алтан по долинь Абакана и Матурская долина далеко еще не самый западный его предълъ.

На усть в Матура построенъ былъ когда-то кожевенный заводъ, но несколько леть тому назадъ онъ сторелъ. Золотопромышленники Кузнецовы выстроили здесь несколько домовъ; въ одномъ изъ нихъ живетъ приказчикъ, завъдующій ихъ дёлами и сношеніями съ матурскими татарами.

Лодка, на которой мий предстояло плыть, не взяла-бы приза въ рѣчномъ яхтъ-клубъ. Долбленый осиновый челнъ, очень узкій и, къ тому же, кособокій. Чтобы придать ему какую-нибудь устойчивость, пришлось привязать къ нему раму изъ 4 бревенъ, и эта лалья преспокойно прошла чрезъ пресловутые абаканскіе пороги, о которыхъ мнв насказали столько ужасовъ. Пороги встрвчаются предъ впаденіемъ Аны и верстъ 10 выше Абаканскаго завода. Русло Абакана извилисто; течетъ онъ среди высокихъ и утесистыхъ горъ, съ которыхъ въ него падають гремуче ключи. Почти на каждомъ шагу встръчаются шиверы и переборы. Русло его рисуется мнв въ видв пологой наклонной плоскости, на которой сдълано нъсколько выемокъ и короткихъ уступовъ. Скорость теченія очень неровная: въ глубокихъ містахъ несеть сравнительно тихо, на мелкихъ перекатахъ, наклоненныхъ внизъ по теченію, рябить вь глазахь оть мелькающихъ мимо галекъ на див. Зеленокаменныя породы преобладають между Матуромъ и Аной. Ниже последней, около устья р. Кирченекъ, впадающей справа, встречаются кристаллическіе известияки; здёсь же я нашель и признаки мѣдной руды: При помощи буссоли мнѣ удалось съ лодеи снять теченіе Абакана между заводомь и устьемь Матура. По моимъ даннымъ, кривая Абакана нъсколько отличается отъ начерченной на картъ Мейена, а потому къ подробному отчету будетъ приложена карта этой части рвки. Не вдавансь въ тонографическія подробности, считаю здісь же нужнымь исправить нікоторыя неточности въ названіяхъ урочищь на карть Шварца. Онъ помъщаетъ хребетъ Кан-сынъ между Таштыпомъ и Абаканомъ, а хребетъ Кырсэ на лъвомъ берегу послъдняго, между Аной и Джебашемъ. Кан-сынъ, какъ уже было мною замѣчено, проходитъ оть устья В. Кызаса до Аны по правому берегу Абакана. Кырсэ симметрично расположенъ съ нимъ на лѣвомъ берегу, къ в.; въ углу между Таштыномъ и Абаканомъ онъ переходить въ хребетъ рудной Кени. Между Аной и Джебашемъ лежитъ хребетъ Тилремь, около последникъ пороговъ на Абакане поворачивающій къ ю. в. и понижающисям дочету он ц

. 11-10 Августа въ 5 ч. дня приплылъ я въ Абаканскій заводъ.

Здесь н узналь, что начальникь экспедиціи вышель извозавода по дорогь въ пограничному хребту Шабань-Дабага. Въ оставленномъ письмъ г. Адріановъ поручиль мнъ немедленно отправиться на Узунжуль, по дорогъ заняться преимущественно петрографическими наблюденіями и пріобръсти нъкоторыя вещи по его указанію для этнографической коллекціи экспедиціи. При помощи заводскаго ветеринара-самоучки мнж удалось къ 15-му августа настолько поправить своего коня, что на немъ можно было снова двинуться въ путь. Меня вызвался сопровождать до Таштына отставной казачій офицерь В. Е. Байкаловь и помочь, въ качествъ переводчика, при собираніи этнографическихъ матеріаловъ. Онъ провель со мною целый день на Бутрахте и въ Таштыпе, разъискивая знакомыхъ татаръ; но, не смотря на это, свъдънія удалось собрать счень скудныя. Шаманъ, который согласился проделать предо мной процессъ камланія, оказался очень не искусснымъ. Отбирая у него свъденія о редигіозныхъ воззреніяхъ Бельтиръ, я непремънно впаль-бы въ грубыя ошибки на основании его показаній, если-бы г. Байкаловь, близко знакомый съ бытомь татарь, не останавливаль молодаго шамана и не указываль промаховь, въ которыхъ инородецъ тотчасъ-же сознавался.

17-го изъ Таштыпа я направился въ Аскызъ. Мић нуженъ быль переводчикъ, и а котель просить учителя Аскызскаго инородческаго училища Николая Федоровича Катанова помочь мић въ моихъ занятихъ. По дороге въ Аскызъ я заезжалъ въ улусы, но почти никого не заставалъ дома. После дождей наступило сухое время и все население занято было сенокосомъ. Попытка привлечь г. Катанова къ занятимъ оказалась неудачною. Не смотря на полную готовность помочь мић, и онъ, подобно другимъ, былъ занятъ по-горло; кроме того, уже оканчивались летния каникулы, и ему нельзя было отлучиться изъ села.

18-го Августа я покинулъ Аскызъ и пробрался на р. М. Есь къ своему старому знакомому Кызыласову. По дорогъ и у Кызыласова я собралъ нъкоторыя свъдънія о сагайцахъ, но памятниковъ народной словесности такъ и не удалось записать, благодаря не-имънію переводчика. Мъстность эта уже была описана столько разъ,

что въ краткомъ отчетъ я считаю возможнымъ обойти модчаніемъ эту часть пути.

21-го числа и съ М. Еси снова попалъ на р. Аскызъ въ Ондеревскій улусь, стоящій при устью рычки Клого. Здысь находится утесъ Иней-тасъ или, по-русски, "Каменная старуха", которому татары приносять ежегодно жертвы. Своею формою онъ нъсколько напоминаетъ закутанную съ ногъ до головы фигуру женщины. Около утеса есть площадка, огороженая камнями, усыпанная пескомъ и заставленная грубыми изваннями животныхъ. Татары незнають съ какихъ временъ стоять тамъ эти игрушки. Они върять, что некогда Иней-тась была живымь человекомь, а игрушки - скотъ, окамен в шій вм вств со своей влад влицей. Никакой легенды по поводу этого памятника мнв не удалось узнать, но уваженіемъ Иней тасъ пользуется громаднымъ. Ни одинъ тата: ринъ не пробдетъ мимо утеса, не бросивъ несколько капель вина въ честь его. Сменться, громко говорить, проезжая мимо Инейтаса очень опасно, - можеть постигнуть несчастие въ дорогь, чему было немало примъровъ. Мой спутникъ только послъ настойчивыхъ просьбъ решился указать мне место, где находится утесь, но на отръзъ отказался посмотръть его виъсть со мной поближе. Чтобы ознавомиться съ Иней-тасъ поближе и осмотрѣть изображенія животныхъ, я долженъ былъ сделать съ Узунжула особую поъздку, цъль которой отъ татаръ сосъдей содержалась въ величайшемъ секретъ. Мнъ удалось тогда захватить съ собою нъсколько образчиковъ изображеній изъ камня отъ Иней-тасъ. Рисунки ихъ, равно какъ рисунки Иней-тасъ, въ числъ прочихъ этнографическихъ матеріаловъ, будутъ переданы г. Адріанову.

Рѣчка Кюю впадаеть въ Аскызъ слѣва верстахъ въ 8 ниже праваго притока Аскыза, рѣчки Бай, о которой упоминалось въ началѣ отчета. Начало ен въ горномъ массивѣ Сарыхъ-дагъ; съ сѣверо-западныхъ склоновъ послѣдняго течетъ въ Аскызъ р. Сиря, впадающая въ него противъ Бая, съ восточныхъ р. Бей, правый притокъ Базы. Дорога идетъ вверхъ по Кюгъ, пересѣкаетъ Бей и Базу и идетъ вверхъ по лѣвому притоку послѣдней, Ческому. Честолъ имѣетъ общую вершину съ Узунжуломъ и Немиромъ въ горѣ

Козоякъ. На Узунжулъ я нашелъ пріють на пріискъ г. Барташева, находящемся въ 35-ти верстахъ отъ с. Аскызскаго, въ 30 верстахъ отъ Ондеревскаго улуса на Аскызв, при устью р. Кюгъ въ 100 верстахъ отъ Минусинска. На прінскі я, кромі собиранія этнографическихъ свёдёній, сдёлалъ нёсколько отдёльныхъ экскурсій по окрестностямъ. Изъ нихъ одной изъ самыхъ продолжительныхъ была поъздка къ вершинъ р. Тереньсы. Такимъ образомъ мив, въ теченіи нынвшняго лета, пришлось въ 3-хъ различныхъ мъстахъ 4 раза пересъчь Поклонный хребетъ. Третью часть дороги пришлось сдёлать по тому пути, которымъ шла въ начале весны наша экспедиція. Мы тогда съ Узунжула перебрались на Немиръ, потомъ шли по р. Нинъ до впаденія въ нее р. Изыхъ-чуль, по которой мы повернули къ горамъ Карабасу и Кырмыану. Теперь пришлось идти по берегу Нини до впаденія въ неё Арыхь-нини, ея лъваго притока и затъмъ пересъчь тайгу въ с.-в. направлени до Поклоннаго хребта, съ котораго по ключу Малтырганъ мы дошли до Тереньсы. На объихъ сторонахъ Поклоннаго хребта на всёхъ почти обнаженіяхъ мы встрёчаемъ гранитъ, прикрытый то кристаллическимъ, то вонючимъ известнякомъ. Кое-гдъ встръчаются выходы порфировъ и зеленокаменныхъ породъ. Относительно Тереньсы мнв приходится только повторить уже извъстное указаніе прежнихъ изслёдователей на громадное развитіе кристаллическихъ известняковъ въ ея вершинъ. Читатель помнитъ, что таже порода встрвчается и на Шар-сукв; её же мы встрвчали и по р. Томи ниже Астыпаша. На енисейской сторонъ она сильно развита по Чесголу, обоимъ Сырамъ и Узунжулу, а также по Базъ. Характеръ долицы верхней Тереньсы не имъетъ ничего общаго съ берегами Томи: тамъ непроходимыя заросли и чащи, здёсь широкіе луга; тамъ исключительно черная тайга, здісь неріздкость сосна и лиственница, хотя последняя и здёсь преобладаеть на енисейской сторонѣ Поклоннаго хребта.

Поъздка къ Иней-тасъ (я опишу её подробно въ особой статъв) неожиданно разрослась въ цълую экскурсію, приведшую къ интереснымъ результатамъ. Потерявъ дорогу, я попалъ на р. Большой Стиръ, текущую въ Камышту. На ней, при сліяніи ея съ Ср. Сы-

ромъ, стоитъ утесистая вершина Ташпанъ-турезы, на которой виднъ остатки какого-то древняго городища. Гора, состоящая изъ бурато порфира, трудна для подъема. Въ тъхъ мъстахъ, гдъ склоны ен отложе, она перегорожена стънками изъ камней безъ всикаго цемента. На вершинъ горы находится засыпанная камнями яма. Можетъ быть она служила цистерной для храненія воды. Гора стоитъ на краю степи и тайги, и съ нея открывается обширный видъ на окрестность. Городище могло служить хорошимъ аванпостнымъ укръпленіемъ и наблюдательнымъ пунктомъ для обитателей тайги противъ степныхъ кочевниковъ. Завалы изъ камней, кромъ того, показываютъ, что оно приспособлено было для обороны отъ печаяннаго нападенія. Интересно было-бы произвести систематическія раскопки вдоль стънокъ городища, но я оставилъ это на долю будущаго, болье счастливаго изслъдователя, у котораго будутъ на это достаточныя средства.

Самымъ интереснымъ результатомъ этой повздки и считаю отжрытіе пещеръ со следами обитанія человека между Б. Сыромъ и Базой. Пещеры находятся въ известковыхъ породахъ. Я осмотрвив ихъ 3 въ горв Сюсь-Кюмесь-Тапхань. Въ одной изъ нихъ н нашель кости домашнихъ животныхъ, старыя удила и обломокъ съдельнаго дерева; въ другой обръзокъ оленьяго рога, черепъ и нъсколько костей нижнихъ оконечностей человъка и громадное количество костей дикихъ животныхъ; третья представляла собою не пещеру, а просто навъсъ подъ скалой, но и тамъ нашлись непрервкаемые следы жилья, въ виде кострища и обглоданныхъ костей. Остатки костра находились во всёхъ пещерахъ. Не имёя Возможности систематически изследовать эти памятники, я только старался о томъ, чтобы спутники инородцы не слишкомъ хозяйничали и не рылись въ пещерахъ. Надъюсь, что безъ посторонняго человъка они сами не станутъ трогать и калъчить вновь открытые памятники, такъ какъ пещеры возбуждають въ нихъ суевврный страхъ.

Кром'в этихъ 2-хъ повздокъ, н сделалъ несколько экскурсій по окрестностямъ. Осмотрелъ городище въ вершине Устанаха, леваго притока Немира. Оно совершенно подобно описанному. Со-

бралъ свъдънія о слъдахъ и остаткахъ древнихъ рудокопныхъ работъ по окрестности. Одни изъ нихъ лежали въ горѣ Соинъ, при впаденіи Немира въ Ниню. Здёсь я нашель только небольшую яму, засыпанную землей почти до верху. Кругомъ ен кучи порфироваго щебня, но никакихъ следовъ какой-либо руды. Въ педавнее время открыта была въ этой мъстности залежь мъдной руды по р. Тустунджулу, притоку Камышты, сосёднему съ Узунжуломъ. Мёдь вкраплена въ квардъ небольшими самородными кристаллами. Отъ 🗈 примъси мъди вся порода окрашена въ зеленый цвътъ. Окружающая порода-порфиръ. Развъдокъ руды, сколько-нибудь основательныхъ, не производилось до сихъ поръ. Недалеко отъ пріиска г. Барташева на Узунжуль, близь озера Булань-куль, на западныхъ склонахъ горы Биштакт, находятся слёды несколькихъ старинныхъ шурфовъ. Ямы выбиты въ кристаллическомъ известнякъ, проръзанномъ породой, содержащей въ большомъ числъ кристаллы венисы. Въроятно, благодаря значительному въсу, эта порода была принята древними рудокопами за какую-нибудь рудную

Узунжульскій Михайловскій, очень небогатый содержаніемъ золота, весьма интересенъ въ научномъ отношении. Подъ слоемъ сфроватой песчанистой глины въ разрезе лежитъ слой глинистыхъ песковъ, окрашенныхъ мъстами въ черно-бурый цвътъ, благодаря примъси желъза. Здъсь съ золотоноснымъ пескомъ встръчаются остатки костей вымершихъ толстокожихъ. Нынвшній годъ г. Мартьяновъ въ Минусинскъ получилъ цълый ящикъ этихъ остатковъ для мъстнаго музея, но замъчательные всего то, что, вмъсть съ костями вымершихъ животныхъ, здёсь попадаются бронзовыя орудін, а недавно, уже послѣ моего оттьзда, были найдены мелкія золотыя бусы, по форм'в напоминающія стеклярусь. Разум'вется, врядъ-ли кто, кромъ г. Боголювскаго 1), будетъ утверждать на этомъ основаніи, что выд'єлка золота и бронзы была изв'єстна современникамъ толстокожихъ; гораздо проще предположение, что остатки древней культуры выныты изъ кургановъ, разселянихъ во множествъ въ долинъ Узунжула, но тогда придется признать

¹⁾ Изследованіе древностей Минусинскаго округа. Иркутскъ, 1883 г.

розсыпь за произведение современной намъ геологической эпохи. Подобный примъръ уже былъ мною приведенъ въ розсыпи по Чебалсуку въ системъ В. Анзаса.


Этнографическія свѣдѣнія о татарахь о ихъ обычаяхь и обрядахь приходилось черпать болѣе изъ разспросовъ. Самому мнѣ не приходилось быть свидѣтелемъ, ни свадьбъ, ни погребенія ни какого-либо другаго выдающагося факта въ жизни инородцевъ.

Въ началъ сентября на Узунжулъ стали выпадать снъга; возложенныя на меня порученія были посильно выполнены; средства отпущенныя мнъ также подошли къ концу, а потому я и ръшилъ закончить свои работы.

5-го сентября 1883 года я быль въ Минусинскъ.

Отчеты объ экскурсіяхъ на соляную котловину Ушь-кюль и на мѣсторожденія каменнаго угля на горѣ Изыхъ войдутъ въ мой полный отчетъ о работахъ 1883 года. Краткія-же свѣдѣнія о нихъ заключаются въ прилагаемыхъ объяснительныхъ спискахъ моихъ коллекцій.

Минусинскъ. 1885 г., Октября 5-го дня.



ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОКЪ КОЛЛЕКЦІИ ГОРНЫХЪ ПОРОДЪ,

совранныхъ д. клеменцъ во время экспедицін 1883 года по системъ томи и абакана.

№ 1. Съ береговъ ръчки Мюнджуль, лъвато притока Томи, Діоритъ. съ лъвато берега. Выходъ породы ввидъ небольшаго утеса, въ горъ, покрытой лъсомъ. Порода легко колется на отдельныя пластинки съ параллельными плоскостями.

№ 2. Съ береговъ Шоръ-сука, лѣваго притока Томи. Выходы Бѣлый мраморъ. породы образують мощные пласты по обоимь берегамь Шорьсука, оканчивающіеся обрывистыми утесами и выступами. Среди бълыхъ пластовъ встрвчаются строватыя прослойки. Образчикъ взять верстахъ въ 8-ми выше устья Шоръ-сука.

№ 3. Съ береговъ Шоръ-сука. Смѣняетъ собою № 2. Об- Сърый, вонюразчикъ взять верстахъ въ 16-ти отъ устья, около перевала пическій изчрезъ хребетъ Пайзы-сынъ, изъ обнаженія въ кругизнъ без вестнявъ. рега ръки. На породу налегаетъ сверху рыхлая, неслоистая краснобурая глина. Слои породы поднимаются надъ уровнемъ рвки футовъ на 7. Снаружи покрыть сврымъ выватреннымъ порошкомъ, образовавшимся изъ той-же породы. При ударъ молотомъ и раскалывании слышится сильный сърнистый запахъ.

№ 4. Съ хребта Пайзы-сынъ за переваломъ съ Шоръ-сука. Темно-сёрый, Горы покрыты густымъ лесомъ и обильной травяной расти- вернистый тельностью. Выходы породы обнаруживаются всего мъстахъ известнявъ. въ 2-хъ или 3-хъ. Отличается отъ предъидущаго болъе интенсивнымъ темнымъ цветомъ и мелкозернистымъ сложениемъ. При ударъ молотомъ издаетъ такой-же запахъ, какъ и № 3. № 5. Съ хребта Уленны-сынъ (Поклоннаго), съ Ю.-В. Весь

спускъ на Енисейскую сторону по сагайской дорогъ заваленъ обломками данной породы.

Сіэнитъ.

№ 6. Съ ручья Челенныхъ, текущаго съ правой стороны (съ запада) и впадающаго въ верстъ ниже сліянія трехъ влючей въ Усъ-Питель (три устья). Выходы породы развиты на правомъ, высокомъ берегу раки.

№ 7. Большой Берекчуль, правый притокъ Аскыза, лъвый берегь ръки. Выходъ породы встръчается только въ одномъ мъсть и образуеть мощную жилу въ № 6 и № 8, съ широкими развътвленіями. Въ апофилахъ и около контакта съ \mathcal{N} 6 и 8 (съ широкими развътвленіями) принимаеть афанитовое сложение (образчикъ затерянъ).

Сіэнитъ.

№ 8. Вслъдъ за выходомъ № 7 но Большому Берекчулу и Аскызу, вплоть до устьевъ рачки Бой, тянется одна эта порода, образуя крутые утесы. Спаружи сильно выв'втр'вла. Подножія утесовъ покрыти толстымъ слоемъ дресвы этой породы. Колется, ломается и трескается по всёмъ направленіямъ одинаково.

Порфирь.

№ 9. Съ праваго берега рѣчки Бой, праваго притока Аскыза. На лъвомъ берегу № 8; правый-же берегъ состоитъ изъ высокаго кряжа, утесъ его состоить изъ данной породы. Легко колется по двумъ, почти перпендикулярнымъ между собою, направленіямъ.

Роговообман № 10. Съ высшей точки перевала хребта, раздъляющаго ковая порода. системы Аскыза и Малой Еси. Выходъ ввидъ отдъльнаго утеса близь дороги. Легко колется на пластинки. Ниже, за переваломъ начинаются осадочныя породы, но выходовъ невидно почти вплоть до М. Еси.

Красно-бу-

№ 11. Спустившись на равнину, въ долинъ Малой Еси нарый песчан-ходимъ выдающіеся изъ-подъ почвы гребни и полосы пластовъ данной породы, весьма распространенной по всему округу. Образчивъ взятъ съ горы Уму-Кирбе, на берегу М. Еси, близь улуса Кызыласовыхъ. Порода образуетъ самый верхній иласть осадочныхъ породъ въ мъстности. Иласты наклонены въ востоку, уголъ паденія больше 45°. Порода часто покрыта бѣлымъ известковымъ налётомъ, въ сложении, цвътъ и плотности представлаетъ много варьяцій и № 12 образуетъ Сърый изодну изъ самыхъ ръзкихъ. Выходъ на Малой Еси, верстахъ вестковый песчанникъ. въ 3-хъ ниже горы Улу-Кирбе. Занимаетъ подлежащее положение относительно № 11, напластована согласно съ послъднимъ и незамътно въ него переходитъ.

№ 13. Въ верстъ ниже выхода породы № 12 пыступаютъ Черно-сърый на дневную поверхность слои данной породы, наклоненной, вестнякъ. какъ и двъ предъидущія, къ В. и прикрытой сверху пластами № 12. Плотна, въ вывътренномъ состоянии принимаетъ свътло-желтый цвътъ.

№ 14. На лъвомъ берегу Б. Еси, влъво отъ дороги въ Таш- Темно-сърый тыпъ съ горы Искаргетъ взята данная порода. Сильно распространена по обоимъ берегамъ Б. Еси. Гора Тунджухъ на лъвомъ берегу ръки вся состоить изъ данной породы. Слои круго падають къ С.-В.

№ 15. Съ хребта Тибе-тасъ, идущаго вдоль лѣваго берега Темно-сърый, Имека. Горы состоять изъ данной породы, наклонь пла- вестнякъ. стовъ къ В.

№ 16. Изъ береговыхъ утесовъ Таштына. Слоиста, тем- Красно-бурая, слоистая но-шеколаднаго цвъта, перемежается съ зеленовато-сърыми известковая пластами той-же породы. По словамъ мъстныхъ жителей, глина (мерслои породы идуть глубоко въ землю и чемъ глубже, темъ тверже.

№ 17. На горъ около Таштинскаго села обнаруживаются выходы породы № 16, тождественной съ породою береговыхъ утесовъ, а на нее, въ согласномъ напластовании налегаетъ нетолстый слой породы № 17, прикрытый въ свою очередь Съро-бурый № 18, наклонен. къ В.

известнякъ.

№ 19. Изъ утеса по р. Кулоджекъ, текущей слъва въ Джебаты. Породу сивняеть порфирь, выступающій по правому берегу Абакана, около устья Джебаты.

Глинистый сланецъ.

№ 20. Изъ хребта караульн. сопки, идущаго съ запада на востокъ, и оканчивающагося утесомъ на берегу р. Чехана. Исключительная порода хребта.

Темно-сърый № 21. Съ горы на правомъ берегу Чехана, противъ заимглинистый ки казака Андрея Иванова Бобея.

№ 22. Порода очень распространена по берегамъ Карасюбе, въ хребтахъ, образующихъ бока ея долины, а также цо Мимиховой и по Безъимянкъ, текущей съ водораздъла Чехала и Ачы.

глинистый № 23. При впаденіи річки Мимиховой въ Карасюбе изъ спанець. Утеса взять образчикь данной породы; выходы ен прододжаются до самаго перевала изъ системы Чехана въ систему Аны.

Зернистый № 24. Порода налегаеть на № 22. Выходы образують известнякъ сплошные утесы на западной сторонъ хребта водораздъла Карасюбе и Аны. Мъстами переходить въ сърый, кристаллическій известнякъ.

№ 25. Смѣняетъ собою № 23 на берегахъ Безъимянки, текущей въ Ану; выходъ образуетъ утесъ верстахъ въ 2-хъ ниже обнаженія № 23 и смѣняется въ свою очередь.

Тальковый № 26-мъ, составляющимъ единственную породу береговъ сланецъ. Безъимянки вплоть до Аны. Изъ слоистой части переходитъ въ плотную. Прослойки кварца встрѣчаются очень рѣдко и то незначительныя. Слои падаютъ къ С.-В.

(Гнеис съ). М 27. По обоимъ берегамъ р. Аны и устьевъ Безъимянки и Б. Анзаса данная порода разсѣкаетъ тальковый сланецъ и тянется отъ береговъ рѣки вплоть до вершинъ прибережныхъ горъ. Въ логахъ и падяхъ прикрыта желтоватой рыхлой глиной. Порода раскалывается легко на параллелепиды и толстыя четырехъ-угольныя плитки. Въ большомъ кускъ ясно видна разсортировка составляющихъ породу минералловъ.

Тальковый № 28. Прилегаетъ къ породѣ № 27 и сопровождаетъ оба берега Б. Анзаса, образуя высокіе утесы и перегораживая своими обломками русло рѣки. Слои круто падаютъ къ С.-С.-В. и уголъ паденія ихъ болѣе 50°.

Кварцъ. № 29. Въ № 28 часто встрѣчаются прослойки, идущія параллельно направленію слоевъ породы, состоящія изъ твердаго бълаго кварца. Наиболее значительная жила, толщиною около 5 ф., встръчается около больш. брода чрезъ Б. Анзасъ (считая отъ устья вверхъ). Изъ этого мъста и взятъ образчикъ.

№ 30. Порода № 28 тянется по Б. Анзасу непосредственно Роговообдо впаденія въ него річки Чебалсукъ сліва. Въ углу между спанець. Чебалсукомъ и Анзасомъ (между правымъ берегомъ Чебалсука и лівымъ Анзаса) въ горі, разділяющей обі ріки, порода имветь крутое паденіе къ С., уголь болье 60° и простирается съ В. на З. Нижележащие слои переслаиваются толстыми жилами кварца и переходять въ подстилающую ее породу № 30, напластованную согласно предъидущимъ. Данная порода образуеть ложе золотоносной россыпи Михайловскаго пріиска по Чебалсуку.

№ 31. Предъидующую породу вверхъ по Анзасу и впадаю- Глинистый щей въ него Безъимянкъ смъняють разнообразные глинистые сланцы. Образчикъ данной породы взять около раздъленія Безъимянки Анзасской на двъ отноги, съверную и западную.

№ 32. Порода образуетъ собою вершину горы Шаманъ на хребть того-же имени, водораздъль Большаго Анзаса и В. и М. Кызасовъ. На вершинъ горы представляетъ безпорядочную груду обломковъ скалъ, нагроможденныхъ другъ на друга, ниже становится замѣтнымъ въ ней сланцеватое сложеніе. Простираніе съ Ю.-З. на С.-В. (240°--60°), паденіе Ю.-З., болье 70°.

№ 33. Налегаетъ на предъидущую породу и составляетъ Черный глинистый слапреобладающую породу хребта. Напластованъ согласно № 32, часто переходить въ N 34, образующій слои, легко колящіеся Черный грифельный слана тонкія пластинки. нецъ.

№ 35. Образуетъ между пластами № 32 прослойки толщи- квариъ. ною отъ 3 д. до нъсколькихъ футовъ.

№ 36. Залегаетъ на границъ между ж 32 и 33 и обра- Кварцитъ. зуетъ слои толщиною болъе 30 ф. Очень твердъ, слоеватость слабо выражена, вывътриваемый обращается въ песокъ.

№ 37. У подошвы Шамана со стороны Кызаса порода № Глинистый 32 переходить въ данную, отличающуюся отъ лежащей на

вершинъ болъе ясно выраженнымъ сър. цвътомъ и болъе грубой сланцеватостью, почему и взятъ былъ образчикъ породы.

Черный извест- № 38. Порода образуетъ ложе золотоносной россыпи по някъ съ прожилками известкова- Безъимянкъ, текущей съ Шамана въ Кызасъ; простираніе го шната и кол- Ю.-3.—С.-В. (215—35°), паденіе около 70°.

Черный глини- № 39. Съ праваго берега ручья, текущаго съ Чалпано-востый сланецъ съ сточной вершины хребта Шаманъ, въ Безгимянку Кызасном. скую.

желѣвистый \mathcal{N} 40. Изъ шурфа, заложеннаго между устьемъ Веселаго конгломерать ключа и Б. Кызасемъ. Съ глубины $11^{1}/_{2}$ арш. Выше лежащій слой состоить изъ песковъ съ примъсью бурой глины. Встрвчается среди галекъ, коренное мъсторожденіе неизвъстно.

Вывътрълый \mathcal{M} 41. Залегаетъ на глубинѣ 15 арш. подъ золотоноснымъ черный глинистый сда-иластомъ, образуетъ постель золотоносной россыпи на Проронецъ. ко-Ильинскомъ прискѣ на Кызасѣ. Простираніе С.-З. на Ю.-В.

Діорить. № 42 и 43. Образують массивъ хребта Хансынъ, лежащаго по правому берегу Абакана между устьевъ Б. Кызаса и Аны.

Зеленокамен — M 43 а. Образуеть отдёльные выступы на Хансынѣ или ный порфиръ. Кансынѣ среди породъ M 42 и 43. Твердо колется на плиты.

Столбчатый № 44. Около озера на восточномъ склонѣ Хансына обравелено-кавелено-кавуетъ массивную жилу, отличающуюся столбообразной отдѣльфиръ. ностью, столбы призматическіе, чаще 6-ти-гранные. Величина призмъ достигаетъ иногда нѣсколькихъ саженъ. Правильная призматическая отдѣльность незамѣтно переходитъ
въ плитную, такъ что границу породы опредѣлить очень
трудно.

метаморфи- № 45. Съ съдловины около гольца въ вершинъ ръки Курческій глинистый сла. чекъ, текущей въ М. Абаканъ (затерянъ).

нецъ. № 46. Съ съдловины Курчека. Порода образуетъ жилу въ сланцахъ. Тверда, колется на плиты.

метаморфи. № 47. Съ вершины Крестъ Тасыла, горы, лежащей между ческій зеленый сланець. М. Абаканомъ, М. Кызасомъ и Курчекомъ. Плотна, раскалывается на слои, образуеть собою вершину горы. Гора покрыта большими плитами породы.

. №№ 48 и 49. Порода, встречающаяся въ ложе золотонос- Серый криной россыпи на Троицкомъ пріискъ, по Везъимянкъ, текущей известнякъ. въ Кызасъ, и на береговыхъ утесахъ той-же рѣки. Цвѣтъ измъняется отъ темно-съраго, почти чернаго до бъловатаго, съ совершенно бёлыми прожилками известковаго шпата. На россыпи образуеть породу, подчиненную черному глинистому сланпу, имьющему простирание 215-35°.

№ 50. Образуетъ нъсколько жилъ въ породахъ, образую- квариъ, сощихъ ложе золотоносной россыпи на Троицкомъ пріискъ. Жилы эти пересъкають подъ различными углами линію простиранія породъ ложа россыпи, выклиниваются по направленію теченія Безъимянки и разв'ятвляются. Содержить золото, но въ незначительномъ количествъ.

№ 51. Вольшой Кызасъ противъ Митрофаніевскаго прі- Глинистый иска Кузнецовыхъ.

№ 52. В. Кызасъ, ниже Митрофаніевскаго пріиска, около пороговъ, ниже соединенія средней и с-восточной вершинъ В. Кызыса. Порода образуеть жилу, пересъкающую горы праваго берега Кызаса съ Ю.-З. на С.-В. Тверда и колется одинаково по всъмъ направленіямъ.

№ 52 a. Ниже пороговъ образуеть сплошныя залежи въ Кристалгорахъ, ближе къ устью переходить въ съроватую и бълую пестнякъ. разновидность. Последняя встречается и въ горахъ на левомъ берегу Абакана около Кузнецовскаго зимовыя.

№ 53. Смвняеть собою на берегу Абакана кристаллическій Красно-буизвестнякъ. Около такъ называемаго Краснаго яра, верстахъ рый песчанвъ 8-ми отъ Кузнецовскаго зимовья, образуетъ мощныя залежи, толщиною болве 200 ф.; паденіе слоевъ крутое, болве 50°, наклонъ съ С.-Ю.-З. къ С.-В.

№ 54. Изъ горы противъ нижняго улуса по Матуру, съ Сърый слоиправаго берега ръки. Среди общей свътлосърой массы породы идуть изогнутыми линіями прослойки более темнаго цвета. Общій наклонъ пластовъ къ С.-В. (_болье 10°).

№ 55. На р. Магазъ, верстахъ въ 10-ти отъ ея устья и Сърый слоивъ верств отъ впаденія въ нее съ лівой стороны р. Пурлуя, стий мергель. лежитъ красно-бурый песчанникъ, тождественный съ № 53, съ простираніемъ Ю.-З.—С.-В. и паденіемъ къ С.-З. при углів болбе 45°. По лівому-же берегу Пурлуя на красно-буромъ песчанникъ налегаетъ данная порода, перемежающаяся съ бъловатыми и голубоватыми прослойками. Порода тонко слочится и легко разрушается даже отъ легкихъ ударовъ молотка.

Базальть? Глинистый

сланецъ.

№ 56. Съ лѣваго берега Кызылталыхъ, праваго притока Магазы. № 57. Съ береговъ Илларсы, праваго притока Магазы, слои породы наклонены къ Ю.-В.

№ 58. Магаза около сліянія двухъ вершинь ел, правий берегь. № 59. Вершина западной вѣтви Магазы. Изъ хребта на лѣвомъ берегу рѣки.

Глинистый сланецъ.

М 60. Нижнее теченіе Матура. Хребеть, сопровождающій явний берегь рвки, оканчивается крутымъ утесомъ Кумпась, послів чего рвка дівлаеть повороть къ В. Изъ породъ, составляющихъ продолженіе утеса, вдоль берега Матура взяты з образчика. Изъ нихъ 1-й—данная порода—им'веть простираніе съ С. на Ю. и почти вертикальное паденіе.

Сърый из. № 60 а. Прилегаеть непосредственно къ предъидущей, вестнякъ. плотенъ и тонко-слоисть. Простираніе съ С.-В. на Ю.-В. (800°—120°), паленіе къ С.-В. болье 80°.

Мергель.

№ 61. Предъидущую породу прикрываеть рыхлая, желтоватаго цвъта слоистая порода, подвергшаяся сильному вывътриванію. Положеніе ся приблизительно опредъляется такъ: простираніе съ 3. на В., паденіе къ С.-З., уголъ около 25°. Ниже по Матуру вплоть до устья его снова выступаетъ красно-бурый песчанникъ, тождественный съ предъидущими образцами этой породы въ коллекціи съ простираніемъ Ю.-З.—С.-В. (230—70°) и паденіемъ къ С.-З.

Нижеслёдующія породы собраны во время плаванія по Абакану оть устья Матура до устья рудной Кени.

Роговообманковый афенить. № 62. Съ устья р. Топзасъ, впадающей въ Абаканъ въ верств ниже Матура. Порода эта тянется съ изумительнымъ постоянствомъ по обоимъ берегамъ Абакана, по отрогамъ Кан-

сына и Кырсэ, сопровождающимъ берега его. Тверда, дѣлится и колется по всѣмъ направленіямъ одинаково трудно. Въвывѣтрѣломъ состояніи покрывается бѣлымъ налетомъ.

№ 63. Недалеко отъ устья Аны, по правому берегу Абакана Зелений слакъ предъидущей породѣ примыкаетъ данная, въ узкой попе-пойвамиврисречной долинѣ между отрогами Кансына или Хансына.

Тадлическаго известняка и

№ 64. Взять ниже устья Аны съ праваго берега Абакана. желья слюдви. Тождественъ повидимому съ № 62.

№ 65. Съ праваго берега Абакана, ниже устья р. Кирге- Сърый зернекъ, петрографическій характеръ мѣстности пріобрѣтаетъ вѣстнякъ. большее разнообразіе. Данная порода смѣняетъ предъидущую и образуетъ нижній пластъ въ утесахъ берега.

№ 66. Образуеть жилу въ предъидущей, направление которой прослѣдить неудалось, такъ какъ она незамѣтно переходить въ слѣдующій

№ 67) Образуеть верхніе пласты утесовь по Абакану между

№ 68. Киргенекомъ и Коинсомъ толщиною болье 50 ф.

№ 69. На лѣвомъ берегу противъ устья Койзеса даннай порода образуетъ высокіе скалистые утесы. Среди нихъ часто встрѣчаются впадины и каверны. Порода плотна и тверда и въ ней часто образуются прожилки отъ нѣсколькихъ дюймовъ до фута толщиной.

Образчики послъднихъ представляютъ: №№ 70 и 71.

Последній образуєть множество переходныхъ формъ къ Кристалическій известникъ сто инкъ сто зик-

N 72. Правый берегь Абакана ниже порога "Избушки" въ дотомъ. полуверстъ.

№ 73 а. Предъидущую породу пересъкаетъ данная, уходящая въ глубь береговыхъ утесовъ и скрытая песчанистой осынью, поросшей кустарникомъ.

Съ́рый мраморъ.

Породы, собранныя въ поёздку изъ Таштына до Узунжула.

Черно-сврый известнякъ.

№ 74. Горы по правому берегу Теи состоять исключительно изъ данной породы. Въ мъстъ, гдъ взять образчикъ, около дороги простираніе съ 3. на В. (265°—85°), паденіе съ Ю. на С. Ниже по теченію ръки линія простиранія поворачиваетъ къ Ю.-З. и переходитъ въ Ю.-З.—С.-В.

Стрый слоистый песчанникъ.

№ 75. На лѣвомъ берегу Теи порода образуетъ крутой кряжъ, обрывистый по направленію къ рѣкѣ и оканчивающійся внезапно крутыми, но невысокими утесами. Ниже по теченію ръки, вплоть до устья идеть низменность, по которой текутъ Тея и Б. Есь. Порода очень неоднородна въ своемъ составъ; состоитъ изъ перемежаемости свътлыхъ и темныхъ слоевъ съроватаго цвъта; содержитъ отпечатки растительныхъ организмовъ. На данной породъ налегаетъ краснобурый песчанникъ. Простираніе породы С.-З.—Ю.-В. (300°— 120°), паденіе С.-В., уголь болве 30°.

Краснобурый № 76. За В. Есью прибережная низменность Абакана окайпесчанникъ млена невысокими горами, состоящими исключительно изъ

выми нате- краснобураго песчанника. Къ В.-С.-В. ками.

Вверхъ по Аскызу на обоихъ берегахъ таже самая порода. Образчикъ взятъ изъ горы верстахъ въ 9-ти выше устья ръки. Простираніе его З.-В. (270°-90°), паденіе къ С. Величина угла измъннется очень быстро и круго. Въ одной и тойже горь, на двухъ обнаженияхъ (одно болье къ Ю., другое съверние), наклонъ пластовъ миняется отъ почти горизонтальнаго (не болье 15°) до 60° слишкомъ (сдвигъ).

Сърый слочанникъ.

№ 77. По правому берегу Аскыза, верстахъ въ 25-ти выше истый нес- устын, почти напротивъ устыя р. Базы, впадающей слава въ Асбызъ, краснобурый песчанникъ смёняется породой, которую нетрудно признать тождественною съ № 75, благодаря наличности окаменълостей и сходству литологическихъ при-SHAROBERT OF LAND REPORTED AND ONE CONTRACTOR

Породы, собранныя во время повздки въ вершину Тереньсы, на Узунжулв и въ его окрестностяхъ.

№ 78. Вершины Терень-сука (глубокая рѣка, терень—глу- Сѣрый мрабокій, сукъ—вода) окружены сплошными, мощными пластами данной породы. Тоже замѣчается и на лѣвыхъ притокахъ Терень-сы. Образчикъ взятъ съ праваго берега, лѣваго притока Терень-сы, Малтыргана, выше устъя золотоноснаго ключа Кароменовка, впадающей въ Малтырганъ слѣва.

№ 79. Переваливъ за поклонный хребетъ на Енисейскую сторону, первые выходы горныхъ породъ встрѣчаемъ ввидѣ высокихъ и крутыхъ гранитныхъ утесовъ на берегу рѣчки Кульчазы, лѣваго притока Нини. Порода часто переходитъ въ мелко-зернистую, до того плотную, что даже подъ лупой не всегда удается различить разныя группы кристалловъ.

№ 80. На берегахъ Арыхъ-Нини, лѣваго притока Нини, Сѣрый, вонючій кристалвстрѣчаемъ бѣлый кристаллическій известнякъ, прислоненный лическій известнякъ.
въ граниту, тождественному съ предъидущимъ образцомъ.

Бѣлый известнякъ переходитъ въ данную породу, издающую
запахъ при ударѣ молоткомъ.

№ 81. Между выходами предъидущей породы мѣстами проступають утесы данной. Рядъ ихъ тянется вверхъ по крутизнѣ берега и нѣкоторыя выдѣляются своимъ болѣе темнымъ цвѣтомъ среди свѣтложелтыхъ гранитныхъ массъ, занимающихъ верхніе части прибережныхъ горъ.

№ 82. Ниже по теченію Арыхъ-Нини, послѣ выхода ея въ Бѣлый криобщую долину съ Ниней, встрѣчаемся съ данной породой. сталлическій известнякъ.

№ 83. Предъидущая порода проръзана толстой жилой, данной, проходящей съ С. на Ю. Образчики объихъ послъднихъ породъ взяты близь мъста ихъ взаимнаго соприкосновенія.

№ 84. Ниже устья Арыхъ-Нини, около устьевъ р. Кара-сукъ, Сърый вонювиадающей въ Нину слъва, снова находимъ породу, тождествен-дическій изную съ № 80, прислоненную къ гранитамъ и проръзанную вестнякъ. жилою породы № 85.

№ 85.

Роговообман. порода.

Гранитъ.

№ 86. Ниже по Нинѣ прекращаются известняки и появляются въ одномъ мѣстѣ только ввидѣ небольшаго холма, прилегающаго къ гранитамъ. Вообще-же послѣ измѣненія теченія Нини изъ С.-З.—Ю.-В. въ З.-В. граниты становятся преобладающей породой береговъ рѣки. Въ гранитѣ часто встрѣчаются силошныя параллельныя между собою прослойки бѣлорозоваго кварца, толщиною отъ одной линіи до З-хъ дюймовъ. Образчикъ взятъ съ берега Нини, противъ устъя праваго притока послѣдней Иссыхъ-Чила.

№ 87. Въ верстахъ 7-ми выше устьевъ Немира, праваго притока Нини, по послѣдней встрѣчаемъ мы жилу данной породы, почти горизонтально прорѣзывающую гранитъ.

Порфиръ.

№ 88. Порода очень распространена по обоимъ берегамъ р. Немиръ, впадающей въ Ниню. Въ верхнемъ теченіи рѣки, около дачи Иннокентія Кузнецова, ее мѣстами маскируютъ кристаллическій известнякъ и граниты, сквозь которые она пробилась. Въ вневтренномъ видѣ принимаетъ фіолетовый оттѣнокъ. Эта-же порода образуетъ утесы около улуса Аптыша на Немирѣ и горы въ вершинѣ ключа Устанаха. Образчикъ взятъ съ устъя Немира.

№ 89. Порода образуеть возвышенность по берегамъ Тустуджула, притока Камышты.

Кварцъ съ мъдью. № 90. Составляеть жилу въ предъидущей, наружный конець которой имъеть около 3-хъ ф. въ квадратъ.

Роговообманковая порода.

№ 91. Лѣвый берегъ Узунджула, противъ Михайловскаго приска. Порода выступаеть изъ гранитныхъ холмовъ ввидѣ жилъ въ различныхъ направленіяхъ.

№ 92 а. Лъвий берегъ Узунджула. Порода сильно вывътръна. Развита особенно на силонахъ хребтовъ-

Рранитъ.

№ 92 b. Предъидущая на вершинахъ холмовъ переходить въ данную породу, которая образуетъ отдъльную сопку—узелъ невысокихъ хребтовъ, тянущихся по лѣвому берегу р. Узунджулъ.

 \mathcal{N} 92 с. Образують подчиненныя породы и взаимно \mathcal{N} 92 с. Другь въ друга переходящія разновидности \mathcal{N} 92 с. \mathcal{N} 92 с.

№ 93. По правому берегу Узунджула, въ горъ противъ Красный Михайловскаго прінска и на гор'в Биштакъ образуетъ выходы и жилы, сопровождаясь всегда выходами породы № 94.

№ 94. Последняя развита боле предъидущей. № 93 не Порфиръ. встръчается отдельно безъ даннаго, а последній очень часто является отдъльно. № 93 попадается лишь на склонахъ Виштака, № 49 поднимается до вершины, пробивая кристаллическіе известняки на всемъ протяженіи горы отдільными выступами и жилами; № 93 дълится на плитки, № 94 не имбеть определенной отдельности, колется по всёмъ направленіямъ одинаково.

№ 95 a. На предгоріяхъ Биштака выступаетъ ввидѣ греб- Медковерней около жилъ и выходовъ № 94. Гребни не рѣдко стоять нистый гранить. въ направленияхъ перпендикулярныхъ одно къ другому. Поднимаясь снизу вверхъ по Биштаку, наблюдается чаще всего такой порядокъ въ породахъ: за выступомъ № 94 слъдуетъ № 93, который соприкасается уже съ № 95.

Исключенія р'ядки. Данная порода занимаеть также дно лога, идущаго съ Ю на С отъ подножія Биштака къ Узунджулу.

№ 95 b. Также образуеть гребни на Биштакъ, маскируемые порфирами, но встречается только на высокихъ склонахъ горы.

 ${\mathcal N}$ 95 c. Самая- же верхняя жила гранита состоить изъ данной породы. Мощность ея и направление сильно замаскированы породою № 94, которая здёсь является отдёльно, безъ № 93.

Выше мъстонахожденія этой жилы гранитовъ на Биштакъ нътъ и известняви пробиты одной только породой № 94.

№ 95 d. Эта разновидность встрвчается только въ логу, идущемъ отъ Биштака къ Узунджулу; въ немъ нередко, какъ и въ слъдующемъ №, попадается эпидотъ.

№ 95 e. Образуетъ собою разновидность.

№ 96 a. На с. и с.-в. отрогѣ Биштака, ограничивающемъ вышеупомянутый логь.

№ 95 d. незамътно переходить въ данную.

Въ одномъ мъстъ нашелъ я и переходъ 95 е въ данную породу.

№ 96 b. Предъидущая порода въ свою очередь переходитъ въ данную.

№ 96 с. Представляеть дальнъйшую модификацію № 96 а. Встръчается чаще всего при контактъ породы съ кристаллическимъ известнякомъ.

№ 97 а. Образчикъ кристаллическаго известняка, составляющаго преобладающую породу г. Биштакъ.

№ 97 b. На ю.-з. склонахъ Биштака въ остаткахъ старыхъ рудоразвъдочныхъ ямъ обнаружена жила венисы, залегающая отчасти въ данной породъ, отчасти въ непосредственномъ соприкосновени съ кристаллическимъ известнякомъ.

№ 97 с. Образуетъ жилу въ № 97 а; прилегаетъ въ № 97 b.

№ 98 a. Встрѣчается близь поверхности.

№ 98 b. Та-же порода изъ развѣтвленій главной жилы.

№ 98 с. Изъ ивста контакта жилы съ известнякомъ.

Породы, собранныя во время поёздки по Вольшому Сыру и Базъ

Сэрый ираморъ.

№ 99 а. На берегахъ В. Сыра граниты, нъсколько выше устья средняго Сыра, смѣняются данной породой, тянущейся отъ праваго берега В. Сыра до Базы и далѣе, гдѣ и смѣняетъ наконецъ краснобурый песчанникъ.

Черный ро-

Горный хрусталь. № 99 Б. Образуетъ прожилки въ предъидущей породѣ.

M 99 с. (2 экз.) Образуеть жеоды и щетки въ породѣ, проходящей ввидѣ жилъ чрезъ M 99 a.

№ 99 d. Въ толщахъ мрамора, въ горѣ Сюсъ кюмисъ тапжанъ, между Б. Сыромъ и Базой, имѣется цѣлый рядъ пещеръ, гдѣ образчики данной породы образуютъ натеки на стѣнахъ и сводахъ.

Известнякъ.
 № 99 е. Образуетъ корковидный налетъ на стѣнкахъ пещеръ.
 № 100. На лѣвомъ берегу Б. Сыра, равно какъ и на пра-

вомъ, непосредственно на кристаллическомъ и мраморовидномъ известнякъ налегаетъ краснобурый песчанникъ. Простираніе его здісь съ С. на Ю. и паденіе къ В. Равнины по обоимъ берегамъ Б. Сыра состоять изъ полей краснобураго песчанника, въ которомъ ввидъ отдъльныхъ острововъ поднимается цёлая гряда вершинокъ холмиковъ, покатыхъ къ Ю.-З. и обрывистихъ къ С.-В., состоящихъ изъ данной породы. Лежащіе на дневной поверхности слои им'єють св'єтлокоричневый цвътъ. Выступы этой породы не нарушаютъ напластованія песчанника. Порода ділится легко на прямоугольные бруски.

№ 101. Составляетъ разновидность предъидущаго, отличающуюся болье однороднымъ сложениемъ и краснъющую въ наружныхъ слояхъ. Предъидущая порода образуетъ рядъ гребней, выдающихся среди песчанника и расположенныхъ по дугъ, обращенной къ С. и С.-В. выпуклой стороной. Данная порода образуеть отдёльно стоящій островокь среди песчанника. Напластование песчанника ею не нарушено.

№ 102. Образуетъ выходящую на дневную поверхность жилу среди полей песчанника на лъвомъ берегу В. Сыра, толщиною около 6 ф. Жила пересекаеть линію простиранія подъ угломъ около 45° отъ точки Съвера (песчанникъ идетъ съ С. на Ю.). Съ объихъ сторонъ жилы прилегаетъ песчанникъ и продолжение ея, закрытое пластами того-же песчанника, причемъ напластование послъдняго не измънено. Порода легко колется на тонкія пластинки отъ удара молота и ломается на мелкіе куски.

№ 103. Въ слояхъ песчанника, покрывающихъ жилу поро- Сфрый изды № 102 и соприкасающихся съ ней, онъ мъстами изъ кра- песчанникъ. снобураго переходить въ данную разновидность.

№ 104. Б. Сыръ отъ Средняго отдёляется кряжемъ, изъ Бурый поркотораго возвышается отдельно стоящая коническая гора, господствующая надъ окрестностью. Нижніе пласты горы состоять изъ краснобураго песчанника, который на восточной сторонъ сопки наклоненъ съ Ю.-В. и С.-З., такъ что пласты

наклонены внутрь горы. Бока-же горы состоять изъ данной породы, отличающейся плитниковой отдёльностью.

№ 105. Представляетъ разновидность № 104 съ вершины горы (эта гора наз. у татаръ Сарыхъ дагъ—желтан гора).

№ 106. Изъ хребта, идущаго вдоль праваго берега Средняго Сыра, близь впаденія посл'єдняго съ Большой. Въ горахъ много впадинъ, кавернъ и нав'єсовъ, образовавшихся въ данной пород'є.

Бурый порфиръ. № 107. Съ горы Топтакъ-Туренгъ, на лѣвомъ берегу Средняго Сыра, противъ хребта упомянутаго при предъидущемъ №. Вся гора состоитъ изъ данной породы, отличающейся способностью колоться на тонкія плитки.

> № 108. Образуеть прослойки между известняками на хребть между Сыромъ и Базой.

Мелафиръ? № 109. Проръзываеть краснобурый песчанникъ между Сыромъ и Базой. Образчикъ взятъ съ лъваго берега Базы, гдъ порода образуетъ крутые и высокіе утесы.

Пероды съ урочища Уше-Кюль.

(3 озера и его, окрестности).

Мергель. № 110. Съ западнаго берега соленосной котловины, съ вершины низкаго кряжа, идущаго вдоль западнаго берега упомянутой котловины и въ направлении съ Ю.-В. на С.-З. и примыкающаго къ высокому кряжу, идущему съ Ю.-З. на С.-В. Склоны низкаго кряжа пологи, поросли травой и мѣстами пересѣчены извилистыми рытвинами, дающими возможность заключить, что пласты наклонены къ В. С.-В.

Мергель зе- № 111. Въ рытвинахъ и на берегу котловины видно, что деноватый. на № 110 въ согласномъ съ нимъ напластовании налегаютъ мощные пласты данной породы, перемежающейся съ

Буро-стрый *№ 112*. Подъ слоемъ красноватой рыхлой глины, мъстами мергель, пере-покрытой кристаллами горькой соли, въ соленосной котловикодици въ плотнуютиму. нъ лежатъ сверху тъ-же слои *№ 111* и данная.

Известнякъ, № 113. Между слонми двухъ предъидущихъ породъ въ глуотличающися бокихъ рытвинахъ обнаруживается рядъ тонкихъ прослоевъ сложениемъ данной породы. Она-же часто встрѣчается на берегу соленосной котловины въ руслахъ изсякщихъ весеннихъ потоковъ-

№ 114. Въ двухъ мъстахъ, въ глубокихъ рытвинахъ. Въ Сърый изпервой на глубинъ 3, во второй 4 сажень, рядомъ съ про-песчаннивъ. слойкой № 113 залегаетъ слой данной породы, толщиною около 6 вершковъ. Ниже онъ перемежается со слоями породы № 113.

№ 115. Выходъ данной породы обнаруживается на восточ- Ангидридъ. номъ берегу соленосной котловины среди пластовъ № 112 и 113, выступан около южнаго конца восточнаго кран котловины изъ-подъ мелкой, вывътрълой и разрушенной осыпи породъ № 113 и 114.

№ 116. Въ колодцахъ, выбитыхъ по западному берегу со- Глина, проленосной котловины, обнаруживается перемежаемость пластовъ № 112 и 113, твердость которыхъ ростеть вмёстё съ глубиною. Данная порода образуеть пласть, до котораго обыкновенно быють колодцы, такъ какъ порода эта по твердости трудно поддается лому и кайлъ. На с. концъ котловины пластъ попадается на глубинъ 2 и 21/2 саж., на южномъ-3 и 3¹/₂ арш. Отличается соленымъ вкусомъ, полежавъ на воздухт становится мягче. Высокій кряжъ, идущій по западному берегу соленой котловины и по восточному горнаго озера въ направлении съ Ю.-З. на С.-В., недалеко отъ съвернаго кран котловины, смыкается съ низкимъ кряжемъ ближе него идущимъ по берегу котловины съ Ю.-В. на С.-З. Съ высокаго кряжа взяты следующія породы:

№ 117. Залегаетъ въ верхнихъ частяхъ горъ, слоиста, Глинист. изимъя паденіе къ Ю.-3.

№ 118. Образуетъ включение въ предъидущей породъ.

№ 119. Мъстами № 117 переходитъ въ данную. На вер- Черный и шинъ хребта стоятъ причудливой формы отдъльные невысо говики съ изкіе утесы данной породы.

№ 120. Склоны хребта, какъ восточный, такъ и западный, прикрыты слоями данной породы, слоистой и мъстами окрашенной въ зеленоватый и красноватый цвътъ. Таже порода

питанная солью.

красн. роговикомъ.

Красиный роговикъ.

лежить и на западномъ склонъ низкаго хребта, идущаго по восточному берегу горькаго озера. Гребень этого хребта занять породою № 119.

Кристалливестнякъ.

№ 121. Степь около озера и по рѣчкѣ Биджѣ близь улуса. ческій из- носящаго тоже имя, окаймлена высокимъ хребтомъ, идущимъ на С.-Ю.-З. и сливающагося съ горами въ вершинахъ Уйбата. Отъ Биджи до деревни Бородиной, этотъ хребетъ состоить главнымь образомь изъ данной породы. Въ аналогичной породъмизь восточной части округа найдены остатки какихъ-то трубчатыхъ организмовъ.

Порфиръ.

№ 122. Близь улуса Толчея, на рѣчкѣ того-же имени. между Биджой и деревней Бородиной, известнякъ проръзанъ кряжемъ, состоящимъ изъ утесовъ данной породы. Кряжъ нересъкаетъ известковый хребетъ съ Ю. на С.

Кристанлиизвестнякъ.

№ 123. Въ верств къ Ю. отъ дороги изъ Бородиной въ ческій сёрый Биджу и верстахъ въ 8-ми отъ улуса Толчея встрёчается невысокая гора, отрогъ главнаго хребта, состоящая изъ пластовъ данной породы.

Глинистый сланецъ.

№ 124. Къ предъидущей съ Ю. примыкають выходы дан. ной породы, среди которой выбиты 3 шурфа, глубиною около 4-хъ саж. Породу прорезывають жилы мёдной зелени и мёдной лазури.

Породы изъ окрестностей Минусинска.

Наибольшая распространенная порода въ окрестностяхъ, Минусинска, какъ и во многихъ другихъ мъстностяхъ округа краснобурый цесчанникъ; но такъ какъ его имъется уже ньсколько образчиковь въ коллекціи, то здёсь ограничусь только упоминаніемъ о немъ.

Свро-веленый песчанникъ.

№ 125. У перевоза подъ Синимъ, противъ города на лъвомъ берегу Енисея. Данная порода подстилаетъ краснобурый песчанникъ, какъ это видно на Тагарскомъ островъ, что противъ города, около Абаканской инородческой управы на львомъ берегу Абакана, въ утесахъ около устья Минусинки и другихъ мъстахъ. Мъстами на правомъ берегу Енисея, въ

Майдашинскихъ горахъ порода является ввидъ прослоекъ въ краснобуромъ песчанникъ. У перевоза весь крутой обрывистый берегъ Енисен состоитъ изъ слоевъ данной породы, наклоненной къ Ю.-З. Сърый цвътъ песчанника переходитъ часто въ зеленоватый. Въ немъ часто встръчаются ввидъ включеній зеленоватые неправильной формы глинистые комки. Порода неоднородна; въ ней встръчаются всъ переходы отъ твердаго и плотнаго плитняка до рыхлой, слоистой, легко разрушающейся и разсыпающейся отъ самаго незначительнаго толчка или удара.

№ 126. Изъ колмовъ, начинающихся около протоки Ени-Темно-сърый сея на тагарскомъ островъ и тянущихся на разстояніи около со включе- $1^{1}/_{2}$ верстъ. Данная порода занимаетъ нижніе пласты въ об- ніями краснаженіяхъ на Тагарскомъ островъ. Простираніе съ В. на З., вика. паденіе къ Ю.-З. Плотенъ и твердъ; слоевъ незамѣтно; богатъ включеніями краснаго роговика самыхъ разнообразныхъ формъ.

№ 126 a. Та-же порода, какъ и въ предъидущемъ образ-Тоже, но совключикъ, но отличающаяся формою роговиковыхъ включеній.

ченіемъ роговика ввидъ кожистыхъ или скорлуповидныхъ наростовъ.

2.00

№ 127. Налегаетъ на породу № 126 въ согласномъ съ нею Конгломератъ. напластовании. Совокупная толщина пластовъ данной породы не превосходить 3-хъ саженъ. Слоеватость ясно замътна. Составъ породы крайне непостояненъ. Данный образчикъ представляеть средній типъ; но въ одномъ и томъ-же пласту можно встрътить всъ породы отъ конгломерата до мелко-зернистаго песчанника, въ которомъ спорадически разселны крупныя зерна кварца; какъ примеръ подобной модификаціи взять изъ того-же обнаженія образчикъ.

№ 127 а. Переходъ конномерата въ песчанникъ.

№ 128. Непосредственно на конгломератахъ залегаетъ дан- Желтоватоная порода, перемежающаяся съ пластами темнобураго цевта, чанникъ. представителемъ последнихъ служить обр.

№ 129. Твердъ, съ трудомъ берется ломомъ. Толщина пе. Темнобурый счанниковыхъ слоевъ въ обнажении достигаетъ 3-хъ саженъ. песчанникъ. Сърый, тверросли.

№ 130. Преобладающая порода Майдашинскихъ горъ дый несчан-красно-бурый песчанникъ. По дорогь изъ Минусинска на Майникъ съ отпечатками дашинскую заимку, пересъкши два крижа, составляющіе предорганизмовъ, горія Майдашинскихъ горъ, встрвчаемъ въ полуверсть отъ щихъ водо- дороги невысокій кряжъ, состоящій изъ данной породы; иласты ея наклонены къ В. Плотна и тверда; были опыты дѣлать изъ нея жернова, но почему-то это предпріятіе остановилось. Единственные слъды органическихъ остатковъ найденные мною въ этой породъ, заключаются въ 2-хъ прилагаемыхъ образчикахъ.

Породы и окаментлости съ обнаженій на правомъ берегу Абакана, около Изыхскихъ горъ.

Общій характерь обнаженій горь Изыхь по Абакану состоить въ следующемъ: пласты падають по направлению къ В.; простираніе сѣверо-южное. Мѣстами пласты изогнуты волнообразно. На разстояніи 5 верстъ обнаженія представляють перемежаемость тёхъ-же пластовъ, при чемъ иногда нъкоторыхъ членовъ серіи недостаетъ.

Сърый мѣлко-зернистый плотный пеотпечатками окаменълостей.

№ 131 a. Обыкновенно очень илотенъ, рѣдко переходитъ въ слоистый, еще ръже въ желтоватый, охристый цвътъ. счаннявь съ Взять изъ первыхъ обнаженій по теченію ръки.

> № 131 b. Ниже обнаженія закрыты осыпью и берегь становится изъ обрывистаго пологимъ.

Песчанникъ съ прослойками угля.

№ 132. Въ серіи Изыхскихъ обнаженій № 131 a и № 131 b обыкновенно переходять въ рыхлые глинистые съроватые пласты, вывътрълые и разрушенные. Данная порода обыкновенно подстилаетъ эти рыхлые слои и сама почти всегда сопровождаетъ слои каменнаго угля.

Каменный уголь.

№ 133. Каменный уголь перемежается во всёхъ почти пластахъ серіи Изыхскихъ обнаженій. На разстояніи 5 верстъ по берегу мною насчитано болже 12 прослоекъ каменнаго угля въ различныхъ пластахъ. Толщина ихъ изменяется отъ 4 хъ вершк. до 3 саж. Самое мощное изъ замъченныхъ мною отложеній, толщиною отъ 3-6 саж. находится въ 3 верстахъ

выше первыхъ обнаженій песчанника, на восточномъ край такъ называемаго Гусевскаго лога.

№ 134 а, № 134 b. Подстилають прослойки угля. Порода Споистый песта дёлится на тонкія плиты большаго разм'вра, переслаи- съ отпечатвающіяся съ рядами обуглившихся отпечатковъ раститель- ками. наго происхожденія.

№ 134 с. Представляетъ глинистую разновидность предъ- Сърый глинистий 2-хъ образчиковъ. Рыхлъ, на правильныя плиты не чанникъ съ дълится, подобно предъидущимъ представляетъ рядъ спрес-черными углистыми откованныхъ растительныхъ остатковъ въ перемежку съ песчан- печатками. никовымъ цементомъ.

№ 135 а. Данная порода получаеть наибольшее развите въПереходъ съраго песчанобнаженияхъ, лежащихъ выше такъ называемаго Гусевскагоника въ желлога, т.-е. въ верстахъ 4 выше первыхъ обнаженій по Абакану. товатый, охристый.
Богата сростками и желваками глинистаго жельзняка. Тверда и часто переходитъ въ мелко-зернистую разновидность.

№ 135 b. Предъидущая порода переходить въ данную. Илотный охристый неОбразуетъ толстые пласты въ обнаженіяхъ. Въ немъ очень счанникъ съ развиты охристые желваки, въ которыхъ также попадаются отпечатками. окаменвлости, примеромъ чего можетъ служить данный об- № 135 с. Охрастый желразчикъ.

№ 135 d. Залегаеть обыкновенно вмёстё съ охристымъ. Сёрый желём метами образуеть пласты въ нёсколько футовъ и перехочанникъ. дить изъ слоеватаго въ плотный, мёстами является ввидё большихъ сёрыхъ пятенъ, рёзко выступающихъ въ желтыхъ плитахъ охристаго песчанника, подобно послёднему богатъ сростками, желваками и окаменёлостями, образчики которыхъ въ нашей коллекціи представлены нижеслёдующими №М:

№ 136 a. Изъ охристаго песчанника, весьма рыхлаго, полуразрушеннаго (3 экземпляра).

№ 136 b. Изъ скро-бураго песчанника 4 (экземпляра).

№ 136 c. Отпечатокъ заключался въ желвакъ въ породъставлять еферическій желвак, разумпявшися разумпявшися на-половину при выбалываніи его молотомъ.

№ 137. Порода лежить обыкновенно ниже слоевъ желвзи-Рыхлый. врупным пе-счанникъ съ стыхъ и охристыхъ песчанниковъ; но во многихъ серіяхъ ее отпечатками недостаетъ. Рыхла и мягка; залежи данной породы образу-(2 9K3eM.) ють слои мощностью отъ 4-10 саж. Нередко рядомъ съ крупными въ породъ встръчаются мелкіе, черные углистые отпечатки въ формъ овальныхъ, а чаще кругообразныхъ пятенъ; остатки очень нъжны и порода хрупка, такъ что об-

разчикъ добыть не удалось.

Песчанникъ врупный и твердый.

. № 138. Предъидущая порода мъстами изъ рыхлой нерехостотнечатами; дитъ въ твердую, проникнутую известковымъ цементомъ.

Конгломе-

ратъ.

Переходъ на 👫 139. Въ нижнихъ слояхъ зерна породы постепенно певонгломерать реходять въ конгломерать, образчикомъ которыхъ служить:

> № 140. Составляетъ нижніе пласты серій вт. обнаженіяхъ. Замъчаются переходы отъ песчанника до зерна величиною въ лесной орехъ. Не лишенъ окаменелостей, но при рыхлости породы мнъ не удалось добыть хорошаго экземпляра. Встръчаются пласты, мощностью въ несколько саж. Есть слои, окрашенные въ чернобурый цвъть, въроятно отъ примъси жельза, но вев образчики последней разновидности превратились въ дресву при перевозкъ.

> № 141. Въ предъидущей породѣ мъстами ввидъ отдъльныхъ пятень попадается данная, весьма рыхлая. Чаще всего въ обнаженіяхъ она образуеть прерывающійся пласть, толщиною около четверти и менье; при этомъ издали слой имъетъ видъ ряда крупныхъ, неправильныхъ ядеръ, выдъляющихся своимъ грязно-сърымъ цвътомъ на свътломъ, напоминающемъ собою цвъть стараго пергамента, фонъ конгломератовыхъ утесовъ.

> Въ двухъ поперечныхъ логахъ, пересъкающихъ обрывы на берегу Абакана и идущихъ съ Ю. на С., встръчаются песчанники, измѣненные дѣйствіемъ высокой температуры. Цвѣта обожженных породъ изменяются отъ прко-кирпично-краснаго до чернаго, и имъющаго шлакообразное строеніе. Мъстами сохранились въ породъ и органические отпечатки.

Эти модифицированныя породы представлены въ коллекціи нижесл'я дующими образчиками:

№ 142 a. № 142 b. № 142 c.

Въ первомъ, нижнемъ по теченію Абакана логу породы обожжены на разстояніи 2-хъ верстъ отъ берега Абакана.

Въ другомъ мъстъ раіонъ дъйствій высокой температуры менье обширенъ и объ этомъ будетъ сказано подробно въ отчетъ.

Въ заключение представляю сомнительную породу, такъ какъ коренное мъсторождение мнъ неизвъстно:

№ 143. Найденъ случайно татариномъ Качинцемъ на Изых-Песчанникъ скихъ обнаженияхъ, въ осыпяхъ около берега Абакана. Въ- съ отпечатроятно происходита изъ съро-бураго песчанника.

Вещи, найденныя въ пещеракъ, въ горѣ Сюсъ-Кюмесъ-Тапканъ, на правой сторонѣ р. Б. Сыръ, въ 3-къ верстакъ отъ улуса Морозова:

Пещеры вымыты водою въ кристаллическомъ известнякъ, состоятъ изъ нъсколькихъ отдъленій, стъны покрыты известковыми натеками, состоятъ изъ нъсколькихъ отдъленій, соединенныхъ узкими извилистыми корридорами.

Осмотрвно 3 пещеры, вещи имъются изъ 1-й и 3-й.

1-я пещера на ю.-в. склонъ хребта.

Въ 1-мъ отдълении найдено кострище и кучи костей въ безпорядкъ. Отсюда взяты: 1) Кость. 2) Жельзныя удила.

3) Обломокъ съдельной луки.

Изъ 4-го отдъленія 1-й пещеры:

1) Обрѣзки кожи.

Въ пещерѣ № 2-й вещей не взято (на с.-з. склонѣ горы). Въ пещерѣ № 3-й (на ю.-з. склонѣ горы, близь гребня хребта):

Въ 1-мъ отдъленіи:

1) Обрезовъ оденьяго рога. 2) Человеческій черепъ. 3) Кость.

Изъ 2-го отдъленія—4 кости.

Изъ 3-го отделенія—3 кости.

Изъ 4-го отделенія—звериный черепъ.

Д. Клеменцъ.

СПИСОКЪ

РАСТЕНІЙ, СОБРАННЫХЪ ЭКСПЕДИЦІЕЙ 1883 ГОДА ПО СИСТЕМАМЪ РЪКЪ, ВПАДАЮЩИХЪ ВЪ ТОМЬ И АБАКАНЪ,

опредъленныхъ и классифицированныхъ

Н. М. Мартьяновымъ, въ Минусинскъ.

Число видовъ 251. Экземпияровъ 700.

Atragene alpina L.

23-го іюня. Немиръ. Въ ложбинъ хребта, среди густаго лъса. Въется по деревьямъ и кустарникамъ.

Thalictrum petaloideum. L.

22-го іюня. Немиръ, около дачи Иннокентія Кузнецова, на опушкъ лъса по дорогъ въ Узунжулъ. Растетъ на открытыхъ мъстахъ отдъльными экземплярами.

Thalictrum flavum L.

27-го іюня, берега Иссыхъ-Чулъ, праваго притока Нини. На сырыхъ мъстахъ около ръки.

Pulsatilla patens Mill. Сосновый боръ по Узунжулу.

Anemone sylvestris. L.

22-го іюня. Немиръ. Растетъ на окрытыхъ солнечныхъ мъстахъ.

Anemone narcissiflora. L.

25-го іюня. Немиръ, противъ устья Устанаха, на сѣверномъ склонѣ горъ, въ рѣдкомъ лиственномъ лѣсу.

Adonis apennina. L.

26-го іюня. Немиръ, противъ устья Устанаха, на поскотинъ улуса Антыша. Почва влажная, мъстами болотистая. Растетъ изолированно.

Ranunculus cymballariae. Purch.

23-го іюля. Берега Чехана, притока Джебата, около заимки казака Бабея. Почва иловатая, растетъ соціально.

Ranunculus polyanthemos. L.

27-го іюня. Поскотина улуса Аптыша на берегу Немира. Ра-

Ranunculus acris. L.

7-го августа. Поскотина улуса на нижнемъ теченіи Матура; почва сухая, обильно поросшая травой. Растеть изолированно. 14-го августа, Саннскій хребеть. 13-го іюдя, берега Томи, близь устья Тереньсука, соціально.

Caltha palustris. In the call

3-го іюля. Гора Крылганъ, вершина Нини и Аскыза. Около ручьевъ и лужъ, близь вершины горы.

Trollius asiaticus. L. - Жаркій цвыть (крестьяне).

22-го іюня. Немирь, притокъ Нини, дача Кузнецова, по дорогь на Узунжуль. На открытыхъ мъстахъ, соціально, въ полномъ цвъту. 31 го іюля. По берегамъ ручья, близь вершины Хансына. Почти всь экземпляры ужъ отцвъли.

Aquilegia sibirica. Lum

22-го іюня. Немиръ. Дача Кузнецова. Совивстно съ предъидущимъ

Aquilegia glandulosa. Fisch.

2-го іюдя. Гора Крдыгань, на открытыхь горныхь дугахь; 28-го іюдя. Луга у подошвы Шамана. 31-го іюдя. По дорогь на Кресть-Таскыль. (Между М. Абаканомь и Б. и М. Кызасами), на сёдловинь горы. 14-го августа. Саянскій хребеть. Растеть сопіально.

Delphinium elatum. L. Конскій звітробой. (Таштынскіе казаки). 4-го іюля. Берега Томи; на таежных лугахь. З и 6-го августа. Матурь. Распространень на влажных таежных лугахь по Томи, Анзасу, Кызасу, Матуру и Магазі. Достигаеть 10 и 12 ф.

Если лошадь тонеть при переправъ вплавь хлысни ее звъробоемъ и она выплыветь (Таштыпскіе казаки).

Aconitum barbatum. Patr. Мухоноръ (крестьяне).

22-го іюня, берега рудной Кени около Абаканскаго завода. 4-го августа, ръка Сея, правый притокъ Таштыпа. 7-го августа, ръка Пурзуэ, лъвый притокъ Магазы, по горному склону. Растетъ на лугахъ изолированно. Више 6 ф. экземпляровъ не встръчались.

Асопітит Іусостопит. L.—Пажать-отть (Черневне татары). 4-го іюля. Долина Томи. 31-го іюня. По дорогів на Кресть-Таскыль (между М. Абаканомь, В. и М. Кызасами); на влажныхь таежныхь лугахь, около рікь, совмістно въ Delphinium elatum, но разміровь его не достигаеть. Білня и біловатня разновидности часто попадаются по Анзасу и Кызасу, преимущественно на ручьяхь и горныхь болотахь. Средняя высота между 6—71/2 ф.

Aconitum volubile. Pall. var villosa Regl. — Борець (крестьяне). 2-го августа. Нижнее теченіе Б. Кызаса, на лугахъ по берегамъ рѣки около Митрофаніевскаго пріиска. Распространенъ также по Узунжулу, Немиру и Тустуджулу (первый и послѣдній притоки Камышты).

Отваръ корня употребляется какъ средство отъ грудныхъ болѣзней. Ядовитъ. Больнаго, напоивъ отваромъ, тотчасъ начинаютъ отпаивать горячимъ молокомъ до появленія рвоты (крестьяне).

Aconitum anthora. L.

13-го іюля. Балыкса, явый притокъ Томи.

Aconitum napellus. L.

14-го августа. Саянскій хребеть. 15-го августа. Рѣчка Поперечная, впадающая въ Кантегиръ.

Paeonia anomala L. Синне или Сигне (сагаи, бельтиры,

черневые татары).

1-го іюля. Берега Иссыхъ-Чула, праваго притока Нини. Распространенъ по тайгъ тамъ-же, гдъ и Delphinium elatum и Асоnitum lycoctonum. Цвътокъ достигаетъ 5 дюйм. съ лепестками въ естественномъ положеніи, а съ растянутыми—до 7". Высота растенія отъ 3—5 ф. Корень варятъ, сушатъ, ръжутъ и кладутъ въ угрэ (татарскія щи изъ ячной крупы), какъ приправу. Наваръ получаетъ красный цвътъ и терпкій вкусъ.

Papaver alpinum. L.

14-го августа. Саянскій хребеть.

Barbarea. Spec.

6-го іюля. Долина р. Томи. Около воды, почва крупный гра-

Arabis incarnata. Pall.

26-го іюня. Немиръ. На порфировыхъ утесахъ.

Cardamine macrophylle W.

27-го іюля. Беретъ Б. Анзаса. 2-го іюля. Берега Иссыхъ-Чула, около воды.

Alvssum alpestre. L. var. Typino.

23-го іюня. Немиръ, около дачи Кузнецова, на хребть, на скудной почвь. Корень уходить въ трещины кристаллическаго известняка.

Alyssum altaicum. Ctr.

23-го іюня. Немиръ, около дачи Кузнецова, на трещинахъ известковыхъ утесовъ, совмъстно съ предъидущимъ.

Hesperis aprica. Pois.

23-го іюня. Немиръ, на отрогахъ главнаго хребта около дачи Кузнецова. По низкимъ мъстамъ достигаетъ 4 ф. и отличается яркимъ фіолетовымъ цвътомъ, на горахъ переходящимъ въ бъловатый.

Hesperis matronalis. L.

27-го іюли. Берега Иссыхъ-Чула. Около воды. Изолированно.

Ervsimum.

23-го іюня. Немиръ, на вершинъ хребта, около дачи Кузнецова, на осыпихъ порфира и известняка.

Camelina sativa. Crantz.

6-го августа. Нижнее теченіе Матура. На прошлогодней пашнъ.

Capsella bursa pastoris. Mönch.

27 го іюня. Чебаль-сукъ, притокъ В. Анзаса. На песчаной почвъ.

Viola biflora L.

2-го іюля. Гора Крлыганъ. Около снѣжныхъ полей, на гольцѣ. Образуетъ пизкорослый, но силошной и красивый коверъ.

Viola grandiflora. L. (var. altaica).

15 го августа. Ръка Поперечная, притокъ Кантигира. 2-го іюля. Гора Крямганъ, совмъстно съ Viola biflora.

Viola tricolor. L. var. elegans. Ledeb. 13-го августа. Верхнее теченіе Карасюбе.

Parnassia palustris. L.

25-го іюня. Хребетъ водоразділа Аны и Чеханы, около ручья.

3 и 6-го августа. Нижнее теченіе Матура, на лугахъ около ръки. 14-го августа. Хребеть водораздъла Карасюбе и Кантигира.

Polygala comosa. Ehrh.

23-го іюня. Немиръ, съ хребта около дачи Кузнецова, растетъ спорадически, на скудной почев, образовавшейся изъ осыпи гранита. 2-го іюля. Карга, на известнякахъ. 4-го августа. Сея, притокъ Таштыпа.

Dianthus superbus. L.

5-го іюля. Берега Каратаса, праваго притока Томи. 11-го іюля. Устье Балаксы. З и 6 августа. Матуръ. На сухихъ лугахъ, по склонамъ горъ на солнечной сторонъ. Обывновенно на сухихъ, высокихъ лугахъ по Аскызу, Таштыпу, Абакану, Кени и Узунжулу.

Dianthus sinensis. Fisch.

26-го іюня. Немиръ, около улуса Аптыша, на порфировыхъ горахъ. 2-го іюля. Карга, на известнявахъ.

Silene inflata. L. Шилтанъ-оттъ. (Черневые татары).

10-го іюля. Берега Томи, на горных в лугах в, почва чернозем в. 22-го іюля. Аккая. 19-го іюля. Таштынъ, горная покатость; по вырубленному березовому лъсу. Встръчается по Шоръ-Суку и Абакану, около завода.

Silene nutans. L.

25-го іюля. Съ Безъимяннаго ручья, текущаго въ Ану, съ водораздъла послъдней и Чехана. Почва известнякъ.

Silene tenuis. Wild.

14-го августа. Саянскій хребетъ.

Lychnis alba. Mill.

23 го іюля. По берегу р. Чехана, на опушкъ лиственнаго лъса. 27-го іюля, на высокихъ лугахъ по Чебалсуку. 4-го августа, річка Сел. 6-го августа. Нижнее теченіе Матура, на пашнъ.

Lychnis Githago. Lam.

6 го августа. Нижнее теченіе Матура, на лугахъ около улуса. Растеть изолированно.

Lychnis sibirica. Turch.

26-го іюня. Немиръ, около устья Устанаха, на порфировыхъ утесахъ.

Lychnis tristis Bunge.

14-го августа. Саннскій хребеть.

Lychnis chalcedonica. L. Уялу-оттъ (черневые татары). Та-

тарское мыло (казаки и крестьяне).

13-го іюля. Балыкса. 23-го іюля. Берега Чехана и Карасюбе на влажныхъ съновосныхъ лугахъ. 6-го августа. Нажнее теченіе, Матура. Встръчается по ръчкамъ Бутракты, Кени и Берекчуллу.

Arenaria longifolia. MB.

23-го іюня. Немиръ. Отроги высокаго хребта около дачи Кузненова. На осыняхъ изъ гранита.

Stellaria cerastoides: L.

26-го іюня. Немиръ; на горахъ.

Stellaria nemorum. L.

1-го іюля. Верега Иссыхъ-чула, притоки Нини; на влажныхъ мъстахъ, около воды.

Stellaria petrea. Bg.

28-го іюля. Таскылъ-Шаманъ; на горныхъ лугахъ и между камнями; подпочва—черный глинистый сланецъ.

Stellaria.

6-го августа. Нижнее теченіе Матура; на лугахъ, около Матурскаго улуса.

Stellaria.

14-го августа. Водораздълъ хребта Карасюбе и Кантигира.

Cerastium pilosum. Ledeb.

31-го іюля. Крестъ-Таскыль (хребеть между М. Абаканомъ, Б. и М. Кызасомъ); на съдловинъ хребта; растеть соціально. 13-го августа. Карасюбъ. 14-го августа. Саянскій хребеть.

Cerastium davuricum. Fich. Конгра-оттъ (черневые татары). 10-го іюля. Берега Томи, на открытыхъ дугахъ; соціально. 22-го іюля. Акъ-кая.

Hypericum ascyrion. L.

22-го іюня. Въ саду владёльца Абаканскаго завода. Взять отцвётающимъ. 3-го августа. Матуръ.

Hypericum hirsutum L.

11-го іюля. Томь, близь устья Балыксы. Около воды.

Hypericum atennatum. Choyssy. 20-го іюля. Карга, на известнявахъ.

Geranium albiflorum L.

26-го іюня. Немирь, около улуса Аптыша, на горахь. 2-го іюля. Вершина Иссыхь-чула, почва влажная. 28-го іюля. Таскыль-Шамань; на умфренно-влажныхь лугахь.

Geranium laetum. Ledeb.

23-го іюня. Немиръ, на отрогъ высокаго хребта, около дачи Кузнецова. Подпочва—гранитъ. 27-го іюля. Берега Иссыхъ-чула, въ полугоръ, на гранитахъ.

Geranium pratense L. Касымъ-оттъ (татары).

Абаканскій заводъ, въ саду владѣльца завода. 27-го іюля. Мрасса. 3 и 6-го августа, Матуръ; на покосныхъ лугахъ. Растетъ соціально. Очень распространено по Аскызу, М. и Б. Еси и Теѣ, на лѣсныхъ лугахъ по горнымъ склонамъ. Образуетъ сплошной бордюръ около проѣзжихъ дорогъ.

Thermopsis lanceolata R.

25-го іюня. На сухой глинистой почвѣ, близь дороги изъ усадьбы Кузнецова къ устью Немира. Растетъ отдѣльными экземплярами.

Medicago falcata L.

19 го іюла. Близь с. Таштынскаго, на степныхъ сухихъ дугахъ.

Trifolium pratense. L.

11-го іюня. Томь, близь устья Балыксы; на открытыхъ сѣнокосныхъ лугахъ. 13-го іюля. Балыкса. 30-го іюля. Карга, на известнякахъ.

Trifolium repens. L. 13-го іюля. Валыкса.

Trifolium Lupinaster. L.

23-го іюня. Немиръ, около улуса Антита и около дачи Кузпецова, на опушкъ лъса, растущаго по хребту. 11-го іюля. Томь, близь устья Балыксы, на сънокосныхъ лугахъ. 20-го іюля. Карга, на известникахъ. 21 го іюля. Берегъ рудной Кени. 7-го августа. Поскотина улуса на нижнемъ Матуръ.

Trigonella platycarpus. L. Кызыль-Батаягы-оттъ (черн. татары). 22-го іюля. Акъ-кая, на Мрассъ. Caragana pygmaea. Dec. Тигинекъ (татары сагайскіе). 27-го іюня. Гора Сонпъ, на устьв Немира. Колючій кустарникъ, растетъ на крутыхъ утесахъ, достигаетъ роста человъка.

Oxytropis.

23-го іюня. Немиръ, на хребть около дачи Кузнецова, на сукой почвъ. Корень углубленъ въ трещинахъ породы (гранита).

Phaca alpina. L.

26-го іюня. Немиръ, на хребть противъ устья рычки Устанахъ и въ окрестностихъ озера Буланъ-куль (лосиное озеро).

Hedysarum neglectum. Ledeb.

28-го іюля. Таскиль-Шамань. На Чалпань. С.-в. вершинь хребта Шамань, между камней и по осыпи глинистаго сланца.

Onobrychis sativa. L.

23-го іюня. Немиръ; по дорогѣ на Узунжулъ, на открытыхъ мъстахъ. 19-го іюля, Таштынъ; на степ. лугу позади с. Таштынскаго.

Vicia sylvatica L. Кючю (черневые татары). 22-го іюля. Аккая на Прассь (Мрассь).

Vicía sepium L. Кючю (черневые татары называють и всколько разных растеній этимь именемь, между прочимь и Kranella vulgaris).

26-го іюня. Немиръ, удусъ Аптыша. Встръчается спорадически. 22-го іюля. Аккая на Мрассъ. 27-го іюля. Мрасса. 3-го августа. Матуръ.

Vicia. Sp. Кучу-оттъ (Сагаи и Белтиры). 4-го августа. Сен, правый притокъ Таштыпа.

Vicia megalotropis. Led.

23-го іюня. Немиръ, около дачи Кузнецова. Обильно среди береговыхъ лъсовъ. Малорослые экземпляры встръчаются на убогихъ горныхъ почвахъ.

Vicia cracca. L. Кючю (черневые татары).

26-го іюня. Немиръ, около улуса Аптыша. Единственный, встръченный мною въ этой мъстности экземпляръ; найденъ на вершинъ хребта, около улуса. 22-го іюля. Аккая на Мрассъ 4-го августа. Сея.

Lathyrus pisiformis. L.

26 іюня. Немиръ, около улуса Антыша. Встричается сопрадически-

Lathyius pratense. L.

8-го іюля. Болотистая луговина на Томи, ниже устья ръчки Пыскымджи, текущей съ Сасъ-Тайги. 13-го іюля. Балыкса. 3-го августа. Матуръ. 4-го августа. Сея.

Orobus lathyroides. L.

11-го іюля. Томь, близь устья Балыксы. Отдёльными группами на влажныхъ съновосныхъ лугахъ.

Orobus luteus. L.

27-го іюня. Берега Иссыхъ-Чула, притока Нини. Въ полугоръ на лугу.

Spirea chamaedrifolia. L.

26-го іюня. Немиръ, улусъ Аптыша. На лъсныхъ опушкахъ. Кустарникъ, достигающій роста человька.

Spirea Ulmaria. L. Бълоголовникъ (крестьяне).

3-го августа. Матуръ. 7-го августа. Нижнее теченіе Матура. Одно изъ самыхъ распространенныхъ растеній на открытыхъ лъсныхъ лугахъ, близь ръкъ. Ростетъ соціально; обыкновенно отъ $2^{1}/_{2}$ до 4 ф. вышиною. Листья употребляются, какъ суррогать чая.

Dryas octopetala. L.

2-го іюля. Гора Кряыганъ. Близь вершины гольца; подпочва гранитная дресва. 28-го іюля. Таскылъ-Шаманъ. На съдловинъ хребта образуетъ поросль. Почва тощая, перемѣшанная со щебнемъ чернаго глинистаго сланца.

Geum intermedium. Bess.

4-го іюля. Верхнее теченіе Томи. На кочкахъ около рѣки. Встръчается спорадически.

Rubus saxatilis. L.

26-го іюня. Около улуса Аптыша на Немиръ. На сухихъ мъстахъ, въ ръдкомъ лъсу.

Fragaria callina. Ehr.

26-го іюня. Около улуса Аптыша на Немиръ. Образуетъ сплошныя поросли на сухихъ мъстахъ въ ръдкомъ лъсу.

Potentilla viscosa. Dr.

19-го іюля. На горъ близь с. Таштынскаго. Подпочва сърый известковый песчанникъ.

Potentila anserina. L.

26-го іюня. Немиръ, улусъ Антыша. На иловатой почвъ, около ръки образуеть плотный, низко стелющійся коверъ.

Potentilla fruticosa — Карагана (саган).

25-го іюня. Поскотина улуса Аптыша на Немирѣ. На низкихъ мѣстахъ образуетъ густые кустарники въ ростъ человѣка. На горахъ низкоросло и уже повсюду отцвѣло. 27-го іюля. Чебалсукъ, притокъ Б. Анзаса. По берегамъ рѣки образуетъ кустарникъ въ ростъ человѣка. 15-го августа. Рѣчка Поперечная, притокъ Кантигира.

Agrimonia pilosa. Led. Итоты (черневые татары).

22-го іюля. Аккая. 27-го іюля. Мрасса. 6-го августа. Нижнее теченіе Матура. Около дороги.

Sanguisorba officinalis. L.

7-го августа. На лугахъ по Матуру и Магазѣ, внѣ раіона тайги. Почва черноземъ съ глиной. Распространено также по лугамъ на Таштыпѣ и Абаканѣ.

Alchemilla vulgaris. L.

3-го августа. Матуръ. 14-го августа. Саянскій хребеть.

Cotoneaster vulgaris. L. var. Melanocarpor.

27-го іюня. Гора Соипъ, на устьи Немира. Взять со старой ямы, гдв, по словамъ татаръ, въ старину производились поиски мѣдной руды. Кустарникъ. Подпочва порфировый щебень.

Epilobium angustifolium. L. Кихъ-оттъ. (Козья трава. Сагаи). 10-го іюля. Берега Томи. На горъ, поросшей высокой травой, достигаетъ 4¹/₂—6 ф. 19-го іюля. Окрестности Таштыпа. Обильно ростетъ по степямъ, окрашивая громадныя пространства въ красно-фіолетовый цвътъ своими цвътами.

Ledum punureum. Lrp. Скрыпунъ (казаки).

27-го іюля. На болотистыхъ мъстахъ на берегахъ Карасюбе.

Sedum hybridum. L. Азнеизи-оттъ-пазай (черневые татары). 11-го іюля. Томь, близь устьевъ Балыкси. 13-го іюля. Балыкса. 27-го іюля. Чебалсукъ, притокъ Б. Анзаса. На утесахъ рогово-обманковаго сланца. Если годъ будетъ урожайный, цвѣтетъ крупными цвѣтами; въ неурожайный годъ засыхаетъ совершенно (черневые татары).

Sedum Aizon. L.

25-го іюля. Съ хребта водораздъла Аны и Чехана; любитъ рости на старыхъ муравейникахъ.

Ribes petracum. Wulf. Кызырганъ.

27-го іюля. Гора Крямганъ. На болотистыхъ мѣстахъ, особенно между кочекъ.

Saxifraga sibirica. L.

26-го іюня. Немиръ, на покрытыхъ мохомъ утесахъ, на тънекой сторонв.

Saxifraga.

2-го іюля. Берега Иссыхъ-чула, праваго притока Нини. Среди тальниковаго кустарника вдоль ръки.

Saxifraga crassifolia. L. Баданъ (саган, качинцы). Каяшанъ

(черневые татары).

2-го іюля. Гора Кряыганъ; на каменистыхъ мъстахъ на горахъ. Распространенъ по всъмъ горнымъ хребтамъ. Проплогодніе, почернъвшіе листья татары собирають и пьють, какъ чай. Свежіе листья ядовиты.

Chrysosplenum alternifolium. ${\bf L}.$

11-го іюля. Томь близь устья Тереньсука. На покрытыхъ мохомъ сіэнитовыхъ скалахъ.

Carum carvi. L.

27-го іюля. Чебалсукъ. На старыхъ отвалахъ промытой золотоносной россыпи. Ростетъ соціально, но экземпляры низкорослы; на естественныхъ лугахъ достигаетъ 5 ф. 3-го августа. Матуръ.

Buplerum aureum. Tisch.

4-го іюля. Верхнее теченіе Томи. 28-го іюля. Луга по Безъимянкъ, текущей въ В. Кызасъ съ Шамана. 9-го іюля. Томь между Шорсукомъ и Тереньсай. 3-го августа. Матуръ. 15-го августа. Рвчка Поперечная, притокъ Кантигира. Ростетъ соціально, покрывая безлесные склоны пологихъ хребтовъ въ тайге по Томи и Шорсуку, гдъ преобладаетъ надъ всъми остальными травами, окрашивая сплошь всё луга блёдно-желтымъ цветомъ.

Buplerum.

13-го августа. Карасюбе, лівый притокъ Чехана.

Stenocoelium athamanthoides. Led.

3-го іюля. Гора Крлыганъ. 28-го іюля. Таскыль-Шаманъ. 14-го августа. Саянскій хребеть. На покатыхъ склонахъ гольца, гдѣ имѣется прочный слой почвы.

Pleurospermum austriacum. Hoff. Сухъ-Малтырганъ (сагаи). 21-го іюня. Улусь Антыша на Немиръ. На низкихъ, влажныхъ мъстахъ достигаютъ 6 и 7 ф. высоты, а толщина стебля у корня до 4-хъ дюймовъ діаметра.

Conioselinum Fischeri. W. Grab.

13-го августа. Р. Карасюбе. 3-го августа. Матуръ.

Lumea borealis. 1..

2-го іюля. Въ тайгъ, около Крлыгана. 13-го августа. Карасюбе.

Galium Aparine. 1.

10-го іюня. Берега р. Томи; на болоть. 20-го іюля. Карга, на известнявахь. 3-го августа. Матурь.

Galium vernum. Scop.

27-го іюня. Берега Иссыхъ-Чула, притока Нини; около воды.

Galium boreale. L.

10-го іюля. Берега Томи, на таежныхъ лугахъ. 22-го іюля. Аккая на Мрассъ. 27-го іюля. Мрасса.

Galium verum L.

20-го іюля. Карга, на известнякахъ. 22-го іюля. Абаканскій заводъ, на сухихъ лугахъ. Обыкновененъ на лугахъ между Аскызомъ и Таштыномъ.

Scabiosa ochroleuca. L.

19-го іюля. С. Таштынское. По горамъ особенно часто по известковой почвѣ и вообще на сухихъ лугахъ по Теѣ (19 августа), Таштыну, Аскызу и Еси.

Veleriana capitata. Pall.

28-го іюля. На Таскылъ-Шамань, между камнями (черный и сърый глинистый сланецъ). 14-го августа. Саянскій хребетъ.

Valeriana dubia 8g.

26-го іюня. Немиръ, улусъ Аптыша, поскотина улуса; почва влажная, мъстами болотистая. Ростетъ изолированно.

Patrinia sibirica.

3-го іюля. Гора Крлыганъ. На гранитныхъ осыпяхъ.

Aster alpinus L.

23-го іюня. Немиръ, хребетъ около дачи Кузнецова. На склонѣ хребта; подпочва порфировый щебень. Ростетъ изолировано. 19-го іюля. С. Таштыпское. На лѣсныхъ опушкахъ. 14-го августа. Саянскій хребетъ.

Calimeris altaica.

20-го августа. Гора Книхъ-Тасъ, на берегу М. Еси, около улуса Кызыласова. На сухомъ безлъсномъ склонъ горы. Подпочва краснобурый песчанникъ.

Erigeron elongatum. Ledeb. 13-ro августа. Р. Карасюбе.

Erigeron acris. L.

27-го іюля. Берега Б. Анзаса. На старыхъ отвалахъ промытой золотоносной россыпи. 1-го августа. Матуръ.

Solidago virga aurea. L.

13-го и 14-го августа. Водораздёльный хребеть Карасобе и Кантигира и Саянскій хребеть. 15-го августа. Річка Поперечная. 28-го іюля. Безъимянка, текущая съ Шамана въ Б. Кызасъ, на влажныхъ лугахъ.

Inula salicina L.

19-го іюля. С. Таштынское, на выгонъ. Почва красная глина. 3-го августа. Матуръ. 4-го августа. Р. Сея, притокъ Таштына.

Ptarmica impatiens. Dec.

28-го іюня. Немиръ. 15-го іюля. Хребетъ Кизель, водораздѣлъ Томи и Тереньсука, на склонѣ хребта, на елани. 10-го августа. Берега Томи: на горѣ, заростей травой. 3-го августа. Матуръ.

Achillea millifolia. L. var. Setacea. Земляной ладанъ (кре-

стьяне, казаки).

19-го іюля. Окрестности Таштыпа; на степныхъ лугахъ. 20-го іюля. Карча; на известковыхъ утесахъ. 4-го августа. Матуръ. 6-го августа. Нижнее теченіе Матура. Ростетъ соціально на высокихъ лугахъ. Попадается въ верховьяхъ Аскиза по Берекчулу, близь устья. Изъ листьевъ варятъ мазь и употребляютъ отъ порѣзовъ. (казаки, крестьяне).

Tanacetum vulgare. 1.

22-го іюля. Абаканскій заводъ; по окраинамъ дорогъ и межей. 3-го августа. Матуръ.

Artemisia vulgaris. L.

4-го августа. Сея. 6-го августа. Матуръ, на Пашнъ, около улуса.

Artemisia frigida. W.

27-го іюля. Б. Анзасъ. По горамъ между Анзасомъ и Чебальсукомъ. Подпочва роговообманковый сланецъ.

Leontopodium sibiricum. Cass.

20-го августа. Горы Кыихъ-Тасъ (краснобурый песчанникъ); по берегу М. Еси. Обыкновенно на Узунжулъ и Немиръ, на сухихъ почвахъ степныхъ горъ.

Sigularia sibirica. Cass.

7-го августа. Берега нижняго теченія Матура. На кочкахъ, на болотинъ.

Aronicum altaicum. Dec.

26-го іюня. Немиръ, улусъ Аптыша. Въ ръдкомъ лиственичномъ лъсу.

Cacalia hastata. L. var. pubensans.

6-го августа. На лъсистыхъ дугахъ по Матуру и Магазъ. Достигаетъ 8 ф.

Senecio crucifolius. L.

20-го іюля. Абаканскій заводъ. На лугахъ по берегамъ Кени. 27-го іюля. Чебалсукъ. Низкорослое на отвалахъ золотоносныхъ песковъ, на лугахъ достигаетъ $2^1/_2$ ф.

Senecio compestris, Dec.

23-го іюня. Немиръ. На горахъ, близь дачи Кузнецова. Подпочва гранитъ. Слой почвы скуденъ и тонокъ.

Senecio saracenicus. L.

10-го іюля. Берега Томи; на лугахъ. 27-го іюля. Мрасса.

Seratula coronata. L. Серпуха (казаки, крестьяне).

3-го и 6-го августа. Матуръ. На дугахъ въ тайгъ. Ростетъ изолированно. Встръчается на Магазъ и Кызасахъ. Изъ листьевъ вывариваютъ желтую краску для краски яицъ.

Seratula glauca. Ledeb.

2-го іюля. Крямганъ. Въ тайгъ; ростеть отдъльными группами. Leuzea carthamoides. Dec. Сынъ-оттъ. Изюбрева трава(татары). 28-го іюля. На покатости Шамана къ Анзасу. 31-го іюля. На Крестъ-Таскылъ, на съдловинъ горы. Ростетъ соціально; достигаетъ 5 и 6 ф. Встричается и на покатости гольцевъ Хансыка. Корень употребляется татарами, какъ афродизіотическое средство (сагаи, бельтиры). 14-го августа. Саянскій хребеть.

Carduus erispus. L.

1-го августа. Матуръ. 10-го іюля. Берега Томи; на таежнычъ лугахъ; ростетъ соціально. 27-го іюля. Берега Чебальсука, Б. Анзаса и Кызаса; достигаетъ 6, 7 и 8 ф. 6-го августа. Матуръ, на таежныхъ лугахъ.

Nº 88:

7-го августа. Берега Матура и Магазы; на еланяхъ (логовая прогалина въ тайгѣ), на мѣстахъ, доступныхъ солнцу; достигаетъ 8 и 9 фут.

№ 24 и 100. Cirsium stratuloides. Осотъ (казаки, крестьяне). 20-го іюля. Абаканскій заводъ; на лужайкъ за домомъ заводовладъльца. 6-го августа. Нижнее теченіе Матура. На старыхъ пашняхъ; ростетъ соціально; достигаетъ $5^1/_2$ ф. Встрѣчается на лугахъ въ вершинъ Аскыза; обыкновененъ на степныхъ лугахъ по Тев и Таштыцу.

Cirsium heterophyllum. Alb. Таежный осоть (казаки, крестьяне). 8-го іюля. Берега Томи, ниже устья Пыскымджи. На таежныхъ лугахъ; ростетъ соціально; зацевтаетъ; достигаетъ уже 5 и 6 ф. 15-го августа. Ръчка Поперечная, притокъ Кантигира.

Cirsium acaule. Alb. var. sibirica. Исъ-чехъ (сагаи). 19-го августа, с. Аскызское; на лугахъ, около ръки, больше всего между группами и кустиками Jris biglumis.

Saussurea glomerata. P.

19-го августа. Нижнее теченіе Аскыза; на лугахъ; почва солонпеватая глина.

Saussurea robusta. Ledb. Буланъ-гулакъ-оттъ и Позу-оттъ (черневые татары) 22-го іюня. Аккая на Мрассъ. 14-го августа. Саянскій хребетъ.

Растеніе сушать и варять, затімь отділяють листья оть стебля и получають красную краску, которой красять нитки (черневые татары).

Saussurea serrata. Dc.

28-го іюля. На старыхъ отвалахъ золотоносной россыни, на Ильинскомъ прінскъ по Б. Кызасу.

Tragopogon orientalis. L.

27-го іюня. Степные берега Нини. Абаканскій заводъ, на лугахъ около Абакана. 20-го іюля. Встрѣчается на степныхъ лугахъ въ вершинѣ Аскыза, а также по Еси, Теѣ, Таштыну и Кени.

Scozzonera radiata. Fisch.

26-го іюня. Немиръ. На склонахъ горъ, поросшихъ рѣдкой травой.

NºNº 66, 81, 102.

2-го іюля. Криштанъ. Ростетъ соціально, образуя сплошной коверъ. 28-го іюля. Таскылъ-Шаманъ, на горныхъ лугахъ. 31-го іюля. Хребетъ Кансынъ или Хансынъ; по уступамъ утесовъ.

Hieracium chrysonthemum. Led.

13-го августа. Карасюбе. 15-го августа. Поперечная, притокъ Кантигира.

Crepis lyrata Trol.

27-го іюня. Въ полугоръ хребта, по берегу Иссыхъ-чула, среди густой травы.

Crepis tectorum. L.

27-го іюня. На отвадахъ по рѣчкѣ Чебалсукъ. На дугахъ до-ходить до $1^{1}/_{2}$ ф. 4-го августа. Р. Сея.

Crepis sibirica L.

13-го іюля. Балыкса. 19-го іюля. С. Таштыпское. Почти всюду отцвѣлъ, кромѣ высокихъ горныхъ склоновъ. 3-го августа. Матуръ. 4-го августа. Сел.

Mulgedium sibiricum. Less.

1-го августа. Матуръ.

Campanula glomerata. L.

22-го іюля. Абаканскій заводъ; въ саду владѣльца, по берегу рудной Кени. 11-го іюля. Томь, близь устьевъ Балыксы. 4-го авгу-

ста. Сел. 6-го августа. Матуръ. Распространенъ по берегамъ ръчекъ на открытыхъ мъстахъ.

Campanula sibirica. I.

23-го іюня. Немиръ, хребетъ около дачи Кузнецова, на сухой, тощей почвв.

Campanula rotundifolia. L.

20-го іюля. Карга, на известнякахъ.

Campanula pilosa. Pall.

28-го іюля. Таскылъ-Шаманъ; на скопленіяхъ почвы въ трещинахъ скалъ.

Campanula persicifolia. L.

11-го іюля. Томь, между Тереньсукомъ и Балыксой, на открытомъ мъсть, на сънокосномъ лугу, близь Балыксы.

Adenophora marsupelflora. Fr. var.

4-го августа. Р. Сея, правый притокъ Таштына. 20-го августа. Гора Кыихтасъ на берегу М. Еси; на склонъ горы, поросшемъ ръдкимъ лиственичнымъ лъсомъ и мелкимъ кустарникомъ шиповника. Ростетъ изолированными недълимыми; подпочва щебень краснобураго песчанника.

Adenophora Lamarkii. Fisch? Меленгиръ (сагаи). Каскымъоттъ (черневые татары). Меленгиръ-же наз. какой-то видъ geranium.

11-го іюля. По правому берегу Тереньсука (глубокая водататары), близъ устья; подпочва кристаллическій стрый известнякъ. 12-го іюля. Берегъ Томи, близь Балыксы; подпочва гранитъ. Ростетъ отдёльными экземилярами, достигаетъ 4 и $5^{1}/_{2}$ ф. 27-го іюля. Мрасса. Корень выкапывають и ъдять сырымь (сагаи, черневые татары).

Vaccinium vitis ijdaej. L 26-го іюня. Немиръ; на моховикахъ по скаламъ. 24-го іюля. Лъса по горамъ около Карасюбе.

Rhododendron dauricum. L. Багульникъ (казаки, крестьяне). 12-го августа. Абаканскій заводъ, водораздёль В. и Рудной Кени; на горъ, подпочва кристаллическій известнякъ. Кустарникъ, достигающій 7 фут. Единственный встріченный цвітущій экземпляръ.

0

Rhododendron chrysanthum. Pall. Кашкара (казаки, крестьяне и татары).

28-го іюля. Таскыль-Шамань; выстилаеть трещины и прослойки глинистаго сланца въ верхней части Таскыла. Ни одного цвѣтущаго экземиляра не нашель ни на Шаманѣ, ни (31-го іюля) на Хансынѣ. На каждомъ экземилярѣ есть нѣсколько ярко-желтыхъ листьевъ, что издали производитъ иллюзію цвѣтка. Отваръ листьевъ употребляется, какъ средство отъ ревматическихъ болей. (казаки, татары). Растеніе подробно описано Паллассомъ, а потому не распространяюсь о немъ.

Pyrola minor. L.

21-го іюня. Немиръ; среди тальниковыхъ зарослей.

Primula cortusoides. L.

26-го іюня. Немиръ, на влажныхъ мъстахъ.

Primula officinalis. L. var. inflata. Led

23-го іюня. Немиръ; близь дороги на Узунжулъ; ростеть на открытыхъ мъстахъ.

Andresace filiformis. Retz.

14-го августа. Водораздёлъ хребта Карасюбе и Кантигира.

Androsace, Sp.

26-го іюня. Немиръ, улусъ Аптыша, на солнечной сторонъ, на скудной почвъ горнаго хребта; подпочва порфировый щебень.

Cortusa Mathioli. L. Нарнатосъ, акпаштыгъ-оттъ, Карнатъ пёрё (черневые татары).

26-го іюня. На берегахъ Немира. 2-го іюля. Гора Крлыганъ, вершина Нини и Аскыза; на опушкъ пихтоваго лъса.

Ghaux maritima. L.

26-го іюня. Немиръ, улусъ Аптыша; на иловатой почвъ, совивстно съ Potentilla anserina.

Lysimachia vulgaris. L. 27-го іюня. Мрасса.

Gentiana.

28-го іюля. Таскыль-Шамань; на горныхь дугахь; соціально. 14-го августа. Саянскій хребеть. 15-го августа. Поперечная, притокъ Кантигира.

Gentiana Pneunomanthe. L.

13-го августа. Карасюбе.

Gentiana macrophilla. Pall. Луговой зв робой (казаки, крестьяне). 6-го августа. Нижнее теченіе Матура; на прирѣчныхъ лугахъ, на иловатой почвъ. При ушибахъ и переломахъ, на больное мъсто

кладуть припарку изъ листьевъ (казаки, татары).

Gentiana decumbens. L.

20-го августа. Гора Книхъ-Тассъ, близь М. Еси, вершина горы; подпочва щебень краснобураго известковаго песчанника. Обыкновенно на утесахъ по Еси, Тек и Таштыпу.

Gentiana frigida. Haub.

31-го іюля. На утесахъ Хансына, въ разселинахъ, впадинахъ и на карнизахъ столбовиднаго порфира. 14-го августа. Саянскій хребеть и водораздёль Карасюбе и Кантигира.

Gentiana altaica. Pall.

14-го августа. Водоразделъ Карасюбе и Кантигира.

Polemonium coeruleum. L. Базіать-отть (черневые татары). 21-го августа. Немиръ. Въ редкомъ лиственномъ лесу. 22-го іюля. Аккая, на Мрассъ.

Convolvulus arvensis. L. sagittatus. Led. Casaxy-оттъ (чер-

невые татары).

5-го іюля. Хребетъ Кизель, между Томью и Тереньсой; среди стараго, горълаго лъса; почва черная съ галькой и хрящемъ; подпочва кристаллическій известнякъ; на вершин'в низкаго отрога хребта.

Pulmonaria molles. Wolff.

21-го іюня. Немиръ, улусь Аптыша; по лесной опушке. 4-го іюля. Вершина Томи, по ручью около нетающаго снъга, совмъстно съ Erythronium dens canis.

Myosotis sylvatica. Wolff.

14-го августа. Саянскій хребетъ.

Myosotis palustris. L.

21-го іюня. Немиръ; поскотина улуса Аптыша; ростеть соціально; взято близь раки.

Onosma Gmelini. Led. seu echioides. Татарскія румяна. 20-го августа. Степные луга по Аскызу. Изъ корня добываютъ краску для румянъ (татары).

Sinaria genistaefolia. M. M.

19-го іюли: С. Таштынское. Распространено на сухихъ лугахъ по Еси, Тев и Таштыну; ростетъ соціально.

Veronica longifolia. L.

26-го іюня. Немиръ; около воды. 8-го августа. Матуръ.

Veronica incana. L.

Veronica austriaca. L.

22 и 23-го іюня. Немиръ, дача Кувнецова; на открытыхъ мѣстахъ и на горахъ, на каменистой, скудной почвъ.

Euphrasia officinalis. L.

20-го іюля. Карга, на известнякахъ. 27-го іюля. На старыхъ отвалахъ россыпи по Чебалсуку:

Rhinanthus Crista Galli. L. 4-го августа. Рвчка Сея.

Pedicularis venusta. Schony.

4-го іюля. Верхнее теченіе Томи; на низкихъ, сырыхъ лугахъ. 28-го іюля. На влажныхъ лугахъ, по Безъимянкъ, текущей въ Кызасъ.

Pedicularis resupinata. L.

24-го поля. На сухихъ мъстахъ по берегамъ Карасюбе. 4-го августа. Р.: Сея.

Pedicularis. Spc.

22-го іоня. Немиръ. На опушка ласа; ростеть на скудныхъ почвахъ горныхъ склоновъ.

Verbascum Thapsus. L.

20-го іюля. Абаканскій заводъ; берега Кени; близь магнитна-го рудника; почва рыхлая глина; ростеть изолированно, достигаеть 6 фут.

Zizipora dinopodiodes. Lin.

19-го іюня. Таштыпь, по окраинамъ канавъ, рытвинъ и на выгонъ 21-го августа. Гора Кыихтасъ, около М. Еси; по склонамъ горы, на песчанниковомъ щебнъ, прикрытомъ скудной почвой; ростетъ компактными группами.

Origanum vulgaris. L.

11-го іюня. Томь, близь устьевъ Балыксы; на сѣнокосномъ лугу. 19-го іюля. Таштыпъ; горная покатость, по вырубленному березовому лѣсу. 20-го іюля. Карга; на известнякахъ.

Thymus serpyllum. L. var. angustifolium. Led. Ирбень (татары). 26-го іюня. Немиръ; на известковыхъ утесахъ. 19-го августа. Таштыпъ; преимущественно на известковыхъ утесахъ; очень обыкновенно по Теъ, Аскызу и Уйбату. Употребляется, какъ окуриваніе при нъкоторыхъ языческихъ обрядахъ у татаръ. Idem—у черневыхъ татаръ наз. Чаланъ-Кучузе.

Thymus serpillum. L. var. vulgaris. L. 13-го іюля. Балыкса.

Nepeta lavandulacca. L. fil. : 1000 1000 1000

19-го іюля. Выгонъ с. Таштынскаго. Обыкновенно на утесахъ по Аскызу и Берекчулу.

Dracocephalum Ruyschianum. L.

11-го іюля. Томь, близь устья Тереньсука; на утесахъ; подпочва гранитный щебень.

Dracocephalum altajense. Led.

2-го іюля. Гора Крлыганъ; близь вершины гольца. 28-го іюля. На влажныхъ лугахъ, по Безъимянкѣ, текущей въ Б. Кызасъ. 14-го августа. Саянскій хребетъ и водораздѣлъ Карасюбе и Кантигира.

Dracocephalum foetedum. Bg. Парагъ-оттъ (татары).

26-го іюня. Немиръ, около улуса Аптыша, на порфировыхъ утесахъ. 19-го іюля. Выгонъ с. Таштынскаго; почва глина; 13-го іюля. Балыкса.

Dracocephalum nutans. L.

27-го іюня. У подошвы сланцевыхъ утесовъ по Чебалсуку.

Dracocephalum.

13-го іюля. Балыкса. 20-го іюля. Карга, на известнякахъ.

Prunella vulgaris. L. Кучю? (черневые татары. Также называется одина, Vicia). Диандопси динавий выправления полисить по

13-го іюля. Балыкса. 20-го іюля. Карга, известнякъ. 27-го іюля. Мрасса. 6-го августа. Нижнее теченіе Матура; на лугахъ около улуса.

Galeopsis tetrahit. L.

4-го августа. Р. Сел. 6-го августа. Нижнее теченіе Матура; на влажныхъ лугахъ и на старой пашнъ.

Ballota tanata L.

20-го августа. Гора Кыихъ-тасъ, около М. Еси; на разрушенной, вывътрившейся осыни краснобураго песчанника.

Lamium album. L.

26-го іюня. Немиръ, улусъ Аптыша; на лъсныхъ опушкахъ, около гніющихъ деревьевъ, на старыхъ муравейникахъ и на сорныхъ кучахъ.

Phlomis tuberosa. L. Медунникъ (казаки, крестьяне).

23-го іюня. Немиръ, дача Кузнедова, близь дороги 3 и 6-го августа. Матуръ; на поскотинъ улуса.

Goniolimon speciosum. Boiss. Пюръ-оттъ, волчья трава (сагайскіе татары).

27-го іюня. Гора Соипъ, устье р. Немиръ, праваго притока Нини. Подпочву образуютъ порфировие утесы. Ростетъ на степныхъ утесахъ, на сухой почвѣ разбросанно. Листья употребляются въ видѣ отвара, какъ лекарство отъ ломоты и разстройства желудка. Мужчина долженъ пить отваръ листьевъ отъ экземпляра съ развитой цвѣтоножкой и цвѣтами. Женщины выбираютъ экземпляры съ одними корневыми листьями: по этому различаютъ мужскую и женскую волчью траву. Если выкопать Пюръ-оттъ и не заровнять потомъ ямки—будетъ ненастье. Раненый или больной волкъ ищетъ Пюръ-оттъ и, если у него еще хватитъ силъ сорвать зубами и съѣсть немного этой травы, онъ выздоровѣетъ отъ самой трудной бользни и оправится отъ ранъ. (Сагайскіе татары на Немирѣ и М. Еси).

Slatice Gmelini. W.

18-го августа. Берега нижняго Аскыза. Почва солонцеватая красная глина.

Rheum Rhaponticum. L.

28-го іюля. Таскыль-Шамань, водораздёль Б. Анзаса и Б. и М. Кызасовь; на теневой стороне во впадинахь утесовь, состоящихь изъ глинистаго и зеленаго сланца. Листья достигають 4 ф.

въ поперечникъ, а высота стебля до 6 ф.

Rumex.

28-го іюля. Таскыль-Шамань. На лугахъ со стороны В. Анзаса у подошвы горы, на влажной почек; ростеть соціально.

Polygonum aviculare. L.

6-го августа. Нижнее теченіе Матура; ростеть по бокамъ дороги, по колеямъ и на межахъ.

Polygonum Bestorta. L.

14-го августа. Саянскій хребеть. Ріка Томь, ниже устья річки Поятымджи, на влажномъ лугу. 7-го іюля. Немиръ, около улуса Аптыша, противъ устья ключа Устанахъ. На поскотинъ улуса; почва влажная, м'естами болотистая. 26-го іюня. На влажныхъ лугахъ по Безъимянкъ, текущей съ Шамана въ Б. Кызасъ. 28-го іюля. На Крестъ-Таскиль (гора между М. Абаканомъ, М. и В. Кызасомъ), на съдловинъ горы, на лугу, проръзанномъ горными ручьями. Ростетъ соціально.

Polygonum polymorphum. Led. var. alpinum. Led. Кислица

(сибирскіе крестьяне).

27-го іюня. На влажныхъ берегахъ р. Нини, около воды. 28-го іюля. Таскылъ-Шаманъ. Около подножія Таскыла со стороны Везъимянки, текущей въ Анзасъ; на лугахъ.

Chenepodium album. L.

6 го августа. Матуръ; на сънокосныхъ лугахъ, близь зарослей тальника и черемухи. Изолированными группами.

Salix caprea. L. var.

2-го іюля. Горы Крлыганъ, вершина р.р. Нини и Аскыза. Образуетъ непроходимыя заросли по берегамъ ручьевъ, текущихъ съ снъжной вершины, вытъсняя съ этихъ мъстъ всякую другую растительность. Вверхъ по горъ подымается выше линіи лъсовъ.

Juniperus nana. W.

Низкорослый кустарникъ на вершинъ Крестъ-Таскила, -- гора между Б. и М. Кызасомъ и М. Абаканомъ.

Iris ruthenica. A. A.

23-го іюня. Немиръ, притокъ Нини. Около дачи Иннокентія Кузнецова, въ твиистомъ горномъ логу. Изолированно.

Orchis. Чернагъ-оттъ, Сюнъ-оттъ сугажина (черневые татары). 5-го іюля. Берега Каратаса, праваго притока Верхней Томи, на высокихъ луговинахъ. Соціально. Берега Таштына. 19-го іюля. Сопка около с. Таштынскаго. На влажныхъ горныхъ лугахъ.

Cypripedium guttatum. Ln.

23-го іюня. Немиръ. Въ тънистой ложбинъ между горъ, среди березовой поросли. Ростетъ соціально.

Cypripedium calceolus. L.

23-го іюня. Немиръ. Въ тѣнистой ложбинѣ, среди березоваго лѣса.

Cypripedium macranthum. Ln.

22-го іюня. Немиръ. Въ логу, среди березовой поросли. Ростеть соціально.

Erythronium dens canis. Кандыкъ (качинцы, сагаи и черневые татары).

4-го іюля. Вершина Томи, по ручью около нетающаго снѣга. Соціально. Корень выканывають, варять и сушать. Въ пищу употребляется вареный въ молокѣ или стертый и сваренный въ видѣ каши.

Hemerocalis flava. L.

19-го іюля. Окрестности Таштына. На сухихъ лугахъ. Обильно ростетъ на степныхъ лугахъ между Теей и Таштыномъ.

Lilium Martagon. L. Сарана (саган, качинцы), Саргай (черневые татары и бельтиры).

26-го іюня. Вершина ручья Устанахъ, лѣваго притока Немира; въ лѣсу, на черноземной почвѣ. 28-го іюля. На покатости горы Шаманъ къ Анзасу. 30-го іюля. На таежныхъ лугахъ по Кызасу. Достигаетъ 4 и 5 фут. Луковица идетъ въ пищу сырая и вареная.

Allium stellerianum. W. (Кюбергень - сагаи).

18-го августа. Берега Аскыза; на сухихъ почвахъ. Луковица идетъ въ приправу къ пищъ.

— Web. flor. rubra. Кюбергень (сагайцы). Оксуль (черневые татары).

13-го іюля. Валыкса. 20-го іюля. Росла на известнякахъ.

Почва лиственный перегной подпочва — кристаллическій Allium lineare. L. Кюбергень (сагаи, бельтиры).

19-го іюля. Таштынь. На горѣ, близь с. Таштынскаго, среди вырубленнаго березоваго мелкольсья.

Allium.

14-го августа. Саянскій хребетъ.

Аllium. Кюбергень (сагайскіе татары). Дикій лукъ (крестьяне). 25-го іюня. Немиръ. Улусъ Аптыша, противъ утеса Устанахъ. Низменная луговина, мъстами болотистая. Ростетъ изолированно. Перо идетъ, какъ приправа, въ пищу у русскаго населенія.

Allium tenuissinum. W.

13-го іюля. Балыкса, левый притокъ Томи.

Allium.

27 го іюля. Мрасса.

Veratrum album. L.

11-го іюля. Томь, близь устья Тереньсука; на луговыхъ мѣстахъ. Подпочва сізнитъ. Достигаетъ 6 ф. Ростетъ соціально.

Veratrum nigrum. L.

11-го іюля. Томь, близь устья Тереньсука. На горахъ. Достигаеть 6 ф. Ростеть изолированно.

Anticlea sibirica. Koth.

4-го августа. Р. Сея, правый притокъ Таштыпа.

Polygonatum officinale. All. Аголакъ (сагаи).

27-го іюня. С. З. склонъ горы Соинъ, при усть Немира, въ разсълинахъ скалъ и на мелкой осыпи порфировыхъ утесовъ.

Smilacina bifolia. Duf.

26-го іюня. Немиръ. На тѣневой сторонѣ влажныхъ выступовъ порфировыхъ утесовъ, покрытыхъ мохомъ.

Carex atrata. L. Черноголовникъ (крестьяне).

3-го іюля. Гора Кряштанъ, вершина Нини и Аскыза. 28-го іюля. Берега Безъимянки, впадающей въ Кызасъ. Ростетъ соціально на влажныхъ лугахъ.

15-го августа. Рѣчка Поперечная, притокъ Кантигира.

Dactylus glomerata. L.

6-го августа. Нижнее теченіе Матура, на старой пашнѣ. 27-го іюня. Берега Иссыхъ-Чула. На сухихъ мѣстахъ. Ростетъ соціально. Достигаетъ 5 ф.

Stipa sibirica. Ln?

25 и 26-го іюня. Немиръ, въ лиственичномъ рѣдкомъ лѣсу и на опушкахъ. Ростетъ и на старыхъ курганахъ, изолированно.

Agrostis alba. L. var. stolonifera.

4-го августа. Нижнее теченіе Матура; на лугахъ, около рѣки

Agrostis.

27-го іюля. Береговые луга р. Б. Азаса. На низкихъ мѣстахъ достигаетъ 5 и 6 ф.

Poa triviatis. L.

26-го іюня. Немиръ, около улуса Аптыша. Ростеть на опушкахъ лъса и на лугахъ.

Millium effusum. L.

10-го іюня. Въ Томской тайгь, на луговинахъ. Соціально.

Equisetum arvense. L.

10-го іюля. Берега Томи, въ тайгѣ, около воды. 27-го іюня. Берега Иссыхъ-Чула, праваго притова Нини. Около воды.

Equisetum sylvaticum. L.

10-го іюня. Берега Томи, въ тайгъ, совмъстно съ предъидущимъ.

Д. Клеменцъ.

BAMBTKA

О СТАРОМЪ РУСЛЪ ЕНИСЕЯ.

Пробажая въ прошломъ 1884 году отъ села Аскизскаго въ Минусинскъ правымъ берегомъ Абакана и пересъкши устье ръчки Беи, я встрътился съ явленіемъ, которое невольно остановило на себъ мое вниманіе.

Выше устья Беи берега Абакана сопровождаются утесистымигорами, окаймляющими его рачную равнину, имающую въ ширину около 4-хъ верстъ. Ниже впаденія Бен горы прерываются. Передъ путешественникомъ открывается равнина, шириною около-18 версть; съ съверо-востока она ограничена хребтомъ Изыхъ, понижающимся къ югу. Съ запада и юго-запада ее замыкаетъ хребеть Терба, а къ юго-востоку она уходить въ даль и глазу кажется, что предъломъ ея служатъ предгорія Саяна. Вглядъвшись ближе, замъчается, что равнина, какъ-бы постепенно повышается къ юго-востоку. Вся она покрыта густою, но невысокой травой; но мъстами на ней попадаются совершенно обнаженныя полосы, покрытыя сильно окатанной рачной галькой. Среди последней преобладають метаморфическія и кристаллическія изверженныя породы: очень много гранита, часто попадается полосатый метаморфическій сланець, кристаллическія роговообманковыя породы, черный роговикъ съ пророслями известковаго шпата, изръдка темнофіолетовый порфиръ съ хорошо развитыми, пластинчатыми кристаллами полеваго шпата. Между темъ мне было извъстно, что кристаллическія породы на берегу Абакана ниже устья Таштыпа и Монока не встрвчаются и горы, сопровождающія его берега, состоять изъ породъ слоистыхъ, принадлежащихъ

къ серіи мъстнаго краснаго песчанника, о которомъ я буду подробнъе говорить ниже. Ясно, что эта галька принесена откуда-то изъ-далека. Въ это-же время мив вспомнился разсказъ г. Мартьянова о томъ, что по дорогъ между Сабинскимъ и Означеннымъдеревни, лежащія у подножія предгорій Саянъ-онъ встрътиль широкую равнину, имъвшую форму стараго ръчнаго русла, усыпанную галькой и уходившую къ съверо-западу, повидимому къ Абакану. Не имъя возможности немедленно заняться осмотромъ равнины между Изыхомъ и устьемъ Беи, я ограничился занесеніемъ видіннаго въ записную книжку и наблюденія свои сообщилъ г. Мартьянову. Съ общаго совъта мы ръшили собирать свъдънія объ этой містности путемъ разспросовъ и при средствахъ и свободномъ времени сдёлать тамъ нёсколько экскурсій. Разспросныя свёдёнія подтверждали наши догадки. По разспросамъ оказалось, что на этой степи имбется цёлый рядъ прёсныхъ озеръ, дно которыхъ усыпано кристаллической галькой.

Лътомъ, въ іюль мъсяць ныньшняго 1885 года, я вмъсть съ г. Мартьяновымъ посётилъ деревню Означенную и поднимался на гору Итемъ съ цълью собрать матеріалы для петрографической карты Минусинскаго округа, въ области Саянскаго хребта. Во время этой экскурсіи съ горъ намъ удалось осмотръть всю стень до Абакана. Мы замътили, что на параллели деревни Огуръ ее пересвиаетъ невысокій хребеть, но въ одномъ мість, гді находится предполагаемое нами русло, онъ неожиданно понижается и переходить въ равнину. Въ юго-западно-свверо-восточномъ направленіи мы зам'ятили также рядъ невысокихъ хребтовъ, но невозножно было усмотр'ять образують-ли они непрерывную борозду на степной равнинъ, или ихъ гдъ-нибудь пересъваетъ степная долина. Концы хребтовъ вытягивались одинъ за другимъ и издали казалось, что вся степь перегорожена сплошнымъ рядомъ холмовъ. На параллели станицы Алтайской поднимался довольно высокій хребеть и оканчивался на степи высокою, утесистой горою Чалианъ. Чтобы разобраться въ этомъ лабиринтъ и ръшить вопросъ, возможно-ли предполагать на этой степи существованіе непрерывнаго стараго русла вплоть до Абакана, я ръшилъ про- вхать степью, безъ дороги, отъ деревни Означенной до перевоза на Енисев, подъ Синимъ камнемъ, противъ Минусинска. Отъ Означеннаго я взялъ направленіе къ с.-с.-з. (345°) на средину съдловины одного степнаго хребта, что и служило руководящей нитью для оріентированія въ пути. Эта поъздка, по интересовавшему меня вопросу, дала миъ слъдующіе результаты.

- 1) Начиная отъ Означеннаго степь покрыта во многихъ мѣстахъ гальками изъ гранита—преобладающей породы предгорій около деревни Означенной:
 - 2) Степные холмы нигдъ не представляють непрерывной цъпи.
- 3) Подъ самымъ хребтомъ, идущимъ на параллели Алтайской станицы, я встрътилъ высохшее озеро, нынъ заросшее густой травой.
- 4) Перевзжая хребты и лежащія между ними долины, я замівтиль на нихь сліды старыхь річныхь русль, но общая покать ихъ склонялась не къ нынішнему руслу Енисея, а на степь, къ ю.-з., заставляя предполагать, что гдівто вліво отъ моего пути находилось общее водовмівстилище этихъ рівкъ.
- 5) Степь по характеру своему напоминала скорве травяныя равнины юго-восточной Россіи, чёмъ солончаковыя степи лёваго берета Абакана. Мёстами на ней лежаль слой хорошаго чернозема. Близь горъ Алтайской станицы я нашелъ рядъ пашенъ. По всей степи, особенно на склонахъ горъ, виднёлись уцёлёвше остатки лёсовъ. Переваливши черезъ горы около станицы Алтайской, я нашелъ тамъ довольно густыя березовыя рощи, а мёстами виднёлись отдёльно стоящія лиственницы—растеніе чисто таежное, которое сухихъ, безводныхъ мёстъ не любитъ. Цёлый рядъ полустнившихъ пней и обрубовъ доказывалъ, что въ очень недавнее время здёсь росъ обильный строевой лёсъ.
 - 6) Русла старыхъ ръчекъ нигдъ не представляли обнаженій

размытыхъ утесовъ. Ни одного ръзко обозначеннаго вихода коренныхъ породъ я не встрътилъ; только мъстами обломки камней дали миъ возможность догадаться, что степные холмы на моемъ пути состоятъ изъ съробураго известняка, проросшаго красными, черными и сърыми роговиками. Эта порода одинъ изъ членовъ серіи краснобураго песчанника, который развить въ громадныхъ размърахъ въ долинъ Енисея и, по свидътельству путешественниковъ, тянется съ небольшими перерывами отъ Томи до Лены (Чихачевъ, Эрманъ, Черскій). Стало быть, галька, попадавшаяся миъ по дорогъ, не могла происходить изъ породъ сосъднихъ, степныхъ холмовъ.

Не зная мъстности, я и дорогу выбралъ неудачно; отъ предполагаемаго русла Енисея, или другой большой ръки, я уклонился слишкомъ вправо, — мнъ слъдовало бы взять гораздо больше къ западу. Отклоняться отъ принятаго направленія было рискованно: мнъ пужно было до перевоза на Енисев проъхать 80 слишкомъ верстъ по безводной степи. Пришлось ограничиться тъмъ, что лежало прямо на пути. Наблюденія и замътки, не относящіяся прямо къ данному вопросу, я обхожу молчаніемъ.

Черезъ мъсяцъ мнѣ удалось сдѣлать болѣе продолжительную экскурсію. Я направился изъ Минусинска, черезъ перевозъ подъ Синимъ камнемъ въ село Бейское. Для этого надобно было пересъчь степь вплоть до предгорій Саянскаго хребта съ с.-в. на ю.-з. Въ этомъ направленіи мнѣ непремѣнно пришлось-бы пересъчь предполагаемое мною русло Енисея и такимъ образомъ найти или положительные факты, свидѣтельствующіе въ пользу родившагося предположенія, или явленія, доказывающія несообразность гипотезы съ дѣйствительностью.

Обнаженія на высокихъ берегахъ Енисея показываютъ, что рѣка течетъ здѣсь въ трансверсальной долинѣ, и хребетъ около станицы Алтайской представляетъ собою непосредственное продолженіе горъ около деревни Каменки и устья рѣки Ои. По дорогѣ отъ перевоза въ дер. Бею приходится прямо ѣхать на ю.-ю.-з.,

оставляя въ сторонъ тракть, идущій по берегу Абакана. Здъсь путешественникъ вдетъ поперекъ юго-восточныхъ и восточныхъ продолжений хребта Изыхъ на Абаканъ, вплоть до подъема на продолжение горъ Алтайской станицы, носящихъ название Борковъ. Съ высшей точки перевала видно, что горы около Алтайской станицы, Борки и Изыхъ, составляютъ одну непрерывную возвышенность. За переваломъ дорога идетъ вдоль небольшаго ручья Карасукъ въ з.-ю.-з. направленіи. По бокамъ долины ръчки остатки лъса, русло завалено обломками съробураго песчанника съ роговиками. Спускаясь ниже по ручью, мы замъчаемъ, что склоны горы покрыты высокой песчаной террасой, только сверху прикрытой дюйма на полтора слоемъ черной почвы. Въ этихъ песчаныхъ террасахъ весеннія воды прорыли глубокіе каналы во всевозможныхъ направленіяхъ. Песокъ крупный, темноохристаго двъта. Тамъ, гдъ онъ размыть до дна, видънъ болъе плотный красноватый, а мъстами и зеленоватый песокъ. Въ немъ больше глины, а потому онъ и размывается медлениве. Песчапая терраса эта мъстами такъ размыта, что для описанія вида ся приходится прибъгнуть къ сравненію съ болотомъ, поросшимъ кочками. Остатки этой террасы стоять словно гигантскія кочки на высохшемъ болотъ. Сходство довершается еще тъмъ, что уцълъвшіе отъ разныва песчаные столбы и столы покрыты сверху травяной растительностью. При началъ спуска съ пологой возвышенности, гдъ проръзанъ себъ ложе Карасукъ, столбики и участки неразмытаго наноса невысоки, около полуторыхъ футовъ, потомъ ниже высота ихъ доходитъ до 4, а при началъ равнины они снова понижаются. Руческъ вливается въ озеро Култукъ около 80 саж. шириною и 4-хъ верстъ длиною; берега его поросли Iris biglumis; глубина по стремя коню; дно вязкое, иловатое. Бъдная татарская лътняя стоянка изъ 4-хъ юртъ расположена на озеръ и съ берега его открывается далекій видъ во всъ стороны. На с. и с.-з., вилоть до Абакана тянстся открытая равнина,

ограниченная съ востока Изыхомъ. Здёсь видно, что хребетъ этотъ непосредственно сливается съ продолжениемъ горъ Алтайской станицы. Къ з. и ю.-з. совершенно горизонтальная равнина шириною верстъ въ 18; на границѣ ея проходитъ невысокій степной хребеть — Терба, къ югу видънъ Саянскій хребеть, видъ къ ю.-в. загороженъ выступомъ хребта Борковъ. Прямо къ югу отъ озера Култукъ лежитъ другое, меньшее, и все пространство между ними усыпано галькой, въ которой преобладають гранить и метаморфическіе сланцы. Ознакомившись въ предъидущую повздку въ Означенное съ горными породами Саянскихъ предгорій, я теперь смъло берусь утверждать, что галька на озерахъ изъ породъ Саянскаго хребта. Около Означеннаго есть характерная разновидность гранита. Бъловатие пласты этой породы, состоящіе изъ бълаго ортоклаза, черной слюды и роговой обманки съ сърымъ кварцемъ испещрены пластами и ядрами черной роговообманковой породы, величина зерна ея измёняется отъ ясно-зернистаго сложенія до афанитоваго, гдё отдёльные кристаллики съ трудомъ видны въ лупу. Въ целомъ утесъ изъ такой породы представляеть бёловатую или сёроватую массу, иногда имеющую бльднорозовый оттьнокъ, пересъченную въ разныхъ направленіяхъ полосами цвъта наюсной икры. Кромъ Означеннаго такой гранить найдень мною въ вершинахъ ръчки Беи, но последняя течеть изъ того-же хребта, который просвиаеть Енисей у Означеннаго. Ръчку Бею отдъляетъ сплошной хребетъ отъ разсматриваемаго нами мъста, потому и мъсторождение Означенскаго гранита около Бен упоминается только для всякаго случая, во избъжаніе возраженій на будущее время, что дескать описываемый гранить не составляеть исключительной принадлежности Енисейскаго ущелья у Означеннаго.

Перебирая образцы гальки на равнинъ между двумя степными озерами, я и нашелъ два куска гранита съ характерными полосами черной роговообманковой породы. Одинъ изъ нихъ, наиболье характерный затерялся при пересылкь, другой я буду имъть честь препроводить въ Западно-Сибирскій Отдыть Географическаго Общества. Онъ сильно обкатань, какъ и следовало ожидать: отъ белой, полевошпатово-кварцевой массы остались только следы, роговообманковая масса мелкаго зерна и отъ действія воды и выветриванія приняла грязно-зеленоватый цвёть.

Два озерка лежать въ углублени почвы, за ними тянется полоса степной почвы, которая лежить футовъ на 5 выше дожбины озеръ. Пересъкая ее по дорогъ въ Бею, я полагаю ширину ея въ этомъ мъстъ около 2-хъ верстъ. Дальше снова небольшое углубление почвы, вмъсто чернаго супеску тонкий черный илъ и рядъ галекъ.

За вторымъ углубленіемъ почвы снова небольшое повышеніе ея, которое, однако-же, стоитъ ниже уровня перваго и мы пересъкаемъ по дорогѣ третью лощинку, съ признаками высохшаго озера.

Четвертая лощина проходить у самаго подножія хребта Терба, отдівляющаго нашу равнину оть долины різчки Беи. На послівдней лощині много гальки и хребеть Терба, ограничивающій ее съ запада и юго-запада, утесисть и обрывисть. Я не обинуясь вижу здісь уже не простую лощину, а старое різчное русло, воды котораго подмывали и заставляли обнажаться, обламываться и осыпаться хребеть Тербу, состоящій изъ слоистыхь породъ серіи краснобураго песчанника.

Если смотръть съ равнины по направленію къ Абакану, мы замътимъ недалеко отъ хребта Тербы отдъльно стоящую среди степи горку. Въроятно, она составляла одно цълое съ хребтомъ, но воды размыли между ними долину.

Безъ всякихъ претензій на точность, а лишь для нагляднаго изображенія сказаннаго, я прилагаю къ письму сдъланный отъ руки чертежъ этой мъстности, а на обороть его схематическій профиль равнины между Борками и Тербой.

Объясняю я описываемыя мною явленія слѣдующимъ образомъ: Нѣкогда, какая-то довольно значительная рѣка текла по этой равнинъ, она и нанесла и намыла цълыя груды неску около Борковъ; западнаго и юго-западнаго края Изыха и вслъдствіе этогоначалось постепенное отступаніе ея къ западу и юго-западу—
четыре замъченныя мною ложбины—послъдовательныя границы ея
береговыхъ террасъ. Въ участкъ своего теченія, занятаго нынъ
равниной, она отлагала террасы исключительно на правомъ берегу, предполагая теченіе ръки съ ю.-ю.-в. на с.-с.-з:; лъвый-же
берегь подмывался и разрушался ею—утесы и обрывы хр. Тербы.

Высохшія русла ръкъ, о которыхъ упомянуто было выше, изливались въ общій водоемъ. Три степныя ръчки Калы, о которыхъ упоминаеть въ своемъ путешествіи Шварць, не терялись въ степныхъ болотахъ, а впадали въ предполагаемую мною ръку съ лъвой стороны.

Какая это была река? Всего вероятнее Енисей. Поблизости здесь неть другаго речнаго бассейна, достаточно значительнаго. Есть, правда, три упомянутыхь речки Калы, но начало ихъ лежить недалеко, въ предгоріяхъ Саянскаго хребта; врядь ли оне могли когда либо иметь достаточный запась воды для образованія такихъ значительныхъ и широкихъ наносныхъ террасъ.

Воть еще ивсколько соображений по тому-же поводу.

Поднявшись на хребетъ Изыхъ, путникъ видитъ передъ собой все теченіе Абакана отъ Уйбата, его послъдняго притока, до Енисея. За Уйбатомъ къ с. и с.-в. стелется равнина, ограниченная невысокимъ степнымъ кряжемъ,—уваломъ, сказалъ-бы я по-сибирски. Этотъ уваль—лъвый берегъ протоки Абакана, Ташебы. Шварцъ напрасно на своей картъ заставилъ ее брать начало, гдъто въ степи между Абаканомъ и Енисеемъ и сдълалъ изъ нея самостоятельный притокъ Абакана. Новъйшія карты, которыя я видълъ только мелькомъ, не повторяютъ, какъ кажется, этой ошибки. Теперь эта протока заливается Абаканомъ лишь въ половодье и я горькимъ опытомъ убъдился, прошлой весной, что шутить съ ней въ эту пору нельзя. Устье Ташебы верстъ 25 ниже нынъшняго устья Абакана, а вся мъстность между послъднимъ и пер-

вою образуеть низменность, ивстами покрытую озерками и болот-

Ниже устья Ташебы начинаются горы на левомъ берегу Енисея и одна изъ нихъ, круго спускающанся къ современному его руслу, Куня получила извъстность, благодаря связаннымъ съ нею преданіямъ мъстной старины. Противъ Куни, на правомъ берегу ръки Тубы, поднимаются также скалы краснаго песчанника. Глядя съ Изыха, вы видите, какъ-бы громадные ворота, образуемые Куней и Тубинскими горами, въ которыхъ и течетъ Енисей.

Если взять въ разсчетъ направленіе Тербинско-Борковской равнины и ворота Енисея у Куни, то они составять продолженіе другъ-друга, и уваль, образующій нынѣ лѣвый берегъ Ташебы, былъ лѣвымъ берегомъ Енисея, въ который Абаканъ впадаль около нынѣшняго хребта Изыхъ, хотя, можетъ быть, правильнѣе было-бы сказать, что Енисей впадалъ въ Абаканъ, и эти двѣ могучихъ рѣки, слившись вмъстъ, пробили поперечную долину въ горахъ ниже устья Тубы и выработали ложе для Енисея.

Позволю себъ, въ заключеніе, привести нъсколько строкъ изъ Чихачева, посвященныхъ одному изъ участковъ поперечной долины Енисея ("Voyage scientifique dans l' Altai oriental. Paris, 1845).

Описывая песчанники, горизонтально лежаще около деревни Базуновой, на правомъ берегу Енисея, въ 50 верстахъ ниже Минусинска, о лъвомъ берегъ его онъ говоритъ:

"Une rempart semblable borde la rive opposée du Yenissey, où une denudation se présente sur une échelle encore plus considérable. Lorsque on examine l'horizontalité des couches et la parfaite correspondance, qu'elles offrent entre elles des deux côtes du fleuve, on est presque effrayé de la masse, qui a dû disparaître pour former le let du Yenissey" (203 p., partie 1-ère)¹).

¹⁾ Подобный валь окаймляеть и противоположный берегь Енисся, гдё обнажение представляется еще болёе значительнымъ. Разсматривая направление и уровень пластовъ и совершенное сходство ихъ между собой по обоимъ берегамъ рёки, можно почти ужаспуться той массы, какая должна была исчезнуть, чтобы образовать русло Енисен.

Ред.

Высказавши свои предположенія относительно стараго русла Енисея, я далекъ еще отъ мысли считать вопросъ ръшеннымъ; кромъ того, съ нимъ связанъ цълый рядъ другихъ вопросовъ о береговыхъ образованіяхъ Енисея и Абакана, о возрасть острововъ на Енисев, которые можно разобрать и освътить лишь при ръшеніи вопроса о старомъ русль Енисея. Для выясненія этого вопроса по моему необходимо сдълать слъдующее:


- 1) Пройти съ нивеллиромъ отъ Абакана до Означеннаго на Енисев и снять на планъ всю равнину между Изыхомъ и Тербой.
- 2) Провхать въ разнихъ направленіяхъ степь между станицей Алтайской, деревнями Калы, Сабинское и селомъ Бейскимъ.
- 3) Осмотръть берега Енисея отъ Означеннаго до Алтайской станицы, обращая главное вниманіе на береговыя новъйшія отложенія:
- 4) Осмотръть правый берегь Енисея между деревнею Означенною и станинею Шудерскей, гдъ найдены были геологомъ Лопатинымъ валуны съ весьма загадочными изборожденіями, а также и интересныя обнаженія новъйшихъ отложеній—можеть быть ледниковыхъ.

Вопросъ объ изборожденныхъ валунахъ самъ по себъ представляетъ значительный интересъ. Г. Черскій, въ бытность свою въ Минусинскъ, нашелъ подобный на Енисеъ, ниже города, около деревни Быстрой. Я самъ нашелъ подобный около города, на берегу Тагарской протоки Енисея.

Борозды на этихъ валунахъ непохожи на ледниковыя. Разносъ ихъ по Енисею, нахождение въ разныхъ мъстахъ и, можетъ быть, нахождение на древнемъ руслъ Енисея, могли-бы пролить много свъта на историю этой ръки.

Product siding an Robert made of side of the

The state of the s





3 A M B T R A

0

ДЕВОНСКИХЪ ОТЛОЖЕНІЯХЪ МИНУСИНСКАГО ОКРУГА.

Село Бейское въ ученой литературъ получило извъстность, благодаря богатымъ мъсторожденіямъ девонскихъ окаменълостей, открытіемъ которыхъ наука обязана учредителю містнаго Минусинскаго Музен г. Мартьянову. По его указанію, извѣстный геологъ горный инженеръ И. А. Лонатинъ изследовалъ окрестности Беи, а профессоръ Штукенбергъ опредълилъ окаменълости и отнесъ ихъ къ девонской формаціи. Это были первыя описанныя научнымъ образомъ окамен влости девонской формаціи изъ Минусинскаго округа. Открывши въ прошломи году, вместе съ моимъ товарищемъ по экспедиціи въ верхній Абаканъ г. Венцковскимъ, мъсторождение окаменълостей около с. Таштыпскаго и потомъ въ горномъ кражъ между Уйбатомъ и Камыштой, я весьма интересовался осмотрёть уже изследованную научнымъ образомъ мёстность и сравнить условія залеганія сёрожелтыхъ известняковъ, содержащихъ остатки коралловъ и раковинъ, а также и отношенія этой породы къ серіи краснобураго песчанника. Передъ поъздкой моей и встрътиль въ Минусинскъ горнаго инженера И.А. Лопатина, который даль мив ивсколько цвиныхъ указаній относительно Бейскихъ окаменълостей, высказавшись при этомъ, что, благодаря сдвигамъ сфраго известняка, отношенія последняго къ красноцевтнымъ породамъ, преобладающимъ въ минусинскихъ степяхъ, крайне запутаны.

Такъ какъ подробный отчеть о повздкъ г. Лопатина въ с. Бейское нигдъ не напечатанъ, то я приведу здъсь краткое опи-

саніе посл'єдняго, и оно мні послужить исходной точкой для сравниванія другихь місторожденій.

Село Бейское расположено на широкой ръчной долинъ р. Беи, верстахъ въ 3-хъ ниже соединенія двухъ вершинъ этой ріки, берущихъ начало на съверо-восточныхъ склонахъ Уйскаго или съверно - Саянскаго хребта. Переваливъ черезъ вершину Беи, мы попадаемъ въ долину р. Уй, берущей начало изъ одного хребта рвчками Монокомъ и Табатомъ, но только съ разныхъ склоновъ. Петрографическій характерь горь тоть-же, какь и у с. Означеннаго, т.-е. вершина и ось хребта образована метаморфическими сланцами, то мельозернистыми, то порфировидными. Простираніе съ В. на З. при вертикальномъ паденіи или весьма близкомъ къ нему, съ наклономъ на Ю.-Ю.-В. Сланцы пересъкаетъ по линіи простиранія мощный пласть б'ёловато-сераго метаморфическаго известняка. Впереди этого гранитнаго предгорія идуть, параллельно ему, 2 кряжа. Изъ какихъ коренныхъ породъ состоитъ первый дознаться подлинно не удалось, - онъ покрыть густымъ слоемъ почвы. Второй состоить изъ крупнозернистаго зеленостраго песчанника; простираніе Ю.-З.—С.-В., наденіе С.-З. [48°. Подобную-же породу я встретиль нынешнимь летомь, также на предгоріяхь Северно-Саянскаго хребта, около дер. Калы, по левому берегу р. Б. Калы. Ближе къ Означенному этотъ невысокій кряжъ совершенно теряется въ степи, и около деревни мы встречаемъ только гранитный кряжь, аналогичный пересъкаемому р. Веей. Если мои предположенія о старомъ русл'в Енисея оправдаются, отсутствіе предгорій близь Означеннаго объяснится очень легко, —они были размыты широкой рікой. Но возвращаюсь къ окрестностямь с. Бейскаго.

Выйдя изъ горъ, рѣчка мѣняетъ Ю.-З. направленіе на западное. Съ дѣвой ея стороны высокая наносная площадь, нокрытая слоемъ черной, суглинистой земли, постепенно переходящая въ низменную рѣчную долину, на которой и раскинуто с. Бейское. По правому берегу хребетъ, идущій съ В. на З. Каковы его петрографическія отношенія къ хребту Терба, о которомъ я говориль въ замѣткѣ о старомъ руслѣ Енисея, мнѣ не удалось прослѣдить. О Тербѣ я упоминалъ, что онъ состоитъ изъ породъ, принадлежащихъ къ серіи краснобураго песчанника; хребетъ-же, идущій по правому берегу р. Бен, и заключаетъ въ себѣ тѣ пласты сърожелтаго известняка съ окаменѣлостями, которыя и служатъ главною цълью геологическихъ экскурсій въ с. Бейское.

Въ описаніи напластованій праваго берега Бей я буду слѣдовать тому порядку, въ которомъ породы выступають одна за другою по теченію рѣки. Здѣсь, какъ и въ предыдущей статьѣ о старомъ руслѣ Енисея, я, для наглядности, прилагаю чертежъ, изображающій описываемый мною берегъ р. Бей.

Выше села правый, высокій берегъ Беи покрыть яркокрасной неслоистой глиной (аа); спускъ къ ръкъ очень крутъ и вдоль него здёсь протоптали цёлый рядъ параллельныхъ тропинокъ, по которымъ поднимается на горы пасущійся скотъ. Выходовъ коренной породы здёсь невидно нигдё. Переходя небольшую, крутую но неглубокую промоину, мы встржчаемся съ сжрожелтымъ известнякомъ, содержащимъ окаменълости. Порода на вывътрълой поверхности имъетъ блъдно-охряный цвътъ, который въ свъжемъ расколъ переходитъ въ сърый, а часто темносърый, напоминающій по виду кремень. Въ последнемъ случав изломъ его слабо раковистъ. Виъстъ съ началомъ выходовъ известняка и горы праваго берега ръки значительно повышаются. Первая известняковая гора носящая названіе Крестовой, одна изъ высшихъ точекъ хребта вдоль праваго берега Беи. Горы здёсь сложены сплошь изъ известняка (bb). Порода эта крайне непрочна; на Крестовой горъ она сильно размыта и растоптана насущимся здёсь скотомъ. По уцълъвшимъ пластамъ напластованіе слъдующее: паденіе съ З. на В., уголъ около 20°. Въ нижнихъ пластахъ преобладаютъ окаменълости изъ родовъ Spirifer, Atrypa, Binchonella и другихъ, опредёлять которыя, даже приблизительно, я не берусь. Въ верхнихъ слояхъ преобладаютъ кораллы. Обнаженія известняка по берегу р. Беи тянутся версты на 2, но напластование ихъ крайне запутано, благодаря оползнямъ и сдвигамъ, такъ что я не рѣшаюсь опредёлить линіи первоначальнаго напластованія. Для примъра приведу нъсколько данныхъ, опредъляющихъ положение

пластовъ известняка на горъ, смежной съ Крестовой. Послъдняя отдълена отъ нея короткой, но чрезвычайно крутой промоиной. Въ точкъ № 1 простирание съ З. на В. и падение весьма слабое къ С. Въ точкъ № 2, нъсколько ниже по склону, простираніе 320°—140°, паденіе 25° къ Ю.-З. Въ точкѣ № 3, еще ниже по горь, простирание 330°—150° и пласть стоить вертикально. Почти у подошвы горы, въ точкъ № 4 напластование такое-же, какъ и въ № 2. Въ этихъ обнаженіяхъ мы имѣемъ дѣло съ очень обыкновенными на берегахъ ръкъ сдвигами. Повидимому, напластованіе нарушено менте всего въ № 1, но и здісь въ недалекомъ будущемъ будетъ сдвигъ, такъ какъ слои сильно подмыты и начинають осъдать по направленію къ ръкъ. Ниже по ръкъ тотьже желтовато-серый известнякь, но окаменелостей вы немь уже нътъ. Склоны горъ и здъсь покрыты переломанными, осъвшими и сдвинутыми съ мъста слоями. Желая найти болье надежное обнаженіе, я перешель чрезь горы мимо какого-то стараго кладбища, пересыкъ логъ, близь котораго лежить оно, и по Крутому логу вышель снова на ръку, недалеко отъ того мъста, гдъ въ Бею впадаетъ слъва ручей, но обнаженій не встрътилъ. Я нашелъ близь устья Крутого лога обломки камней, содержавшихъ тъ-же окаменълости, какъ и на Крестовой горъ, но кореннаго ихъ мъсторожденія розыскать не удалось.

За Крутымъ логомъ горы праваго берега сильно понижаются и, вмъсть съ тъмъ, мъняется и ихъ петрографическій составъ. Въ самомъ логу мы встръчаемъ бугры красной неслоистой глины. Пройдя логъ и не доходя мельници, встръчаемъ кремнистый, почти черный известнякъ (сс).

Онъ колется на тонкія плитки, иногда нѣсколько изогнутыя, изломъ мѣстами сахаровидный, мѣстами гладкій. Простираніе С.—Ю., паденіе вертикальное. Влиже къ мельницѣ общирные выходы сѣрозеленоватой глины, переслаивающейся съ крупнозернистымъ, плотнымъ, обнаженнымъ песчанникомъ (dd); эти пласты не встрѣчаются одинъ безъ другаго и залегаютъ среди краснобураго песчанника. Простираніе 325°—145°. Паденіе къ С.-В. 65°.

Около самой мельници мы находимъ утесы ярко-красной глины

съ прослойками свътло-сърой. Глина тонкослоиста и совершенно тождественна съ глинами таштыпскихъ утесовъ, о которыхъ ръчь будетъ ниже. Повидимому, эта порода сильно распространена внизъ по теченію Беи; на чертежъ она обозначена буквами (ее). Среди нея, ввидъ прослойки, снова встръчается съро-зеленоватал глина, сопровождающая бланжевый песчанникъ (дд). Здъсь стратиграфическое положеніе этихъ послъднихъ пластовъ слъдующее: простираніе 320°—150°, паденіе С.-В. _ 60°; другими словами,—тоже, что и выше мельницы. Эти слои уходятъ далеко въ горы праваго берега, не расширяясь и не выклинивансь среди красныхъ пестчанниковъ.

Къ В., за вершиной Крутого лога, горы понижаются очень полого. Онъ здъсь покрыты сплошь травой, и никакихъ обнаженій нъть. Приходится сознаться съ И. А. Лопатинымъ, что отношенія коралловаго и спирифероваго известняка къ красноцвътнымъ породамъ выражены здъсь крайне неясно. Принимая-же во вниманіе, что бейскія окамен'влости отнесены проф. Штукенвергомъ къ девонской формаціи, а самыя новыя изъ минусинскихъ напластованій, Изыхскія, къ нижнему ярусу камено-угольной или, точне, къ Ursa stufa, но проф. Шмальгаузену, положение краснаго песчанника и соподчиненныхъ ему напластованій естественные всего было отнести къ девонской формаціи; такъ это и дълалось, и первый такое м'всто назначиль красному песчаннику Сибири г. Чихачевъ, въ своемъ Voyage scie utifique de l' Altai oriental, p. 2-de, Grés rouge. Онъ упоминаетъ, что Эрманнъ нашелъ красные песчанники на Ленъ и около Иркутска съ девонскими окаменълостями. Впрочемъ, по словамъ г. Черскаго, иркутские красные песчанники принадлежать къ еще болъе древней эпохъ, силлурійской. Съ другой стороны, миъ лично извъстно нъсколько мъсторожденій окаменълостей среди пластовъ, принадлежащихъ несомнънно къ серіи краснобураго песчанника и совершенно подобныхъ Изыхскимъ, т.-е. ярусу Ursa stufa; таковы окаменелости на Минусинскихъ горахъ, близь деревни Кривой и на Тагарскомъ островъ, въ окрестностяхъ города. Ввиду всего этого, мѣоторожденіе девонскихъ окаменълостей и точное опредъление ихъ отношений къ краснымъ песчанникамъ, кромѣ мѣстнаго интереса, получаетъ и общее геологическое значеніе. Ursa stufa—ярусъ, лежащій на границахъ девонской и каменноугольной формацій. Если-бы была доказана принадлежность мѣсторожденій, подобныхъ Бейскимъ, къ ярусу красноцвѣтныхъ породъ, къ которымъ принадлежатъ и слои, опредѣленные въ качествѣ образованій Ursa stufa, то естественно отнести и послѣдній не къ нижней каменоугольной, а къ верхнедевонской формаціи. Совмѣстное нахожденіе тѣхъ и другихъ окаменѣлостей въ серіи пластовъ красныхъ песчанниковъ даетъ намъ и путь для опредѣленія эпохи, втеченіе которой наслоились мощные пласты красноцвѣтныхъ породъ въ долинѣ верхняго Енисея и Абакана.

Мив кажется, что мои экскурсіи нынвшняго года дають матеріаль для решенія этого вопроса.

Осмотръвши Бейское мъсторождение девонскихъ окаменълостей, н нашель въ немъ много аналогичныхъ черть съ открытымъ мною, вивств съ г. Венцковскимъ, въ прошломъ году мъсторождениемъ около с. Таштыпскаго, почему у меня явилось желаніе взглянуть. на него еще разъ. Изъ Беи я отправился въ с. Таштыпъ чрезъ деревни: Табатъ, Юдино, Моновъ, Арбаты и Абаканскій заводъ. Этоть кружный путь даваль мив возможность провхаться вдоль предгорій Саяна и собрать матеріаль для петрографической карты Минусинскаго округа. Чтобы не отвлекать внимание читателя, я обойду молчаніемъ подробности, неимѣющія прямаго отношенія къ излагаемому вопросу. Замвчу только, что около Табата мы снова встръчаемъ гранитний кряжъ, продолжение идущаго около с. Означеннаго, а по дорогъ изъ Табата въ Монокъ или, лучше сказать, до Абакана, между гранитнымъ кряжемъ и степью тянется параллельный предгоріямъ Саяна кряжъ, сложенный изъпородъ серіи краснобураго песчанника. Дер. Монокъ стоить какъ разъ на границъ тайги и степи. Начиная отсюда Абаканъ поворачиваетъ съ С.-С.-В. на С.-В. Почти прямо противъ деревни въ него вливается р. Таштыпъ. Лъвый берегъ Абакана здъсь крутъ и утесисть. Съ правой стороны р. Монокъ образовала у своего устья широкую, низменную луговину, на которой и расположена

деревня; но здёсь я обращу вниманіе читателя на холмы, окружающіе низменную луговину Монока, продолженіе предгорій Саянъ. Обнаженія въ нихъ поразили г. Чихачева своей правильной слоеватостью (Voyage, р. 181), и у-него приложенъ прекрасный рисунокъ части этихъ холмовъ, лежащихъ къ С. и С.-В. отъ деревни. Мой чертежъ (а табл. ІІ) представляетъ профиль тѣхъ-же холмовъ, но снятый съ другой точки; общій-же видъ ближайшихъ окрестностей Монока изображенъ на чертежѣ b; буквы на обоихъ чертежахъ имѣютъ одинаковое значеніе.

Общее простирание породъ, составляющихъ холмы, къ С., С.-В. и В. отъ д. Монокъ, до праваго берега р. Монока 320°-140°, паденіе къ С.-В. Съверный конецъ ихъ гораздо ниже и положе южнаго; здёсь они покрыты поросшей травой почвой, что обозначено на чертежѣ буквою а; за ними слѣдуютъ обнаженные слои в, представляющие перемежаемость крупнаго бланжеваго песчанника съ зеленоватосърой, ржавой глиной и черносърымъ кремнистымъ известнякомъ, совершенно тождественными со встръченными мною около Беи. Часть этихъ слоевъ сползла, и граница сдвига обозначена линіей АВ. За сдвигомъ уголъ паденія пластовъ достигаетъ 50°. Подъ этими породами лежатъ красные песчанники үү, переходящіе въ красныя глины съ съро-голубыми прослойками. Горы, стоящія на 2-мъ плань на чертежь а, табл. ІІ, сверху закрыты почвой и поросли березникомъ; тоже самое относится и къ горамъ, стоящимъ на третьемъ планъ, отдъленнымъ отъ первыхъ и вторыхъ глубокимъ оврагомъ. Ближе къ Моноку выступають обнажения желт-освраго известняка се, совершенно тождественнаго съ известнякомъ Бейскихъ окаменѣлостей. Найденные въ немъ органические остатки совершенно тождественны съ Бейскими, какъ это легко видъть изъ собранныхъ мною коллекцій, которыя я буду имъть честь передать въ распоряжение Западно-Сибирскаго Отдела. Эти слои се подстилаетъ зеленовато-серый известнякъ весьма грубаго зерна, обозначенный буквою р, и продолжается до самаго берега ръки Монока. Нъкогда Монокъ протекалъ уклоняясь къ С.-З. отъ нынешняго русла, свидетельствомъ чего служать старое его ложе и бугры песку около горъ, обозначенные на чертешъ д. За р. Монокомъ долина Абакана съуживается и превращается почти въ настоящее ущелье; неширокая тропинка вьется здёсь по крутымъ скаламъ краснобураго конгломерата, изъ котораго и состоять, главнымь образомь, горы за Монокомъ. Вершину хребта составляеть другая порода; она ясно-слоиста, имбеть съро-зеленоватый цвътъ, напластована согласно съ песчанникомъ р, и, хотя я не поднимался на вершину горы и образчика для доказательства представить не могу, но, по внышнему виду, не сомнъваюсь признать ее тождественною съ песчанникомъ р на лъвомъ берегу Монока. Что касается краснобураго конгломерата то онь состоить изъ известковой красноватой массы, въ которой включены плохо окатанные, ребристые кусочки красной яшмы, темностраго роговика и кварца. Одинаковую съ нимъ породу мит не разъ случалось встръчать во время путешествія на верхній Абаканъ и на правыхъ притокахъ Таштыпа; она тамъ сопровождаеть слои краснобураго песчанника. На лівомъ берегу Абакана, около устья Таштына я не быль, но изъ Монока видно, что онъ состоить изъ какихъ-то слоистыхъ, круго-приподнятыхъ слоевъ темнаго цвъта, но между ними выдаются бъловатые слои. Обогнувъ конгломератовый утесъ близь Абакана за р. Монокомъ, встръчаемъ снова низменную луговину и красные песчанники, но они выходять изъ другаго кряжа, независимаго отъ Монокскаго; осадочныя породы смёняются полево-шпатовыми, бурыми порфирами, а за высшей точкой на перевалъ изъ Монока въ Арбаты (аа, чертежъ с, табл. II) идутъ метаморфическия зеленокаменныя породы, богатыя примъсью жельза; послъдній кряжь около луговины р. Арбаты, на которой и построенъ Арбатскій форпость, мнѣ ближе осмотръть не удалось; но, по свидетельству Чихачева, онъ состоить изъ доломитовъ.

Таштынское мѣсторожденіе окаменѣлостей находится въ 3-хъ верстахъ отъ с. Таштынскаю и въ 1½ верстахъ отъ станицы Имекъ, на урочищѣ Курбиджекъ. Постараюсь собрать разсѣянныя въ моихъ замѣткахъ свѣдѣнія, относящіяся къ вопросу объ таштынско-имекскихъ окаменѣлостяхъ.

Лъвый берегъ Таштыпа представляеть, начиная отъ устья р. Курмугашь (табл. III), внизь по ръкъ до ущелья, въ которое онъ входитъ между горами Карагаемъ и Джиланъ-Карагаемъ, сплошной рядъ утесовъ, весьма круто спускающихся къ ръкъ; правыйже низкій, болотистый, покрытый кочками. Остатки старицъ на немъ показывають, что р. Таштыпъ странствовала на всемъ пространствъ между горою Бозе и возвышенностами лъваго берега. Еще ранъе здъсь было, въроятно, озеро, оканчивавшееся около Карагая и Джиланъ-Карагая. Шварцъ показалъ, что весь В. Таштыпъ состоитъ изъ такихъ сообщающихся между собою расширеній и съуженій его ръчной долины. Ръка до сихъ поръ подмываетъ свой лъвый берегъ и обнаруживаетъ напластованіе слъдующихъ породъ:

Горы по львому берегу Курмунаша состоять изъ желтосьраго песчанника, переходящаго въ ржаво-красный, крупно-зернистый и, наконець, краснобурый, который, въ свою очередь, подстилается зеленовато-сърыми песчанистыми глинами съ общимъ паденіемъ къ З. Склонъ, обращенный къ с. Таштынскому, крайне крутъ. У самаго подножія горъ обнаруживается цёлый рядъ пластовъ, представляющихъ перемежаемость: а) свътложелтаго известняка съ пятнами голубой глины, окрашенной вивіанитомъ, в) краснобурой глины, с) голубовато-сёрой. Затёмъ, вплоть до Кузьминской забоки, небольшаго полуцирка, вымытаго Таштыпомъ, идутъ однѣ красныя глины, съ ръдкими прослойсами съро-голубой. На Кузьминской забокъ встръчаемъ известнякъ съ вивіанитовой глиной, зеленовато-бурую глину, тонкослоистую, испещренную дендритами, полосы голубовато-сфрой глины и краснобурой и снова краснобурую глину вплоть до хребта Курбиджекъ. Последній тянется отъ р. Таштына къ С. и потомъ, понижаясь, загибаетъ къ З. Онъ состоить изъ пластовъ краснобурой и голубоватосфрой глины, но преобладающей породой является сёро-желтый известнякъ (простираніе С.-Ю., паденіе къ З. почти вертикальное, только на береговомъ утесъ, всяъдствие оползания, падение уменьшается до 50°). За хребтомъ снова рядъ красныхъ глинъ, переходящихъ по сосъдству съ Карагаемъ въ краснобурый известковый песчанникъ-Известнякъ Курбиджека сходенъ съ Бейскимъ и Монокскимъ,

но въ немъ болъе желъзистой охры и кристаллическаго известковаго шпата. Совершенно подобный известнявъ мы находимъ и въ горахъ по левому берегу верхняго теченія р. Имекъ (табл. ІІІ), леваго притока Таштыпа, но въ последнемъ не встречается окаменалостей. И въ Курбиджека окаменалости встрачаются только въ 2 хъ пластахъ, раздъленныхъ между собою слоями известняка, совершенно не содержащими органическихъ остатковъ. Здёсь преобладають преимущественно кораллы; стебельки и бокальчики энкринитовъ, проросшіе кристаллами известковаго шпата, встръчаются здёсь на каждомъ шагу. Что касается раковинъ, то онъ еще пока не определены, но въ одномъ экземпляръ можно подозръвать обломокъ ортоцератита, котораго не встрвчается ни въ Бейскихъ, ни въ Монокскихъ окаменълостихъ. Два чертежа таблицы IV нають понятіе о строенія Курбиджека. Изъ нихъ а изображаеть глубокую промоину на его западномъ склонь; д -съро-желтый известнякъ, легко дълящійся на пласты, в краснобурая глина и в 1свро-голубая. Эта промоина обнаруживаеть, что въ хребть мы имћемъ перемежаемость известняковъ съ красно бурыми и голубоватыми глинами. Чертежъ в представляетъ профиль обнаженія Курбиджека и Таштыпа, закрытый береговымъ сдвигомъ. Слои б, и в содержать окаменьлости, а в безь органических остатковь; β, β-краснобурая глина. Сравнивъ примърную карту окрестностей Таштына на таблиць III и чертежи таблицы IV, оказывается, что известнякъ съ окаменълостями представляетъ только незначительный эпизодъ въ целомъ ряде слоевъ цевтныхъ глинъ, которыя, въ согласномъ напластовании, примыкаютъ къ красно-бурому песчаннику. Прямо бросается въ глаза сходство сопровождающихъ известнякъ породъ въ Бев и Таштыпв: тв-же красныя глины, тъ-же зеленовато-сърыя глины и краснобурый песчанникъ. Въ Таштынь мы только сталкиваемся съ безпримърнымъ въ другихъ мъсторожденіяхъ развитіемъ цвытныхъ глинъ. Въ этомъ и заключается его отличіе отъ прочихъ, но отличіе количественное, а не качественное.

Четвертое осмотрѣнное мною мѣсторожденіе окаменѣлостей среди пластовъ серіи краснаго песчанника находится на правомъ

берегу Абакана, верстъ 15 ниже с. Аскизскаго. Берега Абакана по объ стороны ръки сопровождають горные хребты, сложенные изъ слоевъ серіи краснаго песчанника. На правомъ берегу, въ 15 верстахъ отъ Аскыза, красноцвътная порода неожиданно прерывается зеленовато-желтыми, а потомъ сфровато-бълыми пластами, выше нихъ крупно-зернистый бланжевый песчанникъ. Затъмъ. неглубокій оврагь, на съверномъ берегу котораго мы видимъ выходящіе по линіи простиранія пласты сфроголубой и краснобурой глины, прикрытие сверху пластами крупно-зернистаго бланжеваго песчанника и грязно-зеленоватой глины. Далбе, мы снова видимъ пласты красно-бураго песчанника. Простираніе пластовъ З.—В., паденіе къ С. около 30°. Чертежи а и b таблицы V представляють наглядно описанное; а-профиль горъ со стороны Абакана съ С. на Ю., b-съ З. на В., какъ представляется выходъ породъ изъ проръзывающаго горы оврага. Въловато-сърый слой ас содержитъ въ изобиліи окамен'влости, совершенно одинаковыя съ Бейскими. Слой в совершенно подобенъ зелено-желтому крупно-зернистому песчаннику близь Монока, налегающему на красный конгломерать. Бланжевый песчанникъ съ зеленоватой глиной в напоминаетъ собою моновские и бейские слои. Голубыя и красныя глины одинаковы съ Таштынскими. Это обнажение, уже безо всякихъ недоумѣній и оговорокъ, даетъ намъ право причислить слои коралловаго и раковиннаго известняка къ серіи пластовъ краснобураго песчанника.

Пятое мъсторождение известняковъ съ окаменълостями изъ видънныхъ мною находится между Уйбатомъ и Камыштой. Горы объдны обнаженими, и мнъ еще неудалось хорошенько осмотръть окружающихъ мъстностей. Я видълъ слои известняка проъздомъ ранней весной и могу только сказать, что пласты раковиннаго известняка подстилають здъсь краснобурый песчанникъ; простирание известняковъ Ю.-В.—С.-З., падение С.-В., около 34°. Ниже известняка нътъ обнажений коренныхъ породъ. За переваломъ-же водораздъла Уйбата и Камышты уже идутъ кристаллическия породы.

Кром'в описанныхъ м'встъ въ Минусинскомъ музев им'вются окамен'влости съ р. Утъ, одинаковия съ Бейскими. Гдв собствен-

но находится тамъ раковинный известнякъ,—въ точности неизвестно. Можетъ-быть, онъ находится въ связи съ пластомъ около Аскыза на Абаканъ, такъ какъ р. Утъ впадаетъ въ послъдній недалеко отъ мъсторожденій окаменълостей.

Въ коллекціи породъ съ Абаканской дачи, принадлежащей г. Пермикину, имъется экземпляръ Spirifer'а съ средней Кени; но и это мъсторожденіе никъмъ, не обслъдовано; это, въроятно, самое западное, такъ какъ далъе начинаютъ преобладать кристаллическія породы и метаморфическіе сланцы.

Въ Музей были доставлены нѣсколько экземпляровъ Spirifer (sp.?) и Rynchonella (sp.?) изъ восточной части округа изъ окрестностей д. Курагиной. Изъ писемъ И. А. Лопатина къ Н. М. Мартьянову 1) видно, что въ коллекціи породъ и минераловъ г. Титова, нынѣ пріобрѣтенной Сибирскимъ Университетомъ, имѣются окаменѣлости съ устья Камышты. Достовѣрно можно утверждать, что при болѣе подробномъ изслѣдованіи округа найдется еще много мѣсторожденій окаменѣлостей, подобныхъ Бейскимъ, такъ какъ красный песчанникъ составляетъ главную и единственную серію осадочныхъ геологическихъ образованій, развитыхъ въ средней части округа.

Итакъ, среди пластовъ краснобураго Минусинскаго песчанника мы встръчаемъ подчиненный ему известнякъ, заключающій окаменълости девонской формаціи. Сходство петрографическихъ спутниковъ пласта, содержащаго раковины въ 4-хъ или 5-ти описанныхъ мѣстахъ, даетъ и теперь уже возможность опредѣлить условій его залеганія. Кромъ Монока, нигдѣ не видно въ близкомъ сосъдствъ съ нимъ конгломератовъ; но и здѣсь известнякъ отдѣленъ мощными пластами съро-зеленаго песчанника отъ конгломерата. Постоянными спутниками окаменълостей являются пласты тонкой, зернистой, плотной глины. Таштыпское мѣсторожденіе исно показываетъ намъ связь корраловаго известняка съ глинами. Вообще можно принять, какъ правило, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ зерно песчанника становится тоньше и пріобрѣтаетъ болье интен-

¹⁾ Г. Мартьяновъ со своей обычной обязательностью позводиль мив пользоваться этими письмами и заключающимися въ нихъ указаніями.

сивный красный цвѣтъ, тамъ можно искать слой окаменѣлостей. Все это даетъ право заключить, что кораллы известняковъ отлагались среди глубокаго моря, и если въ одномъ мѣстѣ мы и находимъ въ сосѣдствѣ съ нимъ конгломератъ, то послѣ отложенія послѣдняго, вѣроятно, наступило значительное пониженіе почвы. Можетъ-быть, нѣкогда кораллы образовали среди него рядъ острововъ. На эту мысль наводитъ и тотъ фактъ, что окаменѣлости встрѣчаются въ сѣрожелтомъ известнякъ спорадически. Среди громадныхъ залежей его около Беи, мы находимъ очень мало слоевъ съ кораллами и раковинами. Известнякъ въ вершинахъ Имека, между Б. и М. Есью и по берегамъ Теи, ничѣмъ не отличается отъ Бейскаго и Курбиджекскаго, но окаменѣлостей я тамъ не находилъ, не смотря на тщательные ноиски.

Съ другой сторони, я уже упоминаль въ началѣ сообщенія, что близь Минусинска на Тагарскомъ островъ, на Майдашинскихъ горахъ и около дер. Кривой находимы были окаменелости гг. Мартыяновымъ, Лопатинымъ, Венцковскимъ, Черскимъ и мною, тождественныя съ Изихскими, отнесенными къ Ursa stufa. Одинаковость напластованій только-что перечисленныхъ мъстностей и сопровождающихъ раковинный известнякъ отрицать невозможно: между ними есть непрерывная связь. Все это заставляеть подозръвать принадлежность Изыхскихъ и Бейскихъ пластовъ къ одной и той-же формаціи. Догадку эту я могу подтвердить фактами. Возвращаясь степью по правому берегу Абакана изъ экскурсій близь Монока и Таштына, я, вийсто дороги, пробхаль прямо степью чрезъ Изыхъ, и мий удалось осмотрить ю.-з-ий его конецъ, составляющій высшую точку хребта. Въ отосланномъ мною спискъ породъ, собранныхъ въ 1883 г., есть перечень образчиковъ съ Изыха: но тогда я путешествовалъ зимой, и з. и ю. з. части Изыха остались мною неосмотренными. Глубокіе снега делали такую попытку невозможною. Последняя поездка прошлое лето показала мив, что вся ю.-з-я часть Изыха состоить изъ породъ серіи краснобураго песчанника, несодержащихъ никакихъ окаменълостей, но тождественныхъ съ сопровождающими коралловый известнякъ около Монока, на Абаканъ, въ Бев и на Камыштин-

ME THE Z JOHN ME DIVING

скомъ перевалъ. Изыхскій хребеть представляеть собою, на съверо-западномъ склонъ, перемежаемость различнаго цвъта песчанниковъ съ прослойками слоистаго матоваго угля (лигнита). Рядъ сходныхъ между собою пластовъ повторяется нёсколько разъ и всегда внизу каждой группы находится слой кварцеваго конгломерата. Подвигаясь вдоль по Изыху вверхъ по Абакану, мы подъ конгломератомъ находимъ слой твердаго зеленоватаго кварцита. Ниже него лежатъ мощния толщи краснобураго песчанника; за ними следуеть серозеленый, черноватый и серобурый песчанники. обильные чечевицеобразными включеніями и глинистыми сроствами. Этотъ песчанникъ тождественъ съ тъмъ, который встрвчается на берегу Енисея, противъ города и перевоза подъ Синимъ камнемъ. Ниже него лежатъ толщи сърозеленыхъ и красноватыхъ глинь, а дальнъйшія напластованія скрыты наносами и уровнемь р. Абакана. Сдвиговъ между пластами, кромъ небольшаго береговаго оползня строзеленой глины, незаметно. Изыхъ оголенъ со всёхъ сторонъ; кром'є обнаженій по обрыву вдоль Абакана, онъ пересъченъ перпендикулярными къ нему логами, такъ что не замътить сдвига, измъненія напластованія почти невозможно, и общія стратиграфическія отношенія крайне просты. Весь Изыхъ отъ ю.-з.-го конпа до послъднихъ обнаженій при переходъ съ горъ въ равнину имбетъ простираніе съ Ю.-В. на С.-З., при паденіи къ С.-В., которое, благодаря волнообразному изогнутію пластовъ мѣняется отъ 20° до 35°.

Ближайшій выходъ въ Изыху породъ серіи краснобураго песчанника мы встрѣчаемъ близь устья Абакана, въ горѣ Самохвалъ, гдѣ слои наклонены въ Ю.-З. Такимъ образомъ, между верхнимъ концомъ Изыха и устьемъ Абакана мы имѣемъ складку или, лучше, мульду, ширина которой около 30 верстъ. Верхніе слои ен заняты угленосными пластами яруса Ursa stufa, нижніе—красными песчанниками. На правомъ берегу Енисея, въ Майдашинскихъ горахъ, мы встрѣчаемъ великолѣпныя обнаженія краснаго песчанника, переслоивающіяся со слоями желтоватаго песчанника, содержащаго оттиски окаменѣлостей, подобныхъ Изыхскимъ. Есть, однако, различіе въ составѣ пластовъ, содержащихъ девонскія ока-

менвлости и отпечатки Ursa stufa. Красный песчанникъ составляеть главную массу пластовь въ обоихъ случаяхъ, по среди слоевъ Ursa stufa онъ крупнъе зерномъ; зеление пропластки его содержать глинистыя включенія и, сверхъ того, часто перемежаются съ довольно разнообразными конгломератами. Подстилкою угленосныхъ слоевъ на Изихъ служить кварцевий конгломерать. На островъ, противъ Минусинска, слои желтоватаго и зеленоватаго песчанника лежатъ на конгломератахъ. Среди Майдашинскихъ и Кривинскихъ горъ мы также встрячаемъ конгломераты. Подробный разборъ состава этихъ породъ завелъ-бы меня слишкомъ далеко и, взявшись за него, следовало-бы представить полное петрографическое описаніе серіи краснаго песчанника въ Минусинскомъ округъ, чего я въ настоящее время сдълать не въ состояни, такъ какъ многихъ мъстъ въ округъ и еще не видълъ; но самое присутствіе конгломератовъ указываеть на отложенія неглубокихъ водъ. Это-же подтверждается обиліемъ превосходно сохранившихся следовь водяныхъ струй на песчанникахъ. Следуеть привести также и отрицательное отличіе однихъ місторожденій оть пругихъ, --отсутствие слоистыхъ ярко окрашенныхъ глинъ, какъ на Майдашахъ, какъ наприм. на островъ противъ города и на Кривинскихъ горахъ. На Изыхъ самые нижніе пласты состоять изъ глинистыхъ отложеній; но ихъ цвать, строеніе и твердость совершенно другія, чемъ въ Таштыпе и на Абакане.

Въ соленосной котловинъ Ушь-коль, лежащей въ съверной части Качинской степи, мы встръчаемся съ громадными отложениями соленосныхъ глинъ, принадлежащихъ къ серіи краснаго песчанника, но трудно ръшить, къ какимъ горизонтамъ они относится. Найденные тамъ втеченіи нынъшняго льта инженеръ-технологомъ Венцковскимъ остатки рыбьихъ чешуй, можетъ быть, дадутъ возможность точнье опредълить его. Судя по обилію встръчающихся тамъ сърыхъ известняковъ и пропластковъ гипса и антидрида, можно, однако-же, считать Ушь-кюльскія напластованія ближе къ Монокскимъ и Таштыпскимъ, чьмъ къ Майдашинскимъ и Изыхскимъ. 30 верстъ отъ Таштыпа и верстахъ въ 17 отъ Монока на Абаканъ въ глинахъ залегаютъ мощные пласты гипса на

Абаканъ, противъ станицы Арбатской, на лъвомъ берегу Абакана. Чихачевъ упоминаетъ о гипсъ на правомъ берегу Абакана. Перебирая свою Таштыпскую коллекцію, я нашелъ на одномъ изъ кусковъ глины примазку изъ гипса, сличая куски желтовато-бурой и зеленовато-бурой глинъ изъ горъ по лъвому берегу Курлугаша съ Ушь-кульскими, я нашелъ въ нихъ большое сходство. Все это снова заставляетъ меня считать глинистыя отложенія среди красныхъ песчанниковъ за признакъ девонской формаціи, а отсутствіе ихъ—за указаніе на переходъ къ слоямъ *Ursa stufa*.


При распространенности краснаго песчанника въ округъ, онъ могъ-бы служить хорошей пробой возраста изверженныхъ породъ, но на этотъ счетъ сделано мало наблюденій. Я, по крайней мере, не знаю указаній на нихъ въ литературъ. Мнъ приходилось замъчать, что, по мъръ приближения къ горнымъ хребтамъ, красный песчанникъ смъняется метаморфическимъ известнякомъ; но до сихъ поръ мив удалось только въ одномъ месте наблюдать налеганіе песчанниковъ на мраморы. Это на р. Сырѣ около улуса Морозова, въ 1883 году. Тамъ гранитъ покрытъ метаморфическимъ известнякомъ, а на немъ наслоенъ красный песчанникъ; и видно. что известнякъ далеко древнее краснаго песчанника; это заметно изъ непосредственнаго налеганія последняго на первый, но следовъ слоеватости въ мраморовидномъ известнякѣ найти невозможно. Въ восточной части округа, по р. Терехтъ, были найдены въ метаморфическомъ известнякъ остатки какихъ-то трубчатыхъ организмовъ, но на счетъ нихъ ни одинъ нашъ палеонтологъ не высказалъ еще своего мивнія. the Althoropeating attitude to an al-

Изъ мѣстъ соприкосновенія краснаго песчанника съ кристаллическими породами я лично наблюдаль налеганіе песчанника на мелафирь въ горѣ Карагай около Таштыпа; но никакихъ слъдовъ нарушенія напластованія песчанника мелафиромъ я не замѣтилъ. Горный инженеръ Маюговъ изъ своего путешествія на р. Аду, лѣвый притокъ Абакана, сообщилъ мнѣ образцы тамошняго краснаго песчанника и гранита, пробившаго послѣдній. Гранитъ состоитъ изъ черной слюды, бѣло-розоваго и сѣраго кварца. Изъ этого можно заключить, что граниты Ады новѣе Таштыпскихъ мелафировъ; но лично мнѣ не удалось провѣрить показаніе г. Маюрова, а потому я и не беру на себя отвѣтственности за него, котя
мои наблюденія во время экспедиціи 1884 года, о которыхъ будеть говорено подробно въ моемъ отчетѣ, заставляютъ меня признать такой фактъ вѣроятнымъ. Заговоривши о мелафирахъ, напомню здѣсь наблюденіе Чихачева. Онъ положительно утверждаетъ,
что мелафиры около дер. Езагаша не оказали никакого метаморфизирующаго вліянія на красные песчанники. Мнѣ извѣстно, что
песчанникъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ восточной части округа
соприкасается съ порфирами, но личныхъ наблюденій сдѣлать не
удалось.

Этимъ я закончу свое сообщение о девонскихъ пластахъ Минусинскаго округа. Недостатокъ фактовъ заставляетъ меня отказаться отъ всякихъ попытокъ къ дальнъйшимъ обобщенимъ. Если замътка моя обратитъ внимание компетентныхъ судей на столь распространенную въ округъ серию пластовъ краснобураго песчанника и возбудитъ вопросъ о болъе детальномъ ея изучени, то цъль моя достигнута. Я еще далеко не исчерпалъ всъхъ вопросовъ, связанныхъ съ изучениемъ этихъ напластований; стоитъ только припомнить, наприм., что многия рудныя жилы залегаютъ или въ красномъ песчанникъ, или по сосъдству съ нимъ, жилы, которыя Гревинкъ по догадкъ отнесъ къ породамъ, подчиненнымъ діабазу,—чтобы догадаться, какое значеніе можетъ имъть болъе подробное изученіе дъла.

При обиліи прекрасныхъ обнаженій въ Минусинскомъ округѣ, нѣсколько небольшихъ экскурсій втеченіе одного лѣта, при нѣкоторомъ знакомствѣ съ мѣстностью, дали-бы всѣ нужные матеріалы для разработки вопроса.

Упоминаемие мною въ этомъ сообщении образцы породъ и окаменълостей и буду имъть честь представить въ распоряжение Западно-Сибирскаго Отдъла Императорскаго Географическаго Общества вмъстъ съ другими коллекціями.



СПИСОКЪ РАСТЕНІЙ,

СОБРАННЫХЪ

ЧЛЕНАМИ ЭКСПЕДИЦІИ ВЪ ДОЛИНУ ВЕРХНЯГО АБАКАНА,

СЪ МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ 1884 ГОДА,


А. И. ВЕНЦКОВСКИМЪ и Д. А. КЛЕМЕНЦЪ

и

ОПРЕДЪЛЕННЫХЪ Г. П. АНДРЕЕВЫМЪ ВЪ МИНУСИНСКЪ,

НА ОСНОВАНІИ СОЧИНЕНІЙ ЛЕДЕВУРА И ГЕРВАРІЯ МИНУСИНСКАГО МУЗЕЯ, СОСТАВЛЕННАГО Н. М. МАРТЬЯНОВЫМЪ.

1885 годъ.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ЗАМВЧАНІЯ.

Прилагаемый списокъ растеній-результатъ собиранія растеній во время экскурсіи въ область верхняго теченія Абакана, продолжавшейся съ мая по сентябрь 1884 года. Въ намерени дать современемъ, въ подробномъ стчетъ болье частную характеристику пройденнаго пути, считаю нужнымъ сдёлать о немъ несколько бъглыхъ замъчаній ввидъ предисловія къ списку. Мъстность отъ Минусинска до Таштыпа, пройденная нами безостановочно, представляетъ собою безлъсную степь. Когда-то несомивнио существовавшіе здісь ліса уже совершенно истреблены. Это область растительности степей и степныхъ утесовъ, следуя терминологи, принятой въ ботаническихъ очеркахъ г. Мартьянова, въ его сочиненій "Матеріали для флоры Минусинскаго края". Въ этомъ раіонь не делалось нами систематических ботанических экскурсій. Небольшое число растеній, собранныхъ въ предвлахъ степей, служить только дополнениемъ къ собранному нами въ тайгъ и подтаежныхъ мъстахъ.

Берега Таштына, преимущественно лѣвый его берегъ, являются послѣднимъ пунктомъ на западѣ округа, куда проникаетъ степнан флора; но здѣсь уже являются представители подтаежной и таежныхъ флоръ. Даже между двумя берегами Таштына, правымъ и лѣвымъ, замѣтна разница. Сухія, кое-гдѣ поросшія рѣдкимъ соснякомъ и березникомъ, вершины Караган и Курбиджека съ прилегающими къ нимъ высотами вдоль береговъ Имека цѣликомъ принадлежатъ степной флорѣ. Низменность праваго берега и осо-

бенно прилегающіе въ ней горные массивы Бозе и Джиланъ Карагая характеризуются растеніями переходной полосы, такъ называемой подтаежной. Здѣсь впервые появляется столь обыкновенная въ тайгъ Geranium albiflorum. Поясъ этой растительности тянется вплоть до Матура. Истребленіе льсовь, отсутствіе высокихъ горныхъ хребтовь и преобладаніе сосновыхъ, чистыхъ рощъ безъ зарослей, а также сухость почвы и тождество геологическихъ образованій (серія краснобураго песчанника) облегчили здѣсь акклиматизацію растеній чуждой степной полосы. Слѣдуетъ замѣтить, что уже на горахъ въ окрестностяхъ Таштыпа являются представители растительности высокихъ хребтовъ—таковъ наприм. Рарачег alpinum, ростушій на вершинѣ Бозе.

За Матуромъ уже начинается область настоящей таежной растительности. На востокъ она доходитъ, въроятно, до устья Монока, внадающаго въ Абаканъ съ правой стороны, захватывая собою долину Абакана, оба склона хребта Кырсэ и вершины ръчекъ Большой Сеи и Малой съ ихъ притоками, Кызылбаша, Бутракта и Джилана. Говорю—въроятно, такъ какъ этотъ раіонъ мнъ пришлось въ лътнее время осмотръть только въ одномъ мъстъ, по теченію ръчки Бутракты въ 1883 году, въ августъ мъслиъ, во время перевзда изъ Таштына на Абаканскій заводъ, въ качествъ члена экспедиціи г. Адріанова. Въ гербарів этой экспедиціи имъются матеріалы для сужденія о флоръ окрестностей Абаканскаго завода, дача котораго и представляеть восточный конецъ таежной полосы по теченію Абакана.

Въ тайгъ верхняго Абакана преобладаютъ изъ древесныхъ породъ—ель, пихта и кедръ. Иногда на болотистыхъ мъстахъ тайга переходитъ въ настоящую чернь. Только въ одномъ мъстъ, между устьемъ первой Сойотки и Слюдянкой, попадается лиственничный лъсъ, на такъ назыв. листвяговой тонъ минусинскихъ рыбаковъ. Снова лиственница встръчается только уже у сліянія

двухъ истоковъ Абакана, на сухой песчанисто-иловатой почев.

Относительно вертикального распределения растительности ограничусь пока одними общими замъчаніями, такъ какъ я не имълъ еще возможности свести къ одному знаменателю результаты своихъ многократныхъ восхожденій на высокіе гольцы. Чередованіе различныхъ видовъ растеній въ вертикальномъ распространеніи сильно изміняется и сколько-нибудь строгихъ разграниченій сдівлать невозможно для отдельных видовъ. Вообще-же и здесь повторяется уже давно подміченное явленіе въ Алтайскихъ горахъ, которое, послѣ Потанина и Пржевальскаго, слѣдуетъ распространить и на большую часть Монголіи, на склонахь, обращенных в къ ющ, древесная растительность ръдко подымается выше склоновъ горных долинь, или, какт говорить Гельмерсень, стоя на высокой точкъ, къ югу отъ себя вы видите травяные, безлъсные склоны горъ, въ съверу сплошные лъса. (Reise n. Teletzkischen See). Предъломъ распространенія сплошной лісной растительности на висовихъ горныхъ хребтахъ, каковы Джозекъ, Горбу, отроги Кансына въ вершинахъ Малаго Кызаса 1), по берегамъ Малаго Абакана можно считать высоту, соответствующую давленію барометра въ 635 mm. Выше этого предъла лъса попадаются ввидъ спорадически - разсвянныхъ группъ. Кедръ еще гораздо ниже изъ высокорослаго стройнаго дерева съ прямыми короткими вътвями превращается въ коренастое, раскидистое, съ неправильнымъ, толстымъ стволомъ и далеко раскинутыми могучими вътвями, искривленными и загнутыми по самымъ неожиданнымъ направленіямътаскыльный кедръ промышленниковъ, любимое мъсто охотничьихъ стоянокъ. Шишки редко вызревають на этихъ кедрахъ. Часто ихъ не бываетъ совсвиъ.

¹⁾ На картъ Мейена послъдній носить названіе *Чукчуть*, но мнъ это названіе совершенно неизвъстно. Не могь даже узнать, изъ какихъ источниковъ взято оно.

Д. К.

Далѣе начинается поясъ луговой (Aquilegia glandulosa, Polygonum bestortu и др.), съ зарослями Salix lapponum, Bethulae nanae et fruticosae. На покатостяхъ и равнинахъ этого пояса любимое лѣтнее пастбище сѣверныхъ оленей.

Выше этого пояса трудно наблюдать вертикальное чередование растительныхъ поясовъ вследствіе недостаточной высоты горъ. Здёсь обыкновенно начинаются уже крутые, обрывистые утесы, недостатокъ мъста, скудость почвы; рядомъ съ вліяніемъ высоты надъ уровнемъ моря начинаютъ играть крупную роль индивидуальныя условія каждой высокой точки. Вліяніе поднятія можно опредълить, конечно, только caeteris paribus, мив-же, въ теченіи моихъ двухльтнихъ экскурсій по округу, пришлось сдылать болье 10 восхожденій на высовіе гольцы и между ними я не нашель и двухъ вершинъ, достаточно сходныхъ по условіямъ орографическимъ, геологическимъ и по отношенію къ направленію линіи господствующихъ вътровъ. Г-нъ Мартьяновъ, подробно изучавшій вертикальное распредёленіе растеній въ своихъ многократныхъ экскурсіяхъ на Саянскій голецъ Ворусь, обизательно сообщаль мив свои наблюденія и изъ нихъ я снова уб'вдился, что у насъ еще слишкомъ мало изучены эти пояса растительности для того, чтобы можно было дать ихъ характеристику.

Всюду, гдѣ я употребляю въ спискѣ выраженіе—выше предѣла древесной растительности, слѣдуетъ разумѣть не область горнихъ луговъ, въ которой деревья и приземистый кедровый сланецъ и Iuniperus папа встрѣчаются довольно часто, но непосредственно лежащій надъ нею поясъ, обыкновенно послѣдній, такъ какъ здѣсь голая осыпь, отсутствіе почвы насильственно прекращаютъ дальнѣйшее развитіе растительности. Здѣсь прозябаютъ только лишайники.

Послѣ этихъ предварительныхъ объясненій и позволю себѣ обратить вниманіе читателя на нѣкоторыя изъ растеній нашего гер-

барія. Хотя он'й вс'й им'й отся въ гербаріи Минусинскаго музея, но въ единственное сочиненіе о флор'й Минусискаго округа, составленное г. Мартьяновымъ они или не вошли, или были находимы очень р'й дко 1), и потому наличность данныхъ растеній въ долин'й верхняго Енисея, его притоковъ и восточнаго Алтая, нашимъ спискомъ констатируется въ первый разъ:

Draba Wallenbergii Hart.

incanna

Gypsophilla petrea—очень рѣдко въ Минусинскомъ округѣ. До нашей экспедиціи оно было констатировано только по теченію средней Кени, около западной границы округа.

Lychuis Flos cuculi. Въ Восточномъ Алтав найдено было до сихъ поръ только на большомъ Кызасъ, пр. притокъ Абакана, близъ пріисковъ Кузнецовыхъ. Cerastium davuricum. Нірегісит elegans.

Geranium pseudosibiricum. Oxitropis intermedia.

Astragalus multicaulis-

alopecuroides.

Hedisarum neglectum.

Epilobium montanum.

Sedum elongatum.

Saxifraga punctata.

Aegopodium alpestre.

Schultzia crinita.

Bupleurum exaltatum.

Erigeron armerifolius.

Senecio sp? (№ 172 repбар.).

Rhododendron chrysanthum—нами дана западная граница распространенія.

Ziziphora clinopoilivides.

Dracocephalum peregrinum.

nutans.

Scutellaria alpina.

Rumex sp. (№ 265).

Polygonum sibiricum.

Euphorbia altaiça.

Scheuzeria palustris—найдено было въ Сибири только Гмелиномъ и стоитъ со знакомъ вопроса у

Ледебура.

Orchis militans.

Shoydia seratlina.

Carex ericetorum.

¹⁾ Равнымъ образомъ ихъ нётъ и у Чихачева въ Voyag. scient. d. l'Altai

Glyceria sp. 11. Stipa sibirica. Melica nutans1).

Poa altaica. Calamogrostis Halleriana.

Въ заключение считаю своею обязанностию выразить мою благодарность Григорію Петровичу Андреєву за опреділеніе растеній гербарія экспедиціи и Николаю Михаиловичу Мартьянову за просмотръ этого списка и указанія на болёе замечательныя растенія, а также за то горячее участіе, какое принималъ въ судьбахъ нашей экспедиціи и постоянную помощь въ работѣ по изученію матеріала, собраннаго мною и г. Венцковскимъ.

Дмитрій Клеменцъ.

Минусинскъ. 3-е марта.

¹⁾ Встрвчается очень рідко въ восточной части округа.

1) Atragene alpina. L. (Сарга). Черневые татары. Вьющееся растеніе. Всюду по лиственнымъ зарослямъ. Сухіе, прошлогодніе стебли татары употребляютъ на прошивку берестяныхъ издѣлій. Чтобы въ тайгѣ сарга не цѣплялась и не мѣшала ходить, нужно набрать ее цѣлый пукъ и передъ отправленіемъ въ путь сжечь. (Черневые татары).

2) Thalictrum petaloideum. L. По высокимъ холмамъ по ръкъ Имеку, притоку Таштыпа слъва, на открытыхъ мъстахъ. Почва глинистая, подпочва известнякъ и глина. Цвътетъ въ маъ.

- 3) collinum. Wall. Окрестности Таштына, сѣверскалонъ горы Бозе. Почва черноземъ, подпочва осынь кварцеваго порфира. Цвѣтетъ въ маѣ.
 - 4) sp.? Болотистый логъ по Матуру. Май и іюнь.
- 5) minus. L. Окрестности Имека, подножін горы Карагай, на лъвомъ берегу Таштыпа. Почва черноземъ съ глиной, полночва известнякъ.
- 6) Anemone altaica. Fisch. Хребетъ въ вершинѣ Иксука, водораздѣлъ Абакана и Мрассы. Выше предѣла сплошной лѣсной растительности. Почва—листвяной перегной, подпочва—кристаллическій сланецъ.
- 7) narcissiflora. L. Хребетъ Джозенъ. Выше предвловъ древесной растительности, на осыпи краснаго песчанника. Единственный случай, когда это растеніе было найдено въ предвлахъ настоящей растительности высокихъ горъ во время моихъ экскурсій. Здёсь оно низкоросло. Обыкновенно въ лёсахъ, на сухихъ мёстахъ. Іюнь и іюль.
- 8) silvestris. L. На склонахъ логовъ по Имеку. Очень обыкновенно. Май и йонь.
- 9) Adonis apennina. L. На холмахъ по берегамъ Имека. Любитъ тънь. Почва черноземъ, подпочва известнякъ и глина. Май.
- 10) Ranunculus acris. L. Повсюду на умеренно-влажных лугахъ въ степи и тайгъ. Май, іюнь.

- 11) Ranunculus repens. L. На отмеляхъ Абакана, на мелвой галькъ и ръчномъ гравіъ.
- 12) *Cymbalaria*. Lw. На болотинъ по ръчкъ Имеку.
- 13) sp.? Въ логахъ по берегамъ р. Таштыпъ. Подпочва глина.
- 14) Calianthemum rutaefolium. Меуег. Хребетъ Джозенъ. Выше границы лъсной растительности. По осыпи краснаго песчанника. Іюль.
- 15) Caltha palustris. L. Около воды. На высокихъ годыцахъ, около растанвшихъ изъ снъта лужъ. Цвътетъ въ іюль и августъ.
- 16) Isopyrum fumarioides. L. Юго-восточный склонъ холмовъ Курбиджека (между Таштыномъ и Имекомъ). На осыпахъ известняка и красной глины.
- 17) grandiflorum. Fisch. Хребетъ Джозенъ. Выше предъловъ древесной растительности вообще. Но осыпи краснаго песчанника.
- 18) Aquilegia glandulosa. Fisch. Въ началѣ іюня и позднѣе, смотря по высотѣ мъста. Обыкновенно въ горныхъ мъстностяхъ близь предъловъ сплошной лѣсной растительности. Иногда-же тамъ, гдѣ вмѣсто лѣсовъ начинаютъ попадаться отдѣльные кедры, а по ручьямъ появляется Bethula папа или fruticosa и приземистая ива. Aquilegia особенно роскошно развивается на открытыхъ подальнійскихъ лугахъ. Здѣсь она растетъ совмѣстно съ Polygonum bestorta и Trollius asiaticus.
- 19) Delphinium grandiflorum. L. Долина Абакана, на побережныхъ лугахъ близь зарослей ивняка и тополя. Августъ.
- 20) elatum. L. Самое высокорослое изъ травиныхъ таежныхъ растеній. Виділь экземпляры выше 12 футовъ. Въ конців іюля на гольцахъ восточныхъ отроговъ хребта Горбу, выше линіи лісовъ Delphinium только еще набираль цвіть. Рость быль не выше 3½ футовъ. Растеніе образовало вмістів съ Асопі-thum licoctonum сплошную кайму вдоль береговъ горнаго ручьи. Распространено повсюду на таежныхъ лугахъ.
 - 21) Aconithum licoctonum. L. Совивство съ предъидущимъ

образуеть сплошныя заросли по влажнымъ таежнымъ лугамъ, но ръдко бываетъ выше 8 футовъ. На высокихъ мъстахъ цвъты блъднъе окрашены и иногда переходятъ въ бълый цвътъ.

- 22) Aconithum barbatum. Patr. Долина Абакана на займищъ около Аскыза. Августъ.
- 23) volubile? Нижнее теченіе большого Кызаса. Почва черноземъ, подпочва глинистый сланецъ. Августъ.
- 24) Cimicifuga foetida. L. На лугахъ по Матуру въ тъни кустарниковъ. Почва илистопесчаная. Іюнь.
- 25) Papaver alpinum. L. Вершина горы Возе, окрестности Таштына. На тощей почвъ среди осыней кварцоваго порфира. Май.
- 26) Chelidonium majus. L. Среднее теченіе Иксука, лѣваго притока Абакана, отроги водораздѣла Абакана и Мрассы. Почва черноземъ, подпочва красная глина. Іюль.
 - 27) Coridalis bracteata. Pers. Ibidem.
- 28) Arabis pendula L. Матуръ около нижняго улуса на мочажинъ.
- 29) incarnata. Pall. Открытые склоны горы Курбиджекъ между Таштыномъ и Имекомъ. Западные склоны горы по известковой осыпи. Май.
- 30) Cardamine macrophilla. Willd. На лугахъ по Таштыпу. Черноземная почва. Май.
 - 31) Allissum altaicum.) Меу. На сухихъ почвахъ по степ-
 - 32) alpestre. L.) нымъ утесамъ.
- 33) Draba repens. М. Bill. Джозекъ, выше предъловъ древесной растительности. Іюль.
- 34) *петогоза*. L. На открытыхъ мѣстахъ по Имеку и Курбиджеку. Май
- 35) Wallenbergii. Hart. Вершина Джозека, за предълами древесной растительности. На осыни краснаго песчанника. Іюль.
 - 36) incanna. L. Ibibem.
- 37) Thlaspi arvense. Mill. Матуръ Между кустами близь улуса.
 - 38) Hesperis matronalis. L. Логъ вдоль рычки Имект. Май.
 - 39) Sisimbrium. L. На дугахъ по Таштыпу.

40) Capsella Bursae pastoris. Mörsch. Матуръ, на лугахъ близь улуса:

41) Viola biflora. L. Въ вершинъ ръчки Мойнаксукъ, на предгоріяхъ горы Кубчичекъ (не смішивать съ Курбиджекомъ около Таштыпа), въ вершинъ Сом-Мрассы. Среди кедроваго лъса, на моховикахъ.

- 42) altaica. Pall. Хребетъ Джозекъ, среди ръдъющаго кедровника. Образуеть сплошной коверь. На моховикахъ. Іюль.
- 43) Parnassia palustris. L. На лугахъ въ вершинахъ Иксука. Іюль. Почва черноземъ.
- 44) Poligala sibirica. L. Var. tenuifolia. Оврагъ около горы Карагая, около Имека. Черный суглинокт. Іюль.
 - comosa. Schtt. Cyxie луга по Имеку. Іюль.
 - 46) Dianthus superbus. L. Сънокосные дуга по Матуру. Іюнь,
 - Sequieri. Vill. Въ логахъ по Карагаю.
- 48) Gypsophila altissima. L. На галькахъ по верхнему Тердешу, притокъ Абакана. Іюль.
- 49) sp. Овраги по Карагаю, около Таштына.
- ____ реtrea. L. По Абакану, выше втораго Казырсука; подпочва глинистый сланецъ. Іюль.
- 51) Silene repens. Patr. На лугахъ по Камзасу. Почва черноземъ, подпочва гранитъ. Іюнь.
- nutans. L. Матуръ. Ниже улусовъ. Подпочва желъзистая глина. Іюнь.
 - 53) Lychnisalba. Mill. Ibidem.
- Flos cuculi. L. На лугахъ по малому Кы-54) засу.
- 55) Mochringia lateriflora. Fenz. Въ ямахъ, около гніющихъ колодъ по Кызасу. (Кромъ этого мъста нигдъ не встръчалась во время путешествія).
 - 56) Stellaria nemorum. L. Въ долинъ Таштына.
- 57) media. Will. Сорная трава около юртъ на Матурскомъ улусъ. Іюнь.
- 58) graminea. L. Выше Казырсука по Абакану на гранитномъ утесъ, окруженномъ болотиной. Іюль.

- 59) Cerastium pilosum. Led Абаканъ. На наносной почвъ. Іюль.
- 60) davuricum. Fisch. Повсюду на лугахъ въ долинъ верхняго Абакана.
 - 61) Linum perenne. L. На склонахъ Карагая. Іюнь и Іюль.
 - 62) Hipericum elegans. Steph. На лугахъ по Имеку.
 - 63) Geranium sibiricum. L. Ibid.
- 64) albiflorum. Led. Въ логу по горъ Бозе. Одно изъ распространеннъйшихъ таежныхъ растеній. Растетъ соціально и изъ области тайги по горамъ поднимается далеко за предълы льсовъ. Май—Іюль.
- 65) pratense. L. Матуръ. Луга ниже улуса. Очень часто окаймляютъ края и колеи дорогъ на сухихъ, подтаежныхъ мъстахъ.
- 66) pseudo-sibiricum, scu laetum. С. t. Meyer. Въ березникъ по склонамъ Курбиджека. Почва черноземъ, подпочва известнякъ.
- 67) Oxalis Acetosella. L. Хребеть Джозонь; въ поясъ мъстныхъ луговь и прогалинъ. Іюль.
- 68) Thermopsis lanceolata. R. Br. Гора Изыхъ надъ Абаканомъ. Степная мъстность. Іюль. Августъ.
- 69) Medicago falcata. L. Матурскій улусь. Сухой логь, почва черноземь, подпочва известнякь.
- 70) Trigonella platycarpus. L Хребетъ въ вершинъ Иксука, кругой юговосточный склонъ, безлъсный. Почва черноземъ, подночва осыпь кристаллическаго сланиа. Іюль.
- 71) Melilotus alba. Lam. Правый серегъ Абакана, на лугу противъ Аскыза. Августъ.
- 72) Trifolium lupinaster. L. Хребетъ въ вершинъ Иксука, совмъстно съ № 70.
- 73) repens. L. Встръчается какъ въ степи около ръкъ, такъ и въ тайгъ. Іюнь, Іюль.
- 74) Glycyrrhiza glandulifera. L. Между Имекомъ и горою Карагай. Май:
- 75) Caragana arborescens. Lam. На утесахъ Карчая, среди мелафировой осыпи. Май, Іюнь.

- 76) Caragana frutescens. DC. По Имеку на утесахъ красной глины. Май, Іюнь, Іюль.
- 77) *рудтеа*. DC. Утесы по Карагаю, совывстно съ 75.
 - 78) Oxytropis pilosa. DC. Ibid., на западныхъ склонахъ горы.
- 79) argentata. Pers. Ibid., въ березникъ. Іюль, Августъ.
- 80) *intermedia*. Вд. Гора Курбиджекъ. На глинъ. Соціально. Августъ.
- 81) Astragalus hypoglotis. L. На утесахъ Карагая, обращенныхъ къ Таштыну.
 - 82) multicaulis? Led. Ibid.
 - 83) meliloloides. Pall. Ibid. Man.
 - 84) alopecuroides. Wet Kt. Ibid. Man.
- 85) Hedysarum setigerum. Turtsch. Ibid. На высокихъ точкахъ. Подпочва известнякъ. Августъ.
 - 86) neglectum. Led. Ibidem.—Abryctb.
 - 87) Onobrychis sativa. Ibid.—Man.
 - 88) Vicia cracca. L. Ayra no Marypy. Inhb.
 - 89) megalotropis. Led. Ibid.—Іюнь, Іюль.
 - 90) sp? Луга по Имеку. Августъ.
 - 91) sp?? Въ логахъ по Курбиджеку. Августъ.
- 92) Lathyrus altaicus. Led. Ibid. Среди густой трави, на черноземь. Май.
 - 93) tuberosus. Ibid 94) — pratensis. Ibid. Mañ.
- 95) *pisiformis*. L. На горъ Возе, на съверномъ склонъ. Распространенъ всюду на высокихъ лугахъ по тайгъ. Май и Іюнь.
 - 96) Orobus luteus. L. Ibid. Май, Іюнь.
- 97) *lathyroides*. L. Матурскіе луга противъ нижняго улуса. Іюнь.
- 98) Spiraca hypericifolia L. Луга по Куньсуку. Почва черноземъ. Іюнь, Іюль.
 - 99) chamaedrifolia. L. Луга по Таштыпу. Май.

- 100) Spiraca Ulmaria. L. Бълоголовникъ (казаки, крестьяне). Всюду по таежнымъ лугамъ. Май—Августъ. Листья и побъги употребляются какъ чай.
- 101) Dryas octopetala. L. Хребетъ Джозонъ. Около границы лъсовъ. Іюль.
- 102) Geum strictum. Act. Таштыпъ. Май. Въ тайгъ не встръчался.
- 103) rivale. L. Джозонъ. На берегахъ ручьевъ въ области лъсовъ. Обыкновененъ на берегахъ ръкъ. Іюль.
 - 104) Alchemilla vulgaris. L. Повсюду на степныхъ лугахъ.
- 105) Agrimonia pilosa. Led. Около Матурскаго улуса на межахъ и пашняхъ. Іюнь.
- 106) Chamaerhodu serecta. Bg. Долина Абакана, противъ Аскызскаго перевоза. Августъ.
 - 107) Potentilla. Bg. Лога Каргая. Августъ.
- 108) sericea seu dasyphylla. L. Съверозападный силонъ Курбиджека. По осыпи известняка съ глиной. Май.
- 109) bifurca. L. Между Имекомъ и Карагаемъ, на черныхъ суглинкахъ. Май-
- 110) anserina. L. На вершинъ Курбиджека, на сухой почвъ. Подпочва осыпь мелафира. Августъ. Обыкновенно на илистыхъ почвахъ.
- 111) desertorum. Bg. На лугахъ по Матуру около улуса. Подпочва глина. Май.
- 112) nivea. L. Джозонъ. На утесахъ выше предъловъ лъсной растительности. Іюль.
- 113) *fruticosa*. На горъ въ вершинъ Тереньгола, восточный склонъ хребта Горбу. Августъ.
- 114) Fragaria collina. L. Повсюду около опущекъ лесовъ въ подстепныхъ местахъ. Май.
 - 115) Rubus saxatilis. L. По Курбиджеку, въ березникъ. Май.
- 116) arcticus. L. Правый берегъ Абакана, у устья втораго Казырсука, по болотин'в среди моховиковъ. Іюль.
- 117) Rosa cinnamomea. L. По сухимъ логамъ на Курбиджекъ. Соціально. Май.

- 118) Crataegus sanguinea. L. Долина Таштына, на осыни краснаго песчанника. Май.
- 119) Cotoneaster vulgaris. Lindl. Подъ Курбиджекомъ, на известниковой осыни. Май.
- 120) Epilobium angustifolium. L. По Камзасу, изръдка по Казасу (Мрасской ръчкъ). На горахъ. Іюль.
- 121) *montanum*. L. Вершина Иксука. Безл'всный склонъ хребта.
- 122) *alpinum*. І. На галькѣ по верхнему Тердету близь устья. Іюль.
- 123) Hyppuris vulgaris. L. Лужайка на Абаканской степи. Августь.
- 124) Umbilicus spinosa. DC. На западныхъ склонахъ Карагая, по осыпи мелафира. Май.
- 125) Sedum quadrifidum. Pall. Джозонъ. Выше предъловъ древесной растительности, на утесахъ краснаго песчанника.
- 126) elongatum. Ledb. Ibid. Выше предъловъ сплошной льсной растительности.
- 127) *hybridum*. L. На западныхъ склонахъ Кара-
- 128) Saxifraga sibirica. L. Въ оврагѣ, на западной сторонѣ Курбиджека. Май.
- 129) *Crassifolia*. L. Повсюду на горныхъ уте-
- 130) *punctata*. Ledb. Вершина Иксука и Мойнаксука. На осыпяхъ и по каменистымъ берегамъ ручьевъ. Іюль.
- 131) Chrysosplenium alternifolium. L. На хребть Джозонь, на границь льсной растительности, на склонахъ горной долины.
- 132) Aegopodium alpestre. На островахъ Абакана противъ устън Тердета. Іюнь.
- 133) Carum carvi. L. Матуръ. Очень распространенъ на лугахъ. Май, Іюнь.
- 134) Schultzia crinita. L. На хребть около нижнематурскаго улуса; подпочва известнякъ. Іюнь.
 - 135) Bupleurum aureum. Fisch. Повсюду на солнечной сто-

рои в горних в таежных хребтовъ. Соціально. Достигаеть 2-хъ футовъ. Іюнь, Іюль.

- 136) Bupleurum multinerve. DC. Окрестности деревни Имекъ. Май, Іюнь.
 - 137) exaltatum Ma. Bieb.—Ibid.
- 138) Angelica silvestris. L. На пашняхъ около Матурскаго улуса. Считается признакомъ плодородной почвы (Русскіе крестьяне на Матурь).
- 139) Archangelica decurrens. Ledb. Матуръ, Луга противъ
- 140) Heracleum sibiricum. L. Повсюду на таежныхъ лугахъ, достигаетъ /7 и 8 ф. Соціально. Іюнь, Іюль.
- 141) Pleurospermum austriacum, Hoff. Матуръ, на пашнъ. Обыкновенно на таежныхъ лугахъ.
- 142) Aulacospermum anomale. Ledb. По Казылсуку среди осиноваго лъса.
- 143) Cornus alba, L. По Таштыну, подъ утесами красной глани.
- 144) Adoxa moschatellina. L. Джозонъ. Въ кедровомъ лису на камизхъ. (Кварцевый конгломератъ). Іюль.
 - 145) Viburnum opulus. L. По Таштыну.
- 146) Lonicera coerulea. L. Вължсахъ по верхнему теченію Иксука и вообще на низкихъ склонахъ горъ по теченію верхняго Абакана. Іюль, Августъ
- 147) tatarica. L. По Имеку и Таштыпу, на низкихъ мъстахъ около воды.
- 148) Linnea borealis. L. На стволахъ гніющихъ деревьевъ вт. тайгъ. Іюнь, Іюль,
- 149) Galium uliginosum. L. Верхнее теченіе Абакана, около нижнихъ тишей. Іюнь, Іюль.
- 150) boreale. L. На возвышенныхъ мъстахъ около Таштыпа.
 - 151) vernum. Scopl. Ibid., въ тъни между кустами.
- 152) Patrinia sibirica. Juss. Гора Курбиджекъ около Имека. Іюль.

- 153) Valeriana capitata. Матурскіе луга. Іюнь, Іюль.
- 154) *officinalis*. L. Имекскіе дуга. Очень распространенное растеніе.
 - 155) dubia. Bg. Ручей въ вершинъ Иксука. Іюль.
 - 156) Scabiosa ochroleuca. L. Склопы Карагая. Май, Іюнь.
- 157) Aster alpinus. L. На гранитныхъ утесахъ по Абакану, выше втораго Казырсука.
- 158) Calimeris altaica. Niess. Высокія м'єста между Карагаемъ и Имекомъ. Май.
- 159) Erigeron elonsatus. Ledb. На островахъ Абакана въ верхнемъ теченіи его. На песчанистой почві. Іюль.
 - 160) *sp?* Матурскіе луга ниже улуса. Май.
- 161) *Inula salicina*. L. Долина Абакана близь перевоза подъ Аскызомъ. Августъ.
 - 162) sibirica. L. Въ оврагахъ около Имека. Май.
- 163) Pharmica impatiens. DC. Правый берегь Абакана у устыя втораго Казырсука на моховикахъ. Іюль.
- 164) Achillea millefolilium. L. Повсюду по степямъ на сухихъ почвахъ. Май-Іюль.
- 165) Artemisia frigida. Willd. Абаканскія степи. Май— Іюль.
- 166) Antennaria dioica. L. Таскылы Слюдянки и верхняго Абакана.
- 167) Ligularia sibirica. Cass. Таежные дуга по верхнему Абакану. Іюнь, Іюль.
- 168) altaica. DC. Въ логахъ по Карагаю. Почва черноземъ съ глиной, подпочва известнякъ. Май—Іюль.
- 169) Cacalia hastata. Lam. Матуръ. Около рѣки въ тѣни. Въ тайгъ растетъ только на сухихъ лѣсныхъ опушкахъ. Іюль, Августъ.
- 170) Aronicum altaicum. DC. Джозонъ. Среди ръдкаго кедровника. Іюнь, Іюль.
- 171) Senecio campestris. DC. Между Имекомъ и Карагаемъ на сухихъ почвахъ. Май, Іюнь.
 - 172) sp? Хребеть въ вершинь Иксука. Крутой, без-

лъсный склонъ. Подпочва осыпь кристаллическихъ породъ. Іюнь.

- 173) Senecio crucaefolius. L. Правый берегъ Абакана у Аскызской переправы. На лугахъ Августъ.
- 174) sarracenicus. L. По Камзасу на несчанистыхъ отмеляхъ и въ нижнихъ тишахъ по р. Абакану около воды. Іюль.
- 175) Saussurea latifolia. Led. Гориме дуга въ вершинъ Тереньгола, восточные отроги хребта Горбу.
- 176) Carduus nutans. L. Луга около Матура, около болота. Іюнь.
 - 177) *crispus.* L. Устье верхняго Тердеша, на галькъ.
 - 178) Cirsium serratuloides. L. Луга по Матуру. Іюнь.
 - 179) heterophilum. All. Ibidem.
- 180) Leuzea carthamoides. DC. На лугахъ по високимъ горамъ совивстно съ Aquilegia glandulosa.
- 181) Serratula coronata. L. Матуръ. Ниже улуса близь нересохиаго болота. Іюнь.
- 182) Tragopogon orientalis. L. Въ логахъ около Имека и на съновосныхъ лугахъ по Матуру.
- 183) Scorzonera radiata. Fisch. На южномъ склонъ горы Бозе на открытомъ мъстъ. Окрестности Таштыпа. Май.
- 184) Taraxacum officinale. Wig. Повсюду на лугахъ но степной полосъ округа. Май, Іюль.
 - 185) sp? Около деревни Имекъ. Май.
- 186) Crepis tectorum. L. Окрестности Таштыпа. На степныхъ дугахъ. Май—Іюль.
- 187) *sibirica* L. Хребеть въ вершинахъ Иксука. Подпочва осыпь кристаллическаго сланца. Іюль.
 - 188) lyrata. Fisch.—Ibidem.
- 189) Mulgedium tataricum. DC. Абаканъ у устыя Аскыза, луга, поросшіе тальникомъ и черемухой. Іюль, Августъ.
 - 190) Campanula sibirica. L. Въ оврагахъ по Карагаю. Май.
- 191) glomerata. L. Матуръ и повсюду по ручьямъ въ сухихъ подтаежныхъ мъстахъ. Май—Поль.
- 192) rotundifolia. Desrous. На склопахъ Кара-

- 193) Adenophora marsupifolia. Fisch. Абаканъ у устья Аскыза. Встръчается и въ тайгъ. Іюль, Августъ.
- 194) denticulata. Fisch. Въ вершинахъ Иксука, по отлогимъ и бездъснымъ склонамъ. Почва черноземъ, подпочва глинистый сланецъ. Іюль.
- 195). Vaccinium vitis idaca. L. Таштынь по цизкимъ влажнымъ лугамъ. Май, Іюнь
- 196) Oxijcoccus palustris. L. На торфяныхъ почвахъ въ вершинъ Иксука. Іюль.
- 197) Andromeda polifolia. L. Болото близь устья втораго Казырсука въ верхнемъ теченіи Абакана.
- 198) Rhododendron chrysantum. Pall. Кашкара (казаки и инородцы). На Джозонъ выше предъловъ древесной растительности образуетъ силошныя стлани по утесамъ краснаго песчанника. Самый западный пунктъ, гдъ найдено было это растеніе—берега Абакана противъ устья первой Сойотки на утесахъ слюдистаго гнейса. Чихачевъ встрътилъ ее на Саянскомъ хребтъ гораздо восточнъе—въ вершинахъ Аны. Мною констатировано ея присутствіе на Кызасъ и у устья Малаго Абакана въ 1883 г. Можетъ быть западная граница кашкары и образуетъ кривую, склоняющуюся отъ вершинъ Аны по Абакану къ истокамъ Мрассы и Лебедя.
- 199) davuricum. Въ вершинахъ Тереньгола въ полсъ лъсной растительности, на гнейсовыхъ утесахъ. Іюль.
- 200) Ledum palustre. L. По мхамъ, растущимъ на осыпяхъ гранитныхъ и сланцевыхъ утесовъ. При устьи Абаканъ-Янайры образуетъ сплошную заросль на глинисто-сланечныхъ утесахъ. Іюль, Августъ.
- 201) Primula cortusoides. L. Вълогу подъ Карагаемъ. Май, Іюнь.
- 202) officinalis. Jacq. Повсюду на горныхъ лугахъ, около граници лъсовъ. Іюнь, Іюль.
- 203) elatior. Jacq. Джозонъ, совмѣстно съ viola altaica. Іюль.
 - 204) sibirica. Jacq. Въ логахъ по Имеку. Май.

- 205) Androsace dasyphilla. Bg. На склонахъ горы Курбиджекъ. Май.
 - 206) septentrionalis. Lamb. Ibid. Mañ.
- 207) Corthusa Matthioli. L. Ibid. и повсюду на таежныхъ лугахъ. Май—Іюль.
- 208) Trientaliseuropaea. L. Среди мховъ по всей дорогѣ отъ Матура до Куньсука среди тайги. Іюнь, Іюль.
- 209) Lysimachia vulgaris. L. Въ глубокомъ сыромъ логу, около Караган, на берегахъ средняго теченія Абакана около воды. Май—Іюль.
- 210) Vincentoxicum sibiricum. Абаканская степь, около устья Уйбата. Май.
- 211) Gentiana altaica. Pall. Около утесовъ на высокихъ горахъ, выще границы лъсовъ. Іюль, Августъ.
- 212) frigida. При такихъ-же условіяхъ, но не поднимается такъ высоко, какъ предъидущая.
- 213) Anagallidium dichotomum. Grieseb. Въ оврагахъ около Имека. Май, Іюнь
- 214) Halenia sibirica. Borh. Абаканъ близь устын Аскыза. Іюль.
- 215) Swertia obtusa. Ledb. Горы въ вершинахъ Иксука, на высокихъ лугахъ.
- 216) Menyanthes trifoliata. L. Абаканъ близь устья втораго Казырсука. На болоть. Іюнь, Іюль.
- 217) Polemonium coeruleum. Имекъ, на горахъ по опушкъ рощъ. Май, Іюнь.
- 218) Convolvulus arvensis. L. Въ оврагахъ, поросшихъ кустарникомъ по Таштыпу. Май, Іюнь.
- 219) *Ammani*. Desrous. Ibid. и на склонахъ Караган. Май—Іюнь.
 - 220) Cuscuta monogina. Ibid. Май, Іюнь.
 - 221) Onosma simplicissima. L. На утесахъ по Таштыпу.
- 222) Pulmonaria mollis. Walt. Абаканъ, близь втораго Казырсука. Іюль.
 - 223) Myosotis sylvestrica. L. Курбиджекъ; на известнякахъ.

- 224) Eritrichium rupestre. L. Ibid. Май—Іюль.
 - 225) Cynoglossum officinale. L. Ibid.
- 226) *Hyoscyamus niger*. L. По сосъдству съ деревней Имекъ, сорная трава. Май.
 - 227) Solanum persicum. I. Ibid. Man.
- 228) Linaria vulgaris. Mill. Западные склоны Карагая. Май —Іюль.
 - 229) Veronica pinnata L. Ibid.
- 230) longifolia. L. Въ долинъ верхняго Абакана. Очень распространено. Іюль.
- 231) incana. L. Западные селоны Карагая. Май— Іюль.
 - 232) austriaca. L. Ibid.
- 233) densiflora(?) Джозекъ. Среди ръдкаго кедровника. Іюль.
- 234) Odontites rubra. Pers. Абаканъ, близь устья Аскыза. Августъ.
 - 235) Rhinanthus Crista galli. L. Абаканская степь. Лога подъ

горою Изыхъ. Августъ.

- 236) Pedicularis uncinata. Steph. Въ вершинахъ Куньсука на восточномъ склонъ Джозека, среди лъсовъ, также по Слюдянкъ. Въ Августъ.
 - 237) resupinata. L. Матуръ. На старой пашнъ. Іюнь.
 - 238) elata. Willd. Въ логу по горъ Возе. Май.
 - 239) camosa. L. Подъ Карагаемъ. Май.
- 240) Origanum vulgare. L. Долина Абакана выше тишей на сухихъ лугахъ. Іюль, Августъ.
- 241) Thymus serpyllum. L. Около устья Аскыза. Іюль, Ав-
 - 242) var.? По сухимъ мѣстамъ на Тердешъ.
- 243) Ziziphora clinopodioides. Вд. Имекъ, склоны Карагая. Май.
 - 244) Nepeta lavandulacaea Link. Ibid. Man.
- 245) macrantha. Fisch. Абаканская степь, гора Изыхъ. Іюль.

246) Nepeta Glechoma. Benth. Въ березовой рощъ по Таштыну. Май.

247) Dracocephalum nutans. L. Имекъ, по Курбиджеку на

солнечной сторонъ, на известнякахъ. Май, Іюнь.

- 248) *altajense*. Ledb. На вершинѣ гольца въ Восточныхъ склонахъ хребта Горбу. Подпочва глинистый сланецъ. Іколь.
- 249) *peregrinum*. L. На склонахъ Карагая. Августъ.
- 250) Ruyschiana L. Луга по Матуру. Май, Іюнь.
- 251) *Prunella vulgaris*. L. Ibid. Въ рощѣ ниже улуса. Май, Іюнь.
- 252) Scutellaria alpina. L. По Карагаю, на осыни мелафира. Іюль, Августъ.
 - 253) orientalis. L. Ibid.
 - 254) scorduifolia. Fisch. Ibid.
- 255) Stachys palustris. L. Абаканская стень ниже Аскыза. на низменномъ лугу. Августъ.
- 256) Galeopsis tetrahit. L. Въ долинъ по берегу Матура. Іюнь.
 - 257) Leonorus tataricus. L. IIo Kaparaw.
- 258) lanatus. Pers. Абаканская степь, гора Изыхъ. Августъ.
- 259) Lamium album. L. На степныхъ лугахъ по Абакану. Іюнь, Іюль.
- 260) Phlomis tuberosa. L. Западный склонъ Карагая. Май, Іюнь.
 - 261) Statice speciosa. L. Ibid. На утесахъ. Май-Августъ.
- 262) *Plantago major*. L. Абаканская степь противъ устья Уйбата. Май.
 - 263) maritima. L. Ibid. На влажныхъ мъстахъ. Май.
- $264)\ Rumex.\ acetosa.\ L.\ Совмѣстно съ Aconitum licoctonum.$ Іюль.
 - 265) sp? Матуръ; на сънокосныхъ лугахъ. Іюнь.

- 266) Tragopyrum lanceolatum. М. а. Виb. Таштынъ, близь устья оврага въ рѣкъ. Май.
- 267) Poligonum bistorta L. На лугахъ по верхнему течевію Иксука, совм'єстно съ Aquilegia glandulosa. Іюнь, Іюль.
- 268) *polymorphum*. Ledb. Очень распространено въ тайгъ. Май—Іюль.
- 269) convolvulus. L. Окрестности Имека и по Карагаю. Май.
 - 270) sibiricum. Lamb. Ibid. На утесахъ. Май, Іюнь.
 - 271) aviculare. L. Матуръ, на пашнѣ. Іюнь, Іюль.
 - 272) Axyris amarantoides. Окрестности Имека. Май.
 - 273) Empetrum nigrum. L. Джозекъ; въ поясъ лъсовъ. Іюль.
 - 274) Euphorbia alpina. С. А. Меу. Подъ Карагаемъ. Май.
 - 275) Euph. altaica. С. А. Меу. Джозекъ. На скалахъ. Іюль.
- 276) lutescens. С. А. Меу. Хребетъ въ вершинахъ Иксука. Іюль.
 - 277) *cyparissias*. L. На берегахъ Таштыпа. Май.
 - 278) Salix amigdalina. L.
 - 279) viminalis. L. Ibid. Maŭ.
- 280) *Lapponum*? L. Образуеть на высокихъ горахъ (Джозекъ, Слюдянскіе таскылы, отроги Горбу) ниже Betula nana, но выше пояса лъсовъ.
 - 281) sp(?) Ibid. { голь. 282) sp(?) Ibid. { голь.
- 283) Betula nana. L. Выше пояса лёсовъ на Джозеке и отрогахъ Горбу.—Іюль.
 - 284) Alnaster fruticosus. L. По Камзасу на горъ. Іюнь.
 - 285) Triglochin palustre. L. Абакань, у Аскыза. Августь.
- 286) Scheuchzeria palustris L. Правый берегъ Абакана, близь устья втораго Казырсука. На болотинъ.
- 287) Alisma Plantago. L. Абаканская степь, на лужайкъ, верстъ 40 ниже Аскыза. Августъ.
 - 288) Butomus umbellatus. L. Ibid. Августь.
- 289) Orchis latifolia L. По Матуру. На влажных в лугахъ. Тюнь.

- 290) Orchis maculata. L. На берегу Казырсука, на переваль къ Адъ. Іюль, Августь.
- 291) *militaris*. L. На дугахъ по Таштыну и подъ Карагаемъ. Май, Іюнь.
- 292) Gymnadenia canopsea. R. Br. Вершина Иксука, черноземъ. Іюль.
- 293) Plantathera bifolia. Reichb. На лугу около хребта, близь Матурскаго улуса.
- 294) Cypripedium macranthum. Sw. Склонъ горы Бозе, въ чернольсьи. Май.
- 295) guttatum. Sw. Склоны Карагая въ березникъ. Май.
- 296) Iris ruthenica Ait. По склонамъ Бозе въ чернолъсьи. Май, всюду въ степныхъ холмахъ, среди березовыхъ рощъ.
- 297) Paris obovata. Ledb. Вершина Иксука, въ тъни мелколъсья. Іюль.
- 298) Smilacina bifolia. Desf. Вершины Карагая. Въ березникъ. Май.
- 299) Erithronium dens canis. L. Джозекъ, вершины Иксука; на сухихъ полянахъ въ полосъ лъсовъ. Іюль.
- 300) Lloydia seratina. Reichb. Джозекъ. Выше пояса лѣсной растительности, надъ озеромъ въ вершинѣ Гремучаго ключа. Іюль.
- 301) Lilium Martagon. L. На силонахъ горъ въ тайгъ. Іюнь, Іюль.
- 302) Allium Schaenoprasum. L. Матуръ; на влажной луговой почвъ. Іюнь.
- 303) strictum. Schrad. Вершины Иксука, на влажномъ лугу.
- 304) coespitosum. Sivers. Подвожія Карагая. Май— Іюль
 - 305) angulosum. L. Ibid. на западныхъ склонахъ.
 - 306) stellerianum. Willd. Ibid.
- 307) victoriale. L. На высокихъ дъсныхъ полянахъ, на умъренно-влажныхъ мъстахъ. Іюнь, Іюль.

- 308) Anticlea sibirica. Kunth. Хребетъ около Матурскихъ улусовъ, въ тъни деревьевъ. Іюль, Августъ.
- 309) Veratrum album. L. На таежныхъ лугахъ по скатамъ горъ растетъ соціально. Іюль.
- 310) *підтит.* L. Встрѣчается рѣже предъидущаго и чаще въ подтаежныхъ мѣстахъ и иногда на степи. Іюнь, Іюль.
- 311) Juncus bufonius. L. На Абаканской степи, ниже Аскыза на лужайкахъ. Августъ.
- 312) Eriophorum angustifolium. Roth. Правый берегь Абакана, близь устья 2-го Казырсука, на болотинь. Іюль.
- 313) Eleocharis palustris. R. Rr. Вершины Иксука, на болоть. Іюль.
- 314) Carex atrata. L. На низкихъ поясахъ гольцовъ. Почти въ одномъ поясъ съ Aquilegia, но часто выше. Іюнь, Іюль.
- 315) ericetorum. Pall. Въ поясъ горныхъ луговъ на Джозекъ. Іюль.
- 316) *rhynchophysa*. С. А. Меу. Устье Казырсука, на болоть. Іюль.
- 317) Triticum cristatum Schoed. Луга по Матуру, противъ удуса. Іюнь.
- 318) Festuca rubra. L. var. villosa. Луга по Абакану, въ нижнихъ тишахъ. Іюль.
- 319) Poa altaica. Frin. Злавъ на полянахъ въ вершинъ Иксука—встръчается ръдко, отдъльными группами.
- 320) nemoralis. L. На таежныхъ лугахъ бливь рѣки Абакана въ верхнемъ теченіи. Іюль.
 - 321) Glyceria. Джозекъ на горныхъ лугахъ. Іюль.
- 322) Melica nutans. L. Среди гранитныхъ осыней по болоту выше устья Тердеша на Абаканъ. Іюль.
 - 323) Hierochloa borealis. R. et. Sch. Вершины Иксука. Іюль.
 - 324) Anthoxanthum odoratum L. Ibid. Іюль.
- 325) Avena flavescens. L. Распространено повсюду на лугахъ по ръкамъ въ тайгъ и степи. Іюль.
- 326) Deschampsia caespitosa. R. Br. Таежныя луга по Абакану. Іюль.

- 327) Calamogrostis Halleriana. var в nutans DC. Джозекъ, растеть соціально на горныхъ дугахъ. Іюль.
 - 328 Stipa sibirica. L. На предгоріяхъ Карагая. Май.
- 329) Bekmannia cruciformis Hoct. На болотинъ около горы Имжекты, близь Имека. Августъ.
- 330) Digraphis arundinacaea. Trin. На песчаныхъ наносахъ по Абакану. Гюль.
- 331) Equisetum sylvaticum. L. Въ тънистыхъ мъстахъ въ тайгъ, около воды. Тюнь.
 - 332) Lycopodium annotinum. L. Склоны горы Бозе. Май.
- 333) *alpinum*. Склоны отроговъ хребта Горбу, по теченію рычки *Тереньголь*.
 - 334) Polypodium vulgare. L. Склоны горы Бозе. Май.
- 335) *Dryopteris*. L. На гранитныхъ осыпяхъ выше Тердеша, лѣвый берегъ Абакана. Іюль.
- 336) Struthiopteris germanica. Willd. На островахъ по Абакану около первой Сойотки. Почва черноземъ. Іюль.
- 337) Fontinalis antipiretria. L. Абаканъ, близь устья втораго Кавырсука. Іюль.

Послѣ разборки гербарія доставлены были мнѣ еще слѣдующія растенія, которыя и помѣщаю въ списокъ въ видѣ особаго дополненія:

- 1) Trollius asiaticus. Весьма обыкновенное растеніе въ степныхъ мъстахъ по лугамъ, рощамъ и на опушкъ лъсовъ. На горахъ подымается до предъла альпійскихъ луговъ, но цвътетъ тамъ очень поздно.
- 2) Aquilegia sibirica. Въ рощахъ и по опушкамъ лѣсовъ, въ Маъ.
 - 3) Silene inflata.
 - 4) Orobus alpestris.
- 5) Solidago Virga aurea. На лугахъ въ подтаежныхъ мъстахъ. Луга по Матуру. Іюнь.
 - 6) Pyrola rotundifolia.

- 7) Populus tremula. L. Образуеть сплошныя заросли на горахъ въ тайгъ. Часто образуеть рощи совмъстно съ березой.
- 8) Juniperus nana. L. Образуетъ стлани на гольцахъ, на утесахъ на поясъ альпійскихъ луговъ.
 - 9) Euphorbia altaica.

Всёхъ 346 видовъ.

Д. Клеменцъ.



ç

ИЗДАНІЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКАГО ОТДЪЛА ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Записки Отдвла:


КНИЖКА 4-я. (Отчетъ и протоколы за 1881 г.—Отчетъ о повздвъ въ 1880 г. въ горный Алтай, къ Телецкому озеру и въ вершины Катуни, Ядрипиева.—Сельскія общества Салаирской волости, Ионикаровскаго.—Очерки Нарымскаго кран, Григоровскаго.—Промыслы Нарымскаго кран, съ чертеж., Иостаковича.—Объ условіяхъ торговаго сношенія Европы съ Западной Сибирью, перев. Козлова.—Статистическій очеркъ современнаго состоянія горнозаводской промышленности въ Западной Сибири, съ картою, Маларевскаго.—Перечень 172 астрон. пункт. Зап. Сибири, Мирошниченко.—Смесь к. Ц.—1 р. 50 к.

КНИЖКА 6-я. Протоволы за 1883 г.—Озеро Балхашъ и теченіе р. Или отъ выселка Илійскаго до ея устьевъ, Фишера.—Описаніе Васюганской тундры, съ карт., Григоровскаго.—Первобытная культура тюрко-татарских народовъ, Вамбери, перев. Стратилатова.—
Двъ главы изъ соч. Котты: Der Altai, Леваневскаго.—Ботаническій очеркъ Тарскаго округа, Тоб. губ. Лебединскаго.—Флора г. Омска и его окрестностей, Килломана и Колоколова.—Астрономическія и барометрическія наблюденія, Лазарева, обр. Пъвцовымъ.—Метеорологическія наблюденія въ г. Акмолинскі съ 1873 по 1881 г., Лазарева). Ц.—1 р. 50 к.

КНИЖКА 7-я, вып. І. (Путешествіе на оз. Балхашъ и въ Семиръч. область, *Никольскаго.*—О находкахъ предметовъ каменнаго періода близь г. Тюмени, *Словиова*). Ц.—1 р. выпускъ ІІ-й (Отчетъ и протоколы за 1884 г.—Киргизы (этнологическій очеркъ), *Зеланда.*—Путевыя замътки объ оз. Сартланъ, *Дълконова.*—Смъсь). Ц.—1 р.

книжка 9-я. (Кашгарія и перевалы Тянь-Шаня; путевыя записки Н. Зеланда). Ц.—1 р.

Складъ изданій въ пом'вщеніи Зап.-Сибирск. Отдёла Императорскаго Русск. Геогр. Общ. Иногородные адресують въ Зап.-Сибир. Отд. Императорск. Русск. Географ. Общества, въ Омскъ.



86 role

Проверено 1953 г.

